



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
अखिल भारतीय समन्वयित कृषि हवामानशास्त्र संशोधन प्रकल्प
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी - ४३१ ४०२
ईमेल - amfuparbhani@gmail.com



बीड जिल्हा कृषि हवामान सल्ला पत्रक क्रमांक - ८१/२०२५-२०२६ मंगळवार, दिनांक - ०३.०२.२०२६

मागील आठवड्यातील हवामानस्थिती (दिनांक २८ जानेवारी ते ०३ फेब्रुवारी, २०२६)							हवामान घटक	हवामान अंदाज (दिनांक ०४ ते ०८ फेब्रुवारी २०२६, साठी हवामान अंदाज)				
२८/०१	२९/०१	३०/०१	३१/०१	०१/०२	०२/०२	०३/०२	दिनांक	०४/०२	०५/०२	०६/०२	०७/०२	०८/०२
							पाऊस (मिमी)	०.०	०.०	०.०	०.०	०.०
							कमाल तापमान (अं.से)	३२.०	३२.०	३३.०	३३.०	३२.०
							किमान तापमान (अं.से)	१९.०	१९.०	१८.०	१६.०	१५.०
							स. दु.	अंशतः ढगाळ	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ
							ढग स्थिती (आकाश)					
							सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	५०	५१	४८	४६	४२
							दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	२३	२३	२०	१८	१६
							वाऱ्याचा वेग (किमी / तास)	१०	११	१०	९	६
							स. दु.	पूर्व-आग्नेय	आग्नेय	आग्नेय	आग्नेय	पूर्व
							वाऱ्याची दिशा					

हवामान सारांश / चेतावनी :

प्रादेशिक हवामान केंद्र , मुंबई येथून प्राप्त झालेल्या अंदाजानुसार र बीड जिल्ह्यात पुढील पाच दिवस आकाश स्वच्छ राहून हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. बीड जिल्ह्यात पुढील चौविस ते अठेचाळीस तासात किमान तापमानात वाढ होऊन त्यानंतर पुढील तीन दिवसात १ ते २ अं.से. ने घट होण्याची शक्यता आहे.

सामान्य सल्ला :

विस्तारीत अंदाजानुसार (ईआरएफएस) मराठवाड्यात दिनांक ०६ ते १२ फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान पाऊस सरासरीपेक्षा कमी, कमाल तापमान सरासरीपेक्षा कमी व किमान तापमान सरासरीपेक्षा राहण्याची शक्यता आहे.

संदेश : मराठवाड्यात पुढील पाच दिवस हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता लक्षात घेता पिकास, फळबागेस, भाजीपाला व फुल पिकास आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे.

पिकांचे नाव	अवस्था	कृषी हवामान सल्ला
कापूस	काढणी	कुठल्याही परिस्थितीत कापसाची फरदड (खोडवा) घेऊ नये. कापूस पिकाची शेवटची वेचणी पूर्ण झाल्यावर कापूस पिकाचा पालापाचोळा, पराट्या जमा करून त्यांची योग्य विव्हेटाट लावावी.
तूर	परिपक्वता ते काढणी	काढणीस तयार असलेल्या तूर पिकाची काढणी करून घ्यावी व वाळवल्यानंतरच मळणी करावी. काढणी केलेल्या तूर पिकाची सुरक्षित ठिकाणी साठवणूक करावी.
रब्बी ज्वारी	वाढीची ते पोटरी	रब्बी ज्वारी पिकात लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी इमामेक्टीन बेन्झोएट ५ टक्के ४ ग्रॅम किंवा स्पिनेटोरम ११.७ एससी ४ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून वरील किटकनाशकांची आलटून पालटून फवारणी करावी. फवारणी करत असतांना किटकनाशक पोंग्यात पडेल अशाप्रकारे फवारणी करावी. रब्बी ज्वारी पिकास आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे.
रब्बी सूर्यफुल	दाणे भरणे- पक्वता	रब्बी सूर्यफुल दाणे भरण्याच्या अवस्थेमध्ये असतांना पाणी द्यावे.
गहू	दुधाळ ते दाणे भरणे	गहू पिकास दाण्यात दुधाळ पीक अवस्था (पेरणी नंतर ८० ते ८५ दिवस) व दाणे भरताना (पेरणीनंतर ९० ते ९५ दिवस) पाणी द्यावे. गव्हाच्या पिकात उंदरांचा प्रादुर्भाव दिसून असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी झिक फॉस्फाईड १ भाग + गुळ १ भाग + ५० भाग गव्हाचा भरडा व थोडसे गोडतेल मिसळून हे मिश्रण उंदराच्या बिळात टाकून बिळे बंद करावीत.
उन्हाळी भुईमूग	वाणांची निवड	उन्हाळी भुईमूग पिकाच्या पेरणीसाठी एस.बी.११, टी.एजी २४, एलजीएन-१, टीएलजी-४५, टीजी २६, जेएल २४, जेएल २२० या वाणांपैकी वाणाची निवड करावी. पेरणीपूर्वी बियाण्यास २५० ग्रॅम रायझोबीयम व पीएसबी प्रति १० किलो बियाण्यास बिजप्रक्रिया करावी.
केळी	वाढीची / घड वाढीची	केळी बागेस आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे. केळी बागेत घडवाढीसाठी ००:००:५० विद्राव्य खताची १५ ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. काढणीस तयार असलेल्या केळी घडांची काढणी करून घ्यावी.
आंबा	फुलधारणा	आंबा बागेत आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे. आंबा बागेत मोहोरावर भूरी रोगाचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास, याच्या व्यवस्थापनासाठी सल्फर ८० % डब्ल्यूपी २ ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
द्राक्ष	घड वाढीची	द्राक्ष बागेत रात्री सिंचन करावे. द्राक्ष बागेत भूरी रोगाच्या व्यवस्थापनासाठी हेक्झाकोनॅझोल ५ % एससी १ मिली किंवा मायक्लोब्यूट्रिनेल १० % डब्ल्यूपी १० ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
सिताफळ	वाढीची	सिताफळ बागेत आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे.
भाजीपाला	वाढीची/ काढणी	भाजीपाला पिकात खूरपणी करून तण विरहीत ठेवावे व आवश्यकतेनुसार पाटाने पाणी द्यावे. काढणीस तयार असलेल्या भाजीपाला पिकाची काढणी करून घ्यावी. भाजीपाला (मिरची, वांगे व भेंडी) पिकात रसशोषण करणाऱ्या किडीचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास त्याच्या व्यवस्थापनासाठी पायरीप्रॉक्सीफेन ५% + फेनप्रोपाथ्रीन १५% १० मीली किंवा डायमेटोएट ३०% १३ मीली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
फुलशेती	वाढीची/ काढणी	फुल पिकात खूरपणी करून तण विरहीत ठेवावे व आवश्यकतेनुसार पाटाने पाणी द्यावे. काढणीस तयार असलेल्या फुल पिकाची काढणी करून घ्यावी.
पशुधन व्यवस्थापन	-----	थंडीच्या दिवसात जेव्हा थंड वारे वाहू लागतात त्या वेळेस आपल्या जनावरांचे विशेषतः शेळी आणि मेंढी यांचे थंडीपासून संरक्षण करावे. त्याकरीता त्यांच्या निवाऱ्याच्या जागेत ऊब असावी, माफक प्रमाणात हवा खेळती असावी. नाकातून पाणी येणे, भूक मंदावणे, चालण्याकरीता कष्ट होणे ई. लक्षणे दिसू लागतात पशुवैद्यकाशी त्वरीत संपर्क साधावा. सर्वसाधारणपणे बकरीच्या पिल्लांना थंडीची बाधा लवकर होते. थंडीच्या दिवसात करंडांची मरतुक टाळण्यासाठी त्यांना ऊबदार जागेत ठेवावे. मोठ्या टोपलीत कापड टाकून त्यामध्ये पिल्लांना ठेवता येऊ शकते, थंडीपासून संरक्षण होते. गोठ्यात माफक हवा असावी. शेळीचे दुध भरपूर प्रमाणात द्यावे ज्यामुळे पिल्लांच्या शरीरात ऊर्जा निर्माण होऊन थंडीपासून बाधा होणार नाही.

सदर कृषी हवामान सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.

मुख्य प्रकल्प समन्वयक
ग्रामीण कृषी मौसम सेवा
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठपरभणी ,



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
अखिल भारतीय समन्वयित कृषि हवामानशास्त्र संशोधन प्रकल्प
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी — ४३१ ४०२
ईमेल - amfuparbhani@gmail.com



हिंगोली जिल्हा कृषि हवामान सल्ला पत्रक क्रमांक — ८९/२०२५-२०२६ मंगळवार, दिनांक — ०३.०२.२०२६

मागील आठवड्यातील हवामानस्थिती (दिनांक २८ जानेवारी ते ०३ फेब्रुवारी, २०२६)							हवामान घटक	हवामान अंदाज (दिनांक ०४ ते ०८ फेब्रुवारी २०२६, साठी हवामान अंदाज)				
२८/०१	२९/०१	३०/०१	३१/०१	०१/०२	०२/०२	०३/०२	दिनांक	०४/०२	०५/०२	०६/०२	०७/०२	०८/०२
							पाऊस (मिमी)	०.०	०.०	०.०	०.०	०.०
							कमाल तापमान (अं.से)	३१.०	३२.०	३२.०	३३.०	३३.०
							किमान तापमान (अं.से)	१८.०	१९.०	१८.०	१६.०	१५.०
							स. ढग स्थिती (आकाश)	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ
							सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	६४	६५	६१	६४	६६
							दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	४७	४८	४५	४४	४४
							वाऱ्याचा वेग (किमी / तास)	६	१०	८	१०	९
							स. वाऱ्याची दिशा	पूर्व-आग्नेय	पूर्व-आग्नेय	पूर्व-आग्नेय	पूर्व-ईशान्य	पूर्व-ईशान्य
							दु.					

हवामान सारांश / चेतावनी :

प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई येथून प्राप्त झालेल्या अंदाजानुसार र हिंगोली जिल्ह्यात पुढील पाच दिवस आकाश स्वच्छ राहून हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. हिंगोली जिल्ह्यात पुढील चोविस ते अठेचाळीस तासात किमान तापमानात वाढ होऊन त्यानंतर पुढील तीन दिवसात १ ते २ अं.से. ने घट होण्याची शक्यता आहे.

सामान्य सल्ला :

विस्तारीत अंदाजानुसार (ईआरएफएस) मराठवाड्यात दिनांक ०६ ते १२ फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान पाऊस सरासरीपेक्षा कमी, कमाल तापमान सरासरीपेक्षा कमी व किमान तापमान सरासरीपेक्षा राहण्याची शक्यता आहे.

संदेश : मराठवाड्यात पुढील पाच दिवस हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता लक्षात घेता पिकास, फळबागेस, भाजीपाला व फुल पिकास आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे.

पिकांचे नाव	अवस्था	कृषी हवामान सल्ला
कापूस	काढणी	कुठल्याही परिस्थितीत कापसाची फरदड (खोडवा) घेऊ नये. कापूस पिकाची शेवटची वेचणी पूर्ण झाल्यावर कापूस पिकाचा पालापाचोळा, पराट्या जमा करून त्यांची योग्य विल्हेवाट लावावी.
तूर	परिपक्वता ते काढणी	काढणीस तयार असलेल्या तूर पिकाची काढणी करून घ्यावी व वाळवल्यानंतरच मळणी करावी. काढणी केलेल्या तूर पिकाची सुरक्षित ठिकाणी साठवणूक करावी.
रब्बी ज्वारी	वाढीची ते पोटरी	रब्बी ज्वारी पिकात लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी इमामेक्टीन बेन्झोएट ५ टक्के ४ ग्रॅम किंवा स्पिनेटोरम ११.७ एससी ४ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून वरील किटकनाशकांची आलटून पालटून फवारणी करावी. फवारणी करत असतांना किटकनाशक पाण्यात पडेल अशाप्रकारे फवारणी करावी. रब्बी ज्वारी पिकास आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे.
रब्बी सूर्यफूल	दाणे भरणे- पक्वता	रब्बी सूर्यफूल दाणे भरण्याच्या अवस्थेमध्ये असतांना पाणी द्यावे.
गहू	दुधाळ ते दाणे भरणे	गहू पिकास दाण्यात दुधाळ पीक अवस्था (पेरणी नंतर ८० ते ८५ दिवस) व दाणे भरताना (पेरणीनंतर ९० ते ९५ दिवस) पाणी द्यावे. गव्हाच्या पिकात उंदरांचा प्रादुर्भाव दिसून असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी झिंक फॉस्फाईड १ भाग + गुळ १ भाग + ५० भाग गव्हाचा भरडा व थोडसे गोडतेल मिसळून हे मिश्रण उंदराच्या बिळात टाकून बिळे बंद करावीत.
उन्हाळी भुईमूग	वाणांची निवड	उन्हाळी भुईमूग पिकाच्या पेरणीसाठी एस.बी.११, टीएजी २४, एलजीएन-१, टीएलजी-४५, टीजी २६, जेएल २४, जेएल २२० या वाणांपैकी वाणाची निवड करावी. पेरणीपूर्वी बियाण्यास २५० ग्रॅम रायझोबीयम व पीएसबी प्रति १० किलो बियाण्यास बिजप्रक्रिया करावी.
केळी	वाढीची / घड वाढीची	केळी बागेस आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे. केळी बागेत घडवाढीसाठी ००:००:५० विद्राव्य खताची १५ ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. काढणीस तयार असलेल्या केळी घडांची काढणी करून घ्यावी.
आंबा	फुलधारणा	आंबा बागेत आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे. आंबा बागेत मोहोरावर भूरी रोगाचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास, याच्या व्यवस्थापनासाठी सल्फर ८० % डब्ल्यूपी २ ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
द्राक्ष	घड वाढीची	द्राक्ष बागेत रात्री सिंचन करावे. द्राक्ष बागेत भूरी रोगाच्या व्यवस्थापनासाठी हेक्झाकोनॅझोल ५ % एससी १ मिली किंवा मायक्लोब्यूटॅनिल १० % डब्ल्यूपी १० ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
सिताफळ	वाढीची	सिताफळ बागेत आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे.
भाजीपाला	वाढीची/ काढणी	भाजीपाला पिकात खूरपणी करून तण विरहीत ठेवावे व आवश्यकतेनुसार पाटाने पाणी द्यावे. काढणीस तयार असलेल्या भाजीपाला पिकाची काढणी करून घ्यावी. भाजीपाला (मिरची, वांगे व भेंडी) पिकात रसशोषण करणाऱ्या किडीचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास त्याच्या व्यवस्थापनासाठी पायरीप्रॉक्सीफेन ५% + फेनप्रोपाथ्रीन १५% १० मीली किंवा डायमेटोएट ३०% १३ मीली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
फुलशेती	वाढीची/ काढणी	फुल पिकात खूरपणी करून तण विरहीत ठेवावे व आवश्यकतेनुसार पाटाने पाणी द्यावे. काढणीस तयार असलेल्या फुल पिकाची काढणी करून घ्यावी.
पशुधन व्यवस्थापन	-----	थंडीच्या दिवसात जेव्हा थंड वारे वाहू लागतात त्या वेळेस आपल्या जनावरांचे विशेषतः शेळी आणि मेंढी यांचे थंडीपासून संरक्षण करावे. त्याकरीता त्यांच्या निवाऱ्याच्या जागेत ऊब असावी, माफक प्रमाणात हवा खेळती असावी. नाकातून पाणी येणे, भूक मंदावणे, चालण्याकरीता कष्ट होणे ई. लक्षणे दिसू लागताच पशुवैद्यकाशी त्वरीत संपर्क साधावा. सर्वसाधारणपणे बकरीच्या पिल्लांना थंडीची बाधा लवकर होते. थंडीच्या दिवसात करंडांची मरतुक टाळण्यासाठी त्यांना ऊबदार जागेत ठेवावे. मोठ्या टोपलीत कापड टाकून त्यामध्ये पिल्लांना ठेवता येऊ शकते, थंडीपासून संरक्षण होते. गोठ्यात माफक हवा असावी. शेळीचे दुध भरपूर प्रमाणात द्यावे ज्यामुळे पिल्लांच्या शरीरात ऊर्जा निर्माण होऊन थंडीपासून बाधा होणार नाही.

सदर कृषी हवामान सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.

मुख्य प्रकल्प समन्वयक
ग्रामीण कृषी मौसम सेवा
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी



जालना जिल्हा कृषि हवामान सल्ला पत्रक क्रमांक - ८१/२०२५-२०२६ मंगळवार, दिनांक - ०३.०२.२०२६

मागील आठवड्यातील हवामानस्थिती (दिनांक २८ जानेवारी ते ०३ फेब्रुवारी, २०२६)							हवामान घटक	हवामान अंदाज (दिनांक ०४ ते ०८ फेब्रुवारी २०२६, साठी हवामान अंदाज)				
२८/०१	२९/०१	३०/०१	३१/०१	०१/०२	०२/०२	०३/०२	दिनांक	०४/०२	०५/०२	०६/०२	०७/०२	०८/०२
							पाऊस (मिमी)	०.०	०.०	०.०	०.०	०.०
							कमाल तापमान (अं.से.)	३०.०	३२.०	३३.०	३३.०	३२.०
							किमान तापमान (अं.से.)	१८.०	१७.०	१६.०	१५.०	१४.०
							स. दु.	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ
							ढग स्थिती (आकाश)	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ
							सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	६१	६२	६१	६४	६१
							दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	३३	३५	३२	३०	२९
							वाऱ्याचा वेग (किमी /तास)	८	१०	८	५	८
							स. दु.	पूर्व-आग्नेय	पूर्व-आग्नेय	पूर्व-आग्नेय	पूर्व	पूर्व-ईशान्य

हवामान सारांश / चेतावनी :

प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई येथून प्राप्त झालेल्या अंदाजानुसार र जालना जिल्ह्यात पुढील पाच दिवस आकाश स्वच्छ राहून हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. जालना जिल्ह्यात पुढील चोविस ते अठेचाळीस तासात किमान तापमानात वाढ होऊन त्यानंतर पुढील तीन दिवसात १ ते २ अं.से. ने घट होण्याची शक्यता आहे.

सामान्य सल्ला :

विस्तारीत अंदाजानुसार (ईआरएफएस) मराठवाड्यात दिनांक ०६ ते १२ फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान पाऊस सरासरीपेक्षा कमी, कमाल तापमान सरासरीपेक्षा कमी व किमान तापमान सरासरीपेक्षा राहण्याची शक्यता आहे.

संदेश : मराठवाड्यात पुढील पाच दिवस हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता लक्षात घेता पिकास, फळबागेस, भाजीपाला व फुल पिकास आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे.

पिकांचे नाव	अवस्था	कृषी हवामान सल्ला
कापूस	काढणी	कुठल्याही परिस्थितीत कापसाची फरदड (खोडवा) घेऊ नये. कापूस पिकाची शेवटची वेचणी पूर्ण झाल्यावर कापूस पिकाचा पालापाचोळा, पराट्या जमा करून त्यांची योग्य विल्हेवाट लावावी.
तूर	परिपक्वता ते काढणी	काढणीस तयार असलेल्या तूर पिकाची काढणी करून घ्यावी व वाळवल्यानंतरच मळणी करावी. काढणी केलेल्या तूर पिकाची सुरक्षित ठिकाणी साठवणूक करावी.
रब्बी ज्वारी	वाढीची ते पोटरी	रब्बी ज्वारी पिकात लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी इमामेक्टीन बेन्झोएट ५ टक्के ४ ग्रॅम किंवा स्पिनेटोरम ११.७ एससी ४ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून वरील किटकनाशकांची आलटून पालटून फवारणी करावी. फवारणी करत असतांना किटकनाशक पोंग्यात पडेल अशाप्रकारे फवारणी करावी. रब्बी ज्वारी पिकास आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे.
रब्बी सूर्यफूल	दाणे भरणे- पक्वता	रब्बी सूर्यफूल दाणे भरण्याच्या अवस्थेमध्ये असतांना पाणी द्यावे.
गहू	दुधाळ ते दाणे भरणे	गहू पिकास दाण्यात दुधाळ पीक अवस्था (पेरणी नंतर ८० ते ८५ दिवस) व दाणे भरताना (पेरणीनंतर ९० ते ९५ दिवस) पाणी द्यावे. गव्हाच्या पिकात उंदरांचा प्रादुर्भाव दिसून असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी झिंक फॉस्फाईड १ भाग + गुळ १ भाग + ५० भाग गव्हाचा भरडा व थोडसे गोडतेल मिसळून हे मिश्रण उंदराच्या बिळात टाकून बिळे बंद करावीत.
उन्हाळी भुईमूग	वाणांची निवड	उन्हाळी भुईमूग पिकाच्या पेरणीसाठी एस.बी.११, टीएजी २४, एलजीएन-१, टीएलजी-४५, टीजी २६, जेएल २४, जेएल २२० या वाणांपैकी वाणाची निवड करावी. पेरणीपूर्वी बियाण्यास २५० ग्रॅम रायझोबीयम व पीएसबी प्रति १० किलो बियाण्यास बिजप्रक्रिया करावी.
केळी	वाढीची / घड वाढीची	केळी बागेस आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे. केळी बागेत घडवाढीसाठी ००:००:५० विद्राव्य खताची १५ ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. काढणीस तयार असलेल्या केळी घडांची काढणी करून घ्यावी.
आंबा	फुलधारणा	आंबा बागेत आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे. आंबा बागेत मोहोरावर भूरी रोगाचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास, याच्या व्यवस्थापनासाठी सल्फर ८० % डब्ल्यूपी २ ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
द्राक्ष	घड वाढीची	द्राक्ष बागेत रात्री सिंचन करावे. द्राक्ष बागेत भूरी रोगाच्या व्यवस्थापनासाठी हेक्झाकोनॅझोल ५ % एससी १ मिली किंवा मायक्लोब्यूट्रॉनिल १० % डब्ल्यूपी १० ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
सिताफळ	वाढीची	सिताफळ बागेत आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे.
भाजीपाला	वाढीची/ काढणी	भाजीपाला पिकात खूरपणी करून तण विरहीत ठेवावे व आवश्यकतेनुसार पाटाने पाणी द्यावे. काढणीस तयार असलेल्या भाजीपाला पिकाची काढणी करून घ्यावी. भाजीपाला (मिरची, वांगे व भेंडी) पिकात रसशोषण करणाऱ्या किडीचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास त्याच्या व्यवस्थापनासाठी पायरीप्रॉक्सीफेन ५% + फेनप्रोपाथ्रीन १५% १० मीली किंवा डायमेटोएट ३०% १३ मीली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
फुलशेती	वाढीची/ काढणी	फुल पिकात खूरपणी करून तण विरहीत ठेवावे व आवश्यकतेनुसार पाटाने पाणी द्यावे. काढणीस तयार असलेल्या फुल पिकाची काढणी करून घ्यावी.
पशुधन व्यवस्थापन	-----	थंडीच्या दिवसात जेव्हा थंड वारे वाहू लागतात त्या वेळेस आपल्या जनावरांचे विशेषतः शेळी आणि मेंढी यांचे थंडीपासून संरक्षण करावे. त्याकरीता त्यांच्या निवाऱ्याच्या जागेत ऊब असावी, माफक प्रमाणात हवा खेळती असावी. नाकातून पाणी येणे, भूक मंदावणे, चालण्याकरीता कष्ट होणे ई. लक्षणे दिसू लागतात पशुवैद्यकाशी त्वरीत संपर्क साधावा. सर्वसाधारणपणे बकरीच्या पिल्लांना थंडीची बाधा लवकर होते. थंडीच्या दिवसात करंडांची मरतूक टाळण्यासाठी त्यांना ऊबदार जागेत ठेवावे. मोठ्या टोपलीत कापड टाकून त्यामध्ये पिल्लांना ठेवता येऊ शकते, थंडीपासून संरक्षण होते. गोठ्यात माफक हवा असावी. शेळीचे दुध भरपूर प्रमाणात द्यावे ज्यामुळे पिल्लांच्या शरीरात ऊर्जा निर्माण होऊन थंडीपासून बाधा होणार नाही.

सदर कृषी हवामान सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
अखिल भारतीय समन्वयित कृषि हवामानशास्त्र संशोधन प्रकल्प
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी - ४३१ ४०२
ईमेल - amfuparbhani@gmail.com



लातूर जिल्हा कृषि हवामान सल्ला पत्रक क्रमांक - ८९/२०२५-२०२६ मंगळवार, दिनांक - ०३.०२.२०२६

मागील आठवड्यातील हवामानस्थिती (दिनांक २८ जानेवारी ते ०३ फेब्रुवारी, २०२६)							हवामान घटक	हवामान अंदाज (दिनांक ०४ ते ०८ फेब्रुवारी २०२६, साठी हवामान अंदाज)				
२८/०१	२९/०१	३०/०१	३१/०१	०१/०२	०२/०२	०३/०२	दिनांक	०४/०२	०५/०२	०६/०२	०७/०२	०८/०२
							पाऊस (मिमी)	०.०	०.०	०.०	०.०	०.०
							कमाल तापमान (अं.से)	३१.०	३२.०	३२.०	३३.०	३२.०
							किमान तापमान (अं.से)	१८.०	१९.०	१८.०	१६.०	१६.०
							स. ढग स्थिती (आकाश)	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ
							सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	७५	७२	७०	६२	५८
							दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	४०	३९	३५	३४	३२
							वाऱ्याचा वेग (किमी /तास)	९	११	१०	७	७
							स. वाऱ्याची दिशा	पूर्व-आग्नेय	दक्षिण-आग्नेय	आग्नेय	दक्षिण-आग्नेय	आग्नेय
							दु.					

हवामान सारांश / चेतावनी :

प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई येथून प्राप्त झालेल्या अंदाजानुसार लातूर जिल्ह्यात पुढील पाच दिवस आकाश स्वच्छ राहून हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. लातूर जिल्ह्यात पुढील चौविस ते अठेचाळीस तासात किमान तापमानात वाढ होऊन त्यानंतर पुढील तीन दिवसात १ ते २ अं.से. ने घट होण्याची शक्यता आहे.

सामान्य सल्ला :

विस्तारीत अंदाजानुसार (ईआरएफएस) मराठवाड्यात दिनांक ०६ ते १२ फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान पाऊस सरासरीपेक्षा कमी, कमाल तापमान सरासरीपेक्षा कमी व किमान तापमान सरासरीपेक्षा राहण्याची शक्यता आहे.

संदेश : मराठवाड्यात पुढील पाच दिवस हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता लक्षात घेता पिकास, फळबागेस, भाजीपाला व फुल पिकास आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे.

पिकांचे नाव	अवस्था	कृषी हवामान सल्ला
कापूस	काढणी	कुठल्याही परिस्थितीत कापसाची फरदड (खोडवा) घेऊ नये. कापूस पिकाची शेवटची वेचणी पूर्ण झाल्यावर कापूस पिकाचा पालापाचोळा, पराट्या जमा करून त्यांची योग्य विल्हेवाट लावावी.
तूर	परिपक्वता ते काढणी	काढणीस तयार असलेल्या तूर पिकाची काढणी करून घ्यावी व वाळवल्यानंतरच मळणी करावी. काढणी केलेल्या तूर पिकाची सुरक्षित ठिकाणी साठवणूक करावी.
रब्बी ज्वारी	वाढीची ते पोटरी	रब्बी ज्वारी पिकात लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी इमामेक्टीन बेन्झोएट ५ टक्के ४ ग्रॅम किंवा स्पिनेटोरम ११.७ एससी ४ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून वरील किटकनाशकांची आलटून पालटून फवारणी करावी. फवारणी करत असतांना किटकनाशक पोंग्यात पडेल अशाप्रकारे फवारणी करावी. रब्बी ज्वारी पिकास आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे.
रब्बी सूर्यफूल	दाणे भरणे-पक्वता	रब्बी सूर्यफूल दाणे भरण्याच्या अवस्थेमध्ये असतांना पाणी द्यावे.
गहू	दुधाळ ते दाणे भरणे	गहू पिकास दाण्यात दुधाळ पीक अवस्था (पेरणी नंतर ८० ते ८५ दिवस) व दाणे भरताना (पेरणीनंतर ९० ते ९५ दिवस) पाणी द्यावे. गव्हाच्या पिकात उंदरांचा प्रादुर्भाव दिसून असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी झिंक फॉस्फाईड १ भाग + गुळ १ भाग + ५० भाग गव्हाचा भरडा व थोडसे गोडतेले मिसळून हे मिश्रण उंदराच्या बिळात टाकून बिळे बंद करावीत.
उन्हाळी भुईमूग	वाणांची निवड	उन्हाळी भुईमूग पिकाच्या पेरणीसाठी एस.बी.११, टीएजी २४, एलजीएन-१, टीएलजी-४५, टीजी २६, जेएल २४, जेएल २२० या वाणांपैकी वाणाची निवड करावी. पेरणीपूर्वी बियाण्यास २५० ग्रॅम रायझोबीयम व पीएसबी प्रति १० किलो बियाण्यास बिजप्रक्रिया करावी.
केळी	वाढीची / घड वाढीची	केळी बागेस आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे. केळी बागेत घडवाढीसाठी ००:००:५० विद्राव्य खताची १५ ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. काढणीस तयार असलेल्या केळी घडांची काढणी करून घ्यावी.
आंबा	फुलधारणा	आंबा बागेत आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे. आंबा बागेत मोहोरावर भूरी रोगाचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास, याच्या व्यवस्थापनासाठी सल्फर ८० % डब्ल्यूपी २ ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
द्राक्ष	घड वाढीची	द्राक्ष बागेत रात्री सिंचन करावे. द्राक्ष बागेत भूरी रोगाच्या व्यवस्थापनासाठी हेक्झाकोनॅझोल ५ % एससी १ मिली किंवा मायक्लोब्यूटॅनिल १० % डब्ल्यूपी १० ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
सिताफळ	वाढीची	सिताफळ बागेत आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे.
भाजीपाला	वाढीची/काढणी	भाजीपाला पिकात खूरपणी करून तण विरहीत ठेवावे व आवश्यकतेनुसार पाटाने पाणी द्यावे. काढणीस तयार असलेल्या भाजीपाला पिकाची काढणी करून घ्यावी. भाजीपाला (मिरची, वांगे व भेंडी) पिकात रसशोषण करणाऱ्या किडीचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास त्याच्या व्यवस्थापनासाठी पायरीप्रॉक्सीफेन ५% + फेनप्रोपाथ्रीन १५% १० मीली किंवा डायमेटोएट ३०% १३ मीली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
फुलशेती	वाढीची/काढणी	फुल पिकात खूरपणी करून तण विरहीत ठेवावे व आवश्यकतेनुसार पाटाने पाणी द्यावे. काढणीस तयार असलेल्या फुल पिकाची काढणी करून घ्यावी.
पशुधन व्यवस्थापन	-----	थंडीच्या दिवसात जेव्हा थंड वारे वाहू लागतात त्या वेळेस आपल्या जनावरांचे विशेषतः शेळी आणि मेंढी यांचे थंडीपासून संरक्षण करावे. त्याकरीता त्यांच्या निवाऱ्याच्या जागेत ऊब असावी, माफक प्रमाणात हवा खेळती असावी. नाकातून पाणी येणे, भूक मंदावणे, चालण्याकरीता कष्ट होणे ई. लक्षणे दिसू लागतात पशुवैद्यकाशी त्वरीत संपर्क साधावा. सर्वसाधारणपणे बकरीच्या पिल्लांना थंडीची बाधा लवकर होते. थंडीच्या दिवसात करंडांची मरतुक टाळण्यासाठी त्यांना ऊबदार जागेत ठेवावे. मोठ्या टोपलीत कापड टाकून त्यामध्ये पिल्लांना ठेवता येऊ शकते, थंडीपासून संरक्षण होते. गोठ्यात माफक हवा असावी. शेळीचे दुध भरपूर प्रमाणात द्यावे ज्यामुळे पिल्लांच्या शरीरात ऊर्जा निर्माण होऊन थंडीपासून बाधा होणार नाही.

सदर कृषी हवामान सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.

मुख्य प्रकल्प समन्वयक
ग्रामीण कृषी मौसम सेवा
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
अखिल भारतीय समन्वयित कृषि हवामानशास्त्र संशोधन प्रकल्प
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी — ४३१ ४०२
ईमेल - amfuparbhani@gmail.com



नांदेड जिल्हा कृषि हवामान सल्ला पत्रक क्रमांक — ८९/२०२५-२०२६ मंगळवार, दिनांक — ०३.०२.२०२६

मागील आठवड्यातील हवामानस्थिती (दिनांक २८ जानेवारी ते ०३ फेब्रुवारी, २०२६)							हवामान घटक	हवामान अंदाज (दिनांक ०४ ते ०८ फेब्रुवारी २०२६, साठी हवामान अंदाज)				
२८/०१	२९/०१	३०/०१	३१/०१	०१/०२	०२/०२	०३/०२	दिनांक	०४/०२	०५/०२	०६/०२	०७/०२	०८/०२
							पाऊस (मिमी)	०.०	०.०	०.०	०.०	०.०
							कमाल तापमान (अं.से.)	३१.०	३२.०	३२.०	३३.०	३२.०
							किमान तापमान (अं.से.)	२०.०	२०.०	१८.०	१७.०	१६.०
							स. दु.	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ
							ढग स्थिती (आकाश)					
							सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	६४	६७	६३	५८	५७
							दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	४७	४८	४४	४३	४२
							वाऱ्याचा वेग (किमी / तास)	६	१०	७	५	५
							स. दु.	पूर्व-आग्नेय	आग्नेय	आग्नेय	पूर्व	ईशान्य
							वाऱ्याची दिशा					

हवामान सारांश / चेतावनी :

प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई येथून प्राप्त झालेल्या अंदाजानुसार नांदेड जिल्ह्यात पुढील पाच दिवस आकाश स्वच्छ राहून हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. नांदेड जिल्ह्यात पुढील चोविस ते अठेचाळीस तासात किमान तापमानात वाढ होऊन त्यानंतर पुढील तीन दिवसात १ ते २ अं.से. ने घट होण्याची शक्यता आहे.

सामान्य सल्ला :

विस्तारीत अंदाजानुसार (ईआरएफएस) मराठवाड्यात दिनांक ०६ ते १२ फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान पाऊस सरासरीपेक्षा कमी, कमाल तापमान सरासरीपेक्षा कमी व किमान तापमान सरासरीपेक्षा राहण्याची शक्यता आहे.

संदेश : मराठवाड्यात पुढील पाच दिवस हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता लक्षात घेता पिकास, फळबागेस, भाजीपाला व फुल पिकास आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे.

पिकांचे नाव	अवस्था	कृषी हवामान सल्ला
कापूस	काढणी	कुठल्याही परिस्थितीत कापसाची फरदड (खोडवा) घेऊ नये. कापूस पिकाची शेवटची वेचणी पूर्ण झाल्यावर कापूस पिकाचा पालापाचोळा, पराट्या जमा करून त्यांची योग्य विल्हेवाट लावावी.
तूर	परिपक्वता ते काढणी	काढणीस तयार असलेल्या तूर पिकाची काढणी करून घ्यावी व वाळवल्यानंतरच मळणी करावी. काढणी केलेल्या तूर पिकाची सुरक्षित ठिकाणी साठवणूक करावी.
रब्बी ज्वारी	वाढीची ते पोटरी	रब्बी ज्वारी पिकात लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी इमामेक्टीन बेन्झोएट ५ टक्के ४ ग्रॅम किंवा स्पिनेटोरम ११.७ एससी ४ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून वरील किटकनाशकांची आलटून पालटून फवारणी करावी. फवारणी करत असतांना किटकनाशक पाण्यात पडेल अशाप्रकारे फवारणी करावी. रब्बी ज्वारी पिकास आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे.
रब्बी सूर्यफूल	दाणे भरणे- पक्वता	रब्बी सूर्यफूल दाणे भरण्याच्या अवस्थेमध्ये असतांना पाणी द्यावे.
गहू	दुधाळ ते दाणे भरणे	गहू पिकास दाण्यात दुधाळ पीक अवस्था (पेरणी नंतर ८० ते ८५ दिवस) व दाणे भरताना (पेरणीनंतर ९० ते ९५ दिवस) पाणी द्यावे. गव्हाच्या पिकात उंदरांचा प्रादुर्भाव दिसून असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी झिंक फॉस्फाईड १ भाग + गुळ १ भाग + ५० भाग गव्हाचा भरडा व थोडसे गोडतेल मिसळून हे मिश्रण उंदराच्या बिळात टाकून बिळे बंद करावीत.
उन्हाळी भुईमूग	वाणांची निवड	उन्हाळी भुईमूग पिकाच्या पेरणीसाठी एस.बी.११, टी.एजी २४, एलजीएन-१, टीएलजी-४५, टीजी २६, जेएल २४, जेएल २२० या वाणांपैकी वाणाची निवड करावी. पेरणीपूर्वी बियाण्यास २५० ग्रॅम रायझोबीयम व पीएसबी प्रति १० किलो बियाण्यास बिजप्रक्रिया करावी.
केळी	वाढीची / घड वाढीची	केळी बागेस आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे. केळी बागेत घडवाढीसाठी ००:००:५० विद्राव्य खताची १५ ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. काढणीस तयार असलेल्या केळी घडांची काढणी करून घ्यावी.
आंबा	फुलधारणा	आंबा बागेत आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे. आंबा बागेत मोहोरावर भूरी रोगाचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास, याच्या व्यवस्थापनासाठी सल्फर ८० % डब्ल्यूपी २ ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
द्राक्ष	घड वाढीची	द्राक्ष बागेत रात्री सिंचन करावे. द्राक्ष बागेत भूरी रोगाच्या व्यवस्थापनासाठी हेक्झाकोनॅझोल ५ % एससी १ मिली किंवा मायक्लोब्यूटॅनिल १० % डब्ल्यूपी १० ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
सिताफळ	वाढीची	सिताफळ बागेत आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे.
भाजीपाला	वाढीची/ काढणी	भाजीपाला पिकात खूरपणी करून तण विरहीत ठेवावे व आवश्यकतेनुसार पाटाने पाणी द्यावे. काढणीस तयार असलेल्या भाजीपाला पिकाची काढणी करून घ्यावी. भाजीपाला (मिरची, वांगे व भेंडी) पिकात रसशोषण करणाऱ्या किडीचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास त्याच्या व्यवस्थापनासाठी पायरीप्रॉक्सीफेन ५% + फेनप्रोपाथ्रीन १५% १० मीली किंवा डायमेटोएट ३०% १३ मीली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
फुलशेती	वाढीची/ काढणी	फुल पिकात खूरपणी करून तण विरहीत ठेवावे व आवश्यकतेनुसार पाटाने पाणी द्यावे. काढणीस तयार असलेल्या फुल पिकाची काढणी करून घ्यावी.
पशुधन व्यवस्थापन	-----	थंडीच्या दिवसात जेव्हा थंड वारे वाहू लागतात त्या वेळेस आपल्या जनावरांचे विशेषतः शेळी आणि मेंढी यांचे थंडीपासून संरक्षण करावे. त्याकरीता त्यांच्या निवाऱ्याच्या जागेत ऊब असावी, माफक प्रमाणात हवा खेळती असावी. नाकातून पाणी येणे, भूक मंदावणे, चालण्याकरीता कष्ट होणे ई. लक्षणे दिसू लागतात पशुवैद्यकाशी त्वरीत संपर्क साधावा. सर्वसाधारणपणे बकरीच्या पिल्लांना थंडीची बाधा लवकर होते. थंडीच्या दिवसात करंडांची मरतुक टाळण्यासाठी त्यांना ऊबदार जागेत ठेवावे. मोठ्या टोपलीत कापड टाकून त्यामध्ये पिल्लांना ठेवता येऊ शकते, थंडीपासून संरक्षण होते. गोठ्यात माफक हवा असावी. शेळीचे दुध भरपूर प्रमाणात द्यावे ज्यामुळे पिल्लांच्या शरीरात ऊर्जा निर्माण होऊन थंडीपासून बाधा होणार नाही.

सदर कृषी हवामान सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.

मुख्य प्रकल्प समन्वयक
ग्रामीण कृषी मौसम सेवा
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
अखिल भारतीय समन्वयित कृषि हवामानशास्त्र संशोधन प्रकल्प
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी - ४३१ ४०२
ईमेल - amfuparbhani@gmail.com



परभणी जिल्हा कृषि हवामान सल्ला पत्रक क्रमांक - ८९/२०२५-२०२६ मंगळवार, दिनांक - ०३.०२.२०२६

मागील आठवड्यातील हवामानस्थिती (दिनांक २८ जानेवारी ते ०३ फेब्रुवारी, २०२६)							हवामान घटक		हवामान अंदाज (दिनांक ०४ ते ०८ फेब्रुवारी २०२६, साठी हवामान अंदाज)				
२८/०१	२९/०१	३०/०१	३१/०१	०१/०२	०२/०२	०३/०२	दिनांक		०४/०२	०५/०२	०६/०२	०७/०२	०८/०२
०.०	०.०	०.०	०.०	०.०	०.०	०.०	पाऊस (मिमी)		०.०	०.०	०.०	०.०	०.०
२९.२	२९.८	२९.७	२९.९	२९.६	२९.५		कमाल तापमान (अं.से)		३१.०	३२.०	३२.०	३३.०	३३.०
१६.०	१४.५	१३.५	१४.०	१२.९	११.४	१३.१	किमान तापमान (अं.से)		१८.०	१९.०	१८.०	१६.०	१५.०
ढगाळ	ढगाळ	ढगाळ	ढगाळ	ढगाळ	स्वच्छ	पूर्णतः ढगाळ	स.	ढग स्थिती (आकाश)	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ
स्वच्छ	ढगाळ	ढगाळ	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ		दु.						
८४	८५	८९	८७	८९	९३	८२	सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)		६४	६८	६३	६३	६०
४४	४१	३८	३०	२५	२८		दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)		४७	४८	४४	४३	४२
२.६	४.३	२.८	३.१	३.०	३.०	२.७	वाऱ्याचा वेग (किमी /तास)		७	११	९	७	७
पश्चिम- वायव्य	शांत	शांत	उत्तर	शांत	शांत	शांत	स.	वाऱ्याची दिशा	पूर्व-आग्नेय	पूर्व-आग्नेय	पूर्व-आग्नेय	पूर्व- आग्नेय	पूर्व- ईशान्य
पूर्व- ईशान्य	उत्तर- वायव्य	पूर्व- आग्नेय	पूर्व- ईशान्य	उत्तर- ईशान्य	पूर्व- आग्नेय		दु.						
पाऊस (मिमी) मागील आठवड्यातील					पाऊस (मिमी) ०१/०१/२०२६ पासून आजपर्यंत			पाऊस (मिमी) ०१/०६/२०२५ पासून आजपर्यंत					
०.०					०.०			११५१.२					

हवामान सारांश / चेतावनी :

प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई येथून प्राप्त झालेल्या अंदाजानुसार परभणी जिल्ह्यात पुढील पाच दिवस आकाश स्वच्छ राहून हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. परभणी जिल्ह्यात पुढील चोविस ते अठेचाळीस तासात किमान तापमानात वाढ होऊन त्यानंतर पुढील तीन दिवसात १ ते २ अं.से. ने घट होण्याची शक्यता आहे.

सामान्य सल्ला :

विस्तारीत अंदाजानुसार (ईआरएफएस) मराठवाड्यात दिनांक ०६ ते १२ फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान पाऊस सरासरीपेक्षा कमी, कमाल तापमान सरासरीपेक्षा कमी व किमान तापमान सरासरीएवढे राहण्याची शक्यता आहे.

संदर्भ : मराठवाड्यात पुढील पाच दिवस हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता लक्षात घेता पिकास, फळबागेस, भाजीपाला व फुल पिकास आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे.

पिकांचे नाव	अवस्था	कृषी हवामान सल्ला
कापूस	काढणी	कुठल्याही परिस्थितीत कापसाची फरदड (खोडवा) घेऊ नये. कापूस पिकाची शेवटची वेचणी पूर्ण झाल्यावर कापूस पिकाचा पालापाचोळा, पराट्या जमा करून त्यांची योग्य विल्हेवाट लावावी.
तूर	परिपक्वता ते काढणी	काढणीस तयार असलेल्या तूर पिकाची काढणी करून घ्यावी व वाळवल्यानंतरच मळणी करावी. काढणी केलेल्या तूर पिकची सुरक्षित ठिकाणी साठवणूक करावी.
रब्बी ज्वारी	वाढीची ते पोटरी	रब्बी ज्वारी पिकात लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी इमामेक्टीन बेन्झोएट ५ टक्के ४ ग्रॅम किंवा स्पिनेटोरम ११.७ एससी ४ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून वरील किटकनाशकांची आलटून पालटून फवारणी करावी. फवारणी करत असतांना किटकनाशक पोण्यात पडेल अशाप्रकारे फवारणी करावी. रब्बी ज्वारी पिकास आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे.
रब्बी सूर्यफुल	दाणे भरणे-पक्वता	रब्बी सूर्यफूल दाणे भरण्याच्या अवस्थेमध्ये असतांना पाणी द्यावे.
गहू	दुधाळ ते दाणे भरणे	गहू पिकास दाण्यात दुधाळ पीक अवस्था (पेरणी नंतर ८० ते ८५ दिवस) व दाणे भरताना (पेरणीनंतर ९० ते ९५ दिवस) पाणी द्यावे. गव्हाच्या पिकात उंदरांचा प्रादुर्भाव दिसून असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी झिंक फॉस्फाईड १ भाग + गुळ १ भाग + ५० भाग गव्हाचा भरडा व थोडसे गोडतेल मिसळून हे मिश्रण उंदराच्या बिळात टाकून बिळे बंद करावीत.
उन्हाळी भुईमूग	वाणांची निवड	उन्हाळी भुईमूग पिकाच्या पेरणीसाठी एस.बी.११, टीएजी २४, एलजीएन-१, टीएलजी-४५, टीजी २६, जेएल २४, जेएल २२० या वाणांपैकी वाणाची निवड करावी. पेरणीपूर्वी बियाण्यास २५० ग्रॅम रायझोबीयम व पीएसबी प्रति १० किलो बियाण्यास बिजप्रक्रिया करावी.
केळी	वाढीची / घड वाढीची	केळी बागेस आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे. केळी बागेत घडवाढीसाठी ००:००:५० विद्राव्य खताची १५ ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. काढणीस तयार असलेल्या केळी घडांची काढणी करून घ्यावी.
आंबा	फुलधारणा	आंबा बागेत आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे. आंबा बागेत मोहारावर भूरी रोगाचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास, याच्या व्यवस्थापनासाठी सल्फर ८० % डब्ल्यूपी २ ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
द्राक्ष	घड वाढीची	द्राक्ष बागेत रात्री सिंचन करावे. द्राक्ष बागेत भूरी रोगाच्या व्यवस्थापनासाठी हेक्झाकोनॅझोल ५ % एससी १ मिली किंवा मायक्लोब्यूटॅनिल १० % डब्ल्यूपी १० ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
सिताफळ	वाढीची	सिताफळ बागेत आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे.
भाजीपाला	वाढीची/काढणी	भाजीपाला पिकात खूरपणी करून तण विरहीत ठेवावे व आवश्यकतेनुसार पाटाने पाणी द्यावे. काढणीस तयार असलेल्या भाजीपाला पिकाची काढणी करून घ्यावी. भाजीपाला (मिरची, वांगे व भेंडी) पिकात रसशोषण करणाऱ्या किडीचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास त्याच्या व्यवस्थापनासाठी पायरीप्रॉक्सीफेन ५% + फेनप्रोपाथ्रीन १५% १० मीली किंवा डायमेटोएट ३०% १३ मीली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
फुलशेती	वाढीची/काढणी	फुल पिकात खूरपणी करून तण विरहीत ठेवावे व आवश्यकतेनुसार पाटाने पाणी द्यावे. काढणीस तयार असलेल्या फुल पिकाची काढणी करून घ्यावी.
पशुधन व्यवस्थापन	-----	थंडीच्या दिवसात जेव्हा थंड वारे वाहू लागतात त्या वेळेस आपल्या जनावरांचे विशेषतः शेळी आणि मेंढी यांचे थंडीपासून संरक्षण करावे. त्याकरीता त्यांच्या निवाऱ्याच्या जागेत ऊब असावी, माफक प्रमाणात हवा खेळती असावी. नाकातून पाणी येणे, भूक मंदावणे, चालण्याकरीता कष्ट होणे ई. लक्षणे दिसू लागताच पशुवैद्यकाशी त्वरीत संपर्क साधावा. सर्वसाधारणपणे बकरीच्या पिल्लांना थंडीची बाधा लवकर होते. थंडीच्या दिवसात करंडांची मरतुक टाळण्यासाठी त्यांना ऊबदार जागेत ठेवावे. मोठ्या टोपलीत कापड टाकून त्यामध्ये पिल्लांना ठेवता येऊ शकते, थंडीपासून संरक्षण होते. गोठ्यात माफक हवा असावी. शेळीचे दुध भरपूर प्रमाणात द्यावे ज्यामुळे पिल्लांच्या शरीरात ऊर्जा निर्माण होऊन थंडीपासून बाधा होणार नाही.

सदर कृषी हवामान सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.

मुख्य प्रकल्प समन्वयक
ग्रामीण कृषी मौसम सेवा
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी