



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
अखिल भारतीय समन्वयित कृषि हवामानशास्त्र संशोधन प्रकल्प
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी - ४३१ ४०२
ईमेल - amfuparbhani@gmail.com



बीड जिल्हा कृषि हवामान सल्ला पत्रक क्रमांक - १०/२०२५ - २०२६ शुक्रवार, दिनांक - ०६.०२.२०२६

मागील आठवड्यातील हवामानस्थिती (दिनांक ३१ जानेवारी ते ०६ फेब्रुवारी, २०२६)							हवामान घटक	हवामान अंदाज (दिनांक ०७ ते ११ फेब्रुवारी, २०२६ साठी हवामान अंदाज)				
३१/०१	०१/०२	०२/०२	०३/०२	०४/०२	०५/०२	०६/०२	दिनांक	०७/०२	०८/०२	०९/०२	१०/०२	११/०२
							पाऊस (मिमी)	०.०	०.०	०.०	०.०	०.०
							कमाल तापमान (अं.से)	३२.०	३२.०	३१.०	३०.०	३०.०
							किमान तापमान (अं.से)	१४.०	१४.०	१६.०	१४.०	१३.०
							स. ढग स्थिती (आकाश)	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ
							सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	७०	६५	६१	६१	६३
							दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	४१	४०	३९	३८	४१
							वाऱ्याचा वेग (किमी/तास)	७	७	१०	५	४
							स. वाऱ्याची दिशा	पूर्व	ईशान्य	पूर्व	दक्षिण- आग्नेय	उत्तर
							दु.					

हवामान सारांश / चेतावनी :

प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई येथून प्राप्त झालेल्या अंदाजानुसार बीड जिल्ह्यात पुढील पाच दिवस हवामान कोरडे राहण्याची तर दिनांक ०८ फेब्रुवारी रोजी आकाश ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. बीड जिल्ह्यात पुढील पाच दिवसात कमाल तापमानात फारशी तफावत जाणवत नाही तर किमान तापमानात पुढील ४८ तासात १ अं.से. ने घट होण्याची तर त्यानंतर २४ तासात किंचित वाढ होऊन त्यानंतर घट होण्याची शक्यता आहे.

सामान्य सल्ला :

विस्तारीत अंदाजानुसार (ईआरएफएस) मराठवाड्यात दिनांक ०६ ते १२ फेब्रुवारी २०२६ व दिनांक १३ ते १९ फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान पाऊस सरासरीपेक्षा कमी, कमाल तापमान सरासरीपेक्षा कमी व किमान तापमान सरासरीपेक्षा ते सरासरीपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे.

संदेश : मराठवाड्यात पुढील पाच दिवस हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता लक्षात घेता, पिकास, फळबागेस, भाजीपाला व फुल पिकास आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे.

पिकांचे नाव	अवस्था	कृषी हवामान सल्ला
तुर	मळणी / साठवणूक	काढणी केलेल्या तुर पिकची मळणी करून सुरक्षित ठिकाणी साठवणूक करावी.
ऊस	वाढीची / काढणी	ऊस पिकात आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे. काढणीस तयार असलेल्या ऊस पिकाची काढणी करून घ्यावी. ऊस पिकावर खोड किडीचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी क्लोरपायरीफॉस २० % २५ मिली किंवा क्लोरेंट्रानोलीप्रोल १८.५ % ४ मिली प्रति १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
हळद	कंद वाढीची / काढणीपूर्व	हळद पिकात आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे. हळद पिकाच्या काढणीस साधारणतः काढणी करण्यापूर्वी पंधरा दिवस आधी पिकाला पाणी देणे बंद करावे.
हरभरा	घाटे भरणे ते घाटे वाढीची	हरभरा पिकास आवश्यकतेनुसार तृषार सिंचन पद्धतीने पाणी द्यावे. हरभरा पिकात घाटे अळीचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास त्याच्या व्यवस्थापनासाठी शेतामध्ये इंग्रजी T आकाराचे प्रति एकर २० पक्षी थांबे लावावेत व घाटेअळीच्या सर्वेक्षणासाठी प्रति एकरी २ कामगंध सापळे लावावेत. हरभरा पिकात घाटे अळीच्या व्यवस्थापनासाठी ५ % (एनएसकेई) निंबोळी अर्क किंवा क्विनॉलफॉस २५ % इसी २० मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
करडई	बोंड वाढीची ते परिपक्वता	करडई पिकात माव्याचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास त्याच्या व्यवस्थापनासाठी डायमिथोएट ३० % १३ मिली किंवा असिफेट ७५ % १० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. करडई पिकास आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे.
उन्हाळी तीळ	पेरणी / वाणांची निवड/ बिजप्रक्रिया	उन्हाळी तीळ पिकाची पेरणी फेब्रुवारीच्या दूसऱ्या आठवड्या पर्यंत करता येते. उन्हाळी तीळ लागवडीपूर्वी बुरशीजन्य रोगाच्या बंदोबस्तासाठी पेरणीपूर्वी प्रति किलो बियाण्यास ३ ग्रॅम कार्बेन्डेझीम (बाविस्टीन) किंवा २.५ ग्रॅम थायरम किंवा ४ ग्रॅम ट्रायकोडर्माची बिज प्रक्रिया करावी. नंतर अँझॅटोफॉस २० मिली प्रति किलो बियाणे प्रमाणे चोळावे. उन्हाळी तीळ पिकाच्या पेरणीसाठी एकेटी-१०१, एकेटी-१०३, जेएलटी-४०८, एकेटी-६४, एनटी-११-११ या वाणांपैकी वाणाची निवड करावी.
संत्रा/ मोसंबी	फळवाढीची	मृग बहार संत्रा/मोसंबी बागेत फळगळ दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी जिब्रॅलिक ऑसिड १.५ ग्रॅम + चिलेटेड झिंक ५०० ग्रॅम प्रति १०० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. संत्रा/मोसंबी बागेत अंतरमशागतीची कामे करून तण नियंत्रण करावे व आवश्यकतेनुसार पाणी द्यावे.
डाळींब	फळवाढीची/ काढणी	डाळींब बागेत अंतरमशागतीची कामे करून तण नियंत्रण करावे व आवश्यकतेनुसार पाणी द्यावे. काढणीस तयार असलेल्या डाळींब फळांची काढणी करून घ्यावी.
चिक्कू	फळवाढीची / काढणी	चिक्कू बागेत अंतरमशागतीची कामे करून तण नियंत्रण करावे व आवश्यकतेनुसार पाणी द्यावे. काढणीस तयार असलेल्या चिक्कू फळांची काढणी करून घ्यावी.
भाजीपाला	वाढीची / काढणी	भाजीपाला पिकात खूरपणी करून तण विरहीत ठेवावे व आवश्यकतेनुसार पाटाने पाणी द्यावे. काढणीस तयार असलेल्या भाजीपाला पिकाची काढणी करून घ्यावी. भाजीपाला (मिरची, वांगे व भेंडी) पिकात रसशोषण करणाऱ्या किडीचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास त्याच्या व्यवस्थापनासाठी पायरीप्रॉक्सीफेन ५% + फेनप्रोपाथ्रीन १५% १० मीली किंवा डायमिथोएट ३०% १३ मीली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
फुलशेती	वाढीची/ काढणी	फुल पिकात खूरपणी करून तण विरहीत ठेवावेत व आवश्यकतेनुसार पाटाने पाणी द्यावे. काढणीस तयार असलेल्या फुलांची काढणी करून घ्यावी.
पशुधन व्यवस्थापन	-----	जनावरे आजारी पडू नयेत म्हणून पशुवैद्यकाच्या सल्ल्याने जनावरांना जंतनाशक पाजावेत व लसीकरण करून घ्यावे तसेच दर पंधरा दिवसाला गोठा व गोठ्याचा परिसरात किटकनाशकाची फवारणी करावी व गोठ्यातील खड्डा व भेगा असतील तर त्या बुजवून घ्याव्यात व गोठा व गोठ्याचा परिसर स्वच्छ ठेवावा.

सदर कृषी हवामान सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.

मुख्य प्रकल्प समन्वयक
ग्रामीण कृषी मौसम सेवा
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
अखिल भारतीय समन्वयित कृषि हवामानशास्त्र संशोधन प्रकल्प
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी - ४३१ ४०२
ईमेल - amfuparbhani@gmail.com



हिंगोली जिल्हा कृषि हवामान सल्ला पत्रक क्रमांक - १०/२०२५ - २०२६ शुक्रवार, दिनांक - ०६.०२.२०२६

मागील आठवड्यातील हवामानस्थिती (दिनांक ३१ जानेवारी ते ०६ फेब्रुवारी, २०२६)							हवामान घटक	हवामान अंदाज (दिनांक ०७ ते ११ फेब्रुवारी, २०२६ साठी हवामान अंदाज)				
३१/०१	०१/०२	०२/०२	०३/०२	०४/०२	०५/०२	०६/०२	दिनांक	०७/०२	०८/०२	०९/०२	१०/०२	११/०२
							पाऊस (मिमी)	०.०	०.०	०.०	०.०	०.०
							कमाल तापमान (अं.से)	३१.०	३२.०	३२.०	३१.०	३०.०
							किमान तापमान (अं.से)	१५.०	१५.०	१७.०	१५.०	१६.०
							स. ढग स्थिती	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ
							दु. (आकाश)					
							सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	७२	६९	६३	६०	६२
							दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	४८	४७	४५	४५	४५
							वाऱ्याचा वेग (किमी /तास)	५	८	१२	७	७
							स. वाऱ्याची दिशा	ईशान्य	ईशान्य	पूर्व-ईशान्य	पूर्व-आग्नेय	दक्षिण
							दु.					

हवामान सारांश / चेतावनी :

प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई येथून प्राप्त झालेल्या अंदाजानुसार हिंगोली जिल्ह्यात पुढील पाच दिवस हवामान कोरडे राहण्याची तर दिनांक ०८ फेब्रुवारी रोजी आकाश ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. हिंगोली जिल्ह्यात पुढील पाच दिवसात कमाल तापमानात फारशी तफावत जाणवत नाही तर किमान तापमानात पुढील ४८ तासात १ अं.से. ने घट होण्याची तर त्यानंतर २४ तासात किंचित वाढ होऊन त्यानंतर घट होण्याची शक्यता आहे.

सामान्य सल्ला :

विस्तारीत अंदाजानुसार (ईआरएफएस) मराठवाड्यात दिनांक ०६ ते १२ फेब्रुवारी २०२६ व दिनांक १३ ते १९ फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान पाऊस सरासरीपेक्षा कमी, कमाल तापमान सरासरीपेक्षा कमी व किमान तापमान सरासरीपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे.

संदेश : मराठवाड्यात पुढील पाच दिवस हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता लक्षात घेता, पिकास, फळबागेस, भाजीपाला व फुल पिकास आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे.

पिकांचे नाव	अवस्था	कृषी हवामान सल्ला
तुर	मळणी / साठवणूक	काढणी केलेल्या तुर पिकची मळणी करून सुरक्षित ठिकाणी साठवणूक करावी.
ऊस	वाढीची / काढणी	ऊस पिकात आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे. काढणीस तयार असलेल्या ऊस पिकाची काढणी करून घ्यावी. ऊस पिकावर खोड किडीचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी क्लोरपायरीफॉस २० % २५ मिली किंवा क्लोरेंट्रानोलीप्रोल १८.५ % ४ मिली प्रति १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
हळद	कंद वाढीची / काढणीपूर्व	हळद पिकात आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे. हळद पिकाच्या काढणीस साधारणतः काढणी करण्यापूर्वी पंधरा दिवस आधी पिकाला पाणी देणे बंद करावे.
हरभरा	घाटे भरणे ते घाटे वाढीची	हरभरा पिकास आवश्यकतेनुसार तृषार सिंचन पद्धतीने पाणी द्यावे. हरभरा पिकात घाटे अळीचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास त्याच्या व्यवस्थानासाठी शेतामध्ये इंग्रजी T आकाराचे प्रति एकर २० पक्षी थांबे लावावेत व घाटेअळीच्या सर्वेक्षणासाठी प्रति एकरी २ कामगंध सापळे लावावेत. हरभरा पिकात घाटे अळीच्या व्यवस्थानासाठी ५ % (एनएसकेई) निंबोळी अर्क किंवा क्विनॉलफॉस २५ % इसी २० मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
करडई	बोंड वाढीची ते परिपक्वता	करडई पिकात माव्याचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास त्याच्या व्यवस्थापनासाठी डायमिथोएट ३० % १३ मिली किंवा असिफेट ७५ % १० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. करडई पिकास आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे.
उन्हाळी तीळ	पेरणी / वाणांची निवड/ बिजप्रक्रिया	उन्हाळी तीळ पिकाची पेरणी फेब्रुवारीच्या दूसऱ्या आठवड्या पर्यंत करता येते. उन्हाळी तीळ लागवडीपूर्वी बुरशीजन्य रोगाच्या बंदोबस्तासाठी पेरणीपूर्वी प्रति किलो बियाण्यास ३ ग्रॅम कार्बेन्डेझीम (बाविस्टीन) किंवा २.५ ग्रॅम थायरम किंवा ४ ग्रॅम ट्रायकोडर्माची बिज प्रक्रिया करावी. नंतर अँझिटोफॉस २० मिली प्रति किलो बियाणे प्रमाणे चोळावे. उन्हाळी तीळ पिकाच्या पेरणीसाठी एकेटी-१०१, एकेटी-१०३, जेएलटी-४०८, एकेटी-६४, एनटी-११-११ या वाणांपैकी वाणाची निवड करावी.
संत्रा/ मोसंबी	फळवाढीची	मृग बहार संत्रा/मोसंबी बागेत फळगळ दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी जिब्रॅलिक ऑसिड १.५ ग्रॅम + चिलेटेड झिंक ५०० ग्रॅम प्रति १०० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. संत्रा/मोसंबी बागेत अंतरमशागतीची कामे करून तण नियंत्रण करावे व आवश्यकतेनुसार पाणी द्यावे.
डाळींब	फळवाढीची/ काढणी	डाळींब बागेत अंतरमशागतीची कामे करून तण नियंत्रण करावे व आवश्यकतेनुसार पाणी द्यावे. काढणीस तयार असलेल्या डाळींब फळांची काढणी करून घ्यावी.
चिकू	फळवाढीची / काढणी	चिकू बागेत अंतरमशागतीची कामे करून तण नियंत्रण करावे व आवश्यकतेनुसार पाणी द्यावे. काढणीस तयार असलेल्या चिकू फळांची काढणी करून घ्यावी.
भाजीपाला	वाढीची / काढणी	भाजीपाला पिकात खूरपणी करून तण विरहीत ठेवावे व आवश्यकतेनुसार पाटाने पाणी द्यावे. काढणीस तयार असलेल्या भाजीपाला पिकाची पिकाची काढणी करून घ्यावी. भाजीपाला (मिरची, वांगे व भेंडी) पिकात रसशोषण करणाऱ्या किडीचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास त्याच्या व्यवस्थापनासाठी पायरीप्रॉक्सीफेन ५% + फेनप्रोपाथ्रीन १५% १० मीली किंवा डायमिथोएट ३०% १३ मीली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
फुलशेती	वाढीची/ काढणी	फुल पिकात खूरपणी करून तण विरहीत ठेवावेत व आवश्यकतेनुसार पाटाने पाणी द्यावे. काढणीस तयार असलेल्या फुलांची काढणी करून घ्यावी.
पशुधन व्यवस्थापन	-----	जनावरे आजारी पडू नयेत म्हणून पशुवैद्यकाच्या सल्ल्याने जनावरांना जंतनाशक पाजावेत व लसीकरण करून घ्यावे तसेच दर पंधरा दिवसाला गोठा व गोठ्याचा परिसरात किटकनाशकाची फवारणी करावी व गोठ्यातील खड्डा व भेगा असतील तर त्या बुजवून घ्याव्यात व गोठा व गोठ्याचा परिसर स्वच्छ ठेवावा.

सदर कृषी हवामान सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.

मुख्य प्रकल्प समन्वयक
ग्रामीण कृषी मौसम सेवा
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
अखिल भारतीय समन्वयित कृषि हवामानशास्त्र संशोधन प्रकल्प
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी - ४३१ ४०२
ईमेल - amfuparbhani@gmail.com



जालना जिल्हा कृषि हवामान सल्ला पत्रक क्रमांक - १०/२०२५ - २०२६

शुक्रवार, दिनांक - ०६.०२.२०२६

मागील आठवड्यातील हवामानस्थिती (दिनांक ३१ जानेवारी ते ०६ फेब्रुवारी, २०२६)							हवामान घटक	हवामान अंदाज (दिनांक ०७ ते ११ फेब्रुवारी, २०२६ साठी हवामान अंदाज)				
३१/०१	०१/०२	०२/०२	०३/०२	०४/०२	०५/०२	०६/०२	दिनांक	०७/०२	०८/०२	०९/०२	१०/०२	११/०२
							पाऊस (मिमी)	०.०	०.०	०.०	०.०	०.०
							कमाल तापमान (अं.से)	३१.०	३२.०	३१.०	३०.०	३१.०
							किमान तापमान (अं.से)	१५.०	१४.०	१६.०	१४.०	१४.०
							स. ढग स्थिती	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ
							दु. (आकाश)					
							सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	५३	५२	५०	४९	५१
							दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	२८	२५	२१	२१	२१
							वाऱ्याचा वेग (किमी /तास)	५	७	१०	४	४
							स. वाऱ्याची दिशा	पूर्व	ईशान्य	पूर्व	दक्षिण	उत्तर
							दु.					

हवामान सारांश / चेतावनी :

प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई येथून प्राप्त झालेल्या अंदाजानुसार जालना जिल्ह्यात पुढील पाच दिवस हवामान कोरडे राहण्याची तर दिनांक ०८ फेब्रुवारी रोजी आकाश ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. जालना जिल्ह्यात पुढील पाच दिवसात कमाल तापमानात फारशी तफावत जाणवत नाही तर किमान तापमानात पुढील ४८ तासात १ अं.से. ने घट होण्याची तर त्यानंतर २४ तासात किंचित वाढ होऊन त्यानंतर घट होण्याची शक्यता आहे.

सामान्य सल्ला :

विस्तारीत अंदाजानुसार (ईआरएफएस) मराठवाड्यात दिनांक ०६ ते १२ फेब्रुवारी २०२६ व दिनांक १३ ते १९ फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान पाऊस सरासरीपेक्षा कमी, कमाल तापमान सरासरीपेक्षा कमी व किमान तापमान सरासरीएवढे ते सरासरीपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे.

संदेश : मराठवाड्यात पुढील पाच दिवस हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता लक्षात घेता, पिकास, फळबागेस, भाजीपाला व फुल पिकास आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे.

पिकाचे नाव	अवस्था	कृषी हवामान सल्ला
तुर	मळणी / साठवणूक	काढणी केलेल्या तुर पिकची मळणी करून सुरक्षित ठिकाणी साठवणूक करावी.
ऊस	वाढीची / काढणी	ऊस पिकात आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे. काढणीस तयार असलेल्या ऊस पिकाची काढणी करून घ्यावी. ऊस पिकावर खोड किडीचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी क्लोरपायरीफॉस २० % २५ मिली किंवा क्लोरेंट्रानोलीप्रोल १८.५ % ४ मिली प्रति १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
हळद	कंद वाढीची / काढणीपूर्व	हळद पिकात आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे. हळद पिकाच्या काढणीस साधारणतः काढणी करण्यापूर्वी पंधरा दिवस आधी पिकाला पाणी देणे बंद करावे.
हरभरा	घाटे भरणे ते घाटे वाढीची	हरभरा पिकास आवश्यकतेनुसार तृषार सिंचन पद्धतीने पाणी द्यावे. हरभरा पिकात घाटे अळीचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास त्याच्या व्यवस्थापनासाठी शेतामध्ये इंग्रजी T आकाराचे प्रति एकर २० पक्षी थांबे लावावेत व घाटेअळीच्या सर्वेक्षणासाठी प्रति एकरी २ कामगंध सापळे लावावेत. हरभरा पिकात घाटे अळीच्या व्यवस्थापनासाठी ५ % (एनएसकेई) निंबोळी अर्क किंवा क्विनॉलफॉस २५ % इसी २० मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
करडई	बोड वाढीची ते परिपक्वता	करडई पिकात माव्याचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास त्याच्या व्यवस्थापनासाठी डायमिथोएट ३० % १३ मिली किंवा असिफेट ७५ % १० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. करडई पिकास आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे.
उन्हाळी तीळ	पेरणी / वाणांची निवड/ बिजप्रक्रिया	उन्हाळी तीळ पिकाची पेरणी फेब्रुवारीच्या दूसऱ्या आठवड्या पर्यंत करता येते. उन्हाळी तीळ लागवडीपूर्वी बुरशीजन्य रोगाच्या बंदोबस्तासाठी पेरणीपूर्वी प्रति किलो बियाण्यास ३ ग्रॅम कार्बेन्डेझीम (बाविस्टीन) किंवा २.५ ग्रॅम थायरम किंवा ४ ग्रॅम ट्रायकोडर्माची बिज प्रक्रिया करावी. नंतर अँझॅटोफॉस २० मिली प्रति किलो बियाणे प्रमाणे चोळावे. उन्हाळी तीळ पिकाच्या पेरणीसाठी एकेटी-१०१, एकेटी-१०३, जेएलटी-४०८, एकेटी-६४, एनटी-११-११ या वाणांपैकी वाणाची निवड करावी.
संत्रा/ मोसंबी	फळवाढीची	मृग बहार संत्रा/मोसंबी बागेत फळगळ दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी जिब्रॅलिक अॅसिड १.५ ग्रॅम + चिलेटेड झिंक ५०० ग्रॅम प्रति १०० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. संत्रा/मोसंबी बागेत अंतरमशागतीची कामे करून तण नियंत्रण करावे व आवश्यकतेनुसार पाणी द्यावे.
डाळींब	फळवाढीची/ काढणी	डाळींब बागेत अंतरमशागतीची कामे करून तण नियंत्रण करावे व आवश्यकतेनुसार पाणी द्यावे. काढणीस तयार असलेल्या डाळींब फळांची काढणी करून घ्यावी.
चिक्कू	फळवाढीची / काढणी	चिक्कू बागेत अंतरमशागतीची कामे करून तण नियंत्रण करावे व आवश्यकतेनुसार पाणी द्यावे. काढणीस तयार असलेल्या चिक्कू फळांची काढणी करून घ्यावी.
भाजीपाला	वाढीची / काढणी	भाजीपाला पिकात खूरपणी करून तण विरहीत ठेवावे व आवश्यकतेनुसार पाटाने पाणी द्यावे. काढणीस तयार असलेल्या भाजीपाला पिकाची पिकाची काढणी करून घ्यावी. भाजीपाला (मिरची, वांगे व भेंडी) पिकात रसशोषण करणाऱ्या किडीचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास त्याच्या व्यवस्थापनासाठी पायरीप्रॉक्सीफेन ५% + फेनप्रोपाथ्रीन १५% १० मीली किंवा डायमिथोएट ३०% १३ मीली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
फुलशेती	वाढीची/ काढणी	फुल पिकात खूरपणी करून तण विरहीत ठेवावेत व आवश्यकतेनुसार पाटाने पाणी द्यावे. काढणीस तयार असलेल्या फुलांची काढणी करून घ्यावी.
पशुधन व्यवस्थापन	-----	जनावरे आजारी पडू नयेत म्हणून पशुवैद्यकाच्या सल्ल्याने जनावरांना जंतनाशक पाजावेत व लसीकरण करून घ्यावे तसेच दर पंधरा दिवसाला गोठा व गोठ्याचा परिसरात किटकनाशकाची फवारणी करावी व गोठ्यातील खड्डा व भेगा असतील तर त्या बुजवून घ्याव्यात व गोठा व गोठ्याचा परिसर स्वच्छ ठेवावा.

सदर कृषी हवामान सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.

मुख्य प्रकल्प समन्वयक
 ग्रामीण कृषी मौसम सेवा
 वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
अखिल भारतीय समन्वयित कृषि हवामानशास्त्र संशोधन प्रकल्प
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी - ४३१ ४०२
ईमेल - amfuparbhani@gmail.com



लातूर जिल्हा कृषि हवामान सल्ला पत्रक क्रमांक - १०/२०२५ - २०२६

शुक्रवार, दिनांक - ०६.०२.२०२६

मागील आठवड्यातील हवामानस्थिती (दिनांक ३१ जानेवारी ते ०६ फेब्रुवारी, २०२६)							हवामान घटक	हवामान अंदाज (दिनांक ०७ ते ११ फेब्रुवारी, २०२६ साठी हवामान अंदाज)				
३१/०१	०१/०२	०२/०२	०३/०२	०४/०२	०५/०२	०६/०२	दिनांक	०७/०२	०८/०२	०९/०२	१०/०२	११/०२
							पाऊस (मिमी)	०.०	०.०	०.०	०.०	०.०
							कमाल तापमान (अं.सें)	३१.०	३१.०	३०.०	३१.०	३१.०
							किमान तापमान (अं.सें)	१५.०	१५.०	१७.०	१८.०	१६.०
							स. ढग स्थिती	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ
							दु. (आकाश)					
							सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	७१	६३	५६	५७	६०
							दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	४२	४१	४०	४१	४२
							वाऱ्याचा वेग (किमी /तास)	१०	६	९	१२	१०
							स. वाऱ्याची दिशा	पूर्व-आग्नेय	पूर्व-आग्नेय	उत्तर	आग्नेय	दक्षिण
							दु.					

हवामान सारांश / चेतावनी :

प्रादेशिक हवामान केंद्र , मुंबई येथून प्राप्त झालेल्या अंदाजानुसार लातूर जिल्ह्यात पुढील पाच दिवस हवामान कोरडे राहण्याची तर दिनांक ०८ फेब्रुवारी रोजी आकाश ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. लातूर जिल्ह्यात पुढील पाच दिवसात कमाल तापमानात फारशी तफावत जाणवत नाही तर किमान तापमानात पुढील ४८ तासात १ अं.से. ने घट होण्याची तर त्यानंतर २४ तासात किंचित वाढ होऊन त्यानंतर घट होण्याची शक्यता आहे.

सामान्य सल्ला :

विस्तारीत अंदाजानुसार (ईआरएफएस) मराठवाड्यात दिनांक ०६ ते १२ फेब्रुवारी २०२६ व दिनांक १३ ते १९ फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान पाऊस सरासरीपेक्षा कमी, कमाल तापमान सरासरीपेक्षा कमी व किमान तापमान सरासरीएवढे ते सरासरीपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे.

संदेश : मराठवाड्यात पुढील पाच दिवस हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता लक्षात घेता, पिकास, फळबागेस, भाजीपाला व फुल पिकास आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे.

पिकांचे नाव	अवस्था	कृषी हवामान सल्ला
तूर	मळणी / साठवणूक	काढणी केलेल्या तूर पिकची मळणी करून सुरक्षित ठिकाणी साठवणूक करावी.
ऊस	वाढीची / काढणी	ऊस पिकात आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे. काढणीस तयार असलेल्या ऊस पिकाची काढणी करून घ्यावी. ऊस पिकावर खोड किडीचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी क्लोरपायरीफॉस २० % २५ मिली किंवा क्लोरेंट्रानोलीप्रोल १८.५ % ४ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
हळद	कंद वाढीची / काढणीपूर्व	हळद पिकात आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे. हळद पिकाच्या काढणीस साधारणतः काढणी करण्यापूर्वी पंधरा दिवस आधी पिकाला पाणी देणे बंद करावे.
हरभरा	घाटे भरणे ते घाटे वाढीची	हरभरा पिकास आवश्यकतेनुसार तूषार सिंचन पद्धतीने पाणी द्यावे. हरभरा पिकात घाटे अळीचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास त्याच्या व्यवस्थापनासाठी शेतामध्ये इंग्रजी T आकाराचे प्रति एकर २० पक्षी थांबे लावावेत व घाटेअळीच्या सर्वेक्षणासाठी प्रति एकरी २ कामगंध सापळे लावावेत. हरभरा पिकात घाटे अळीच्या व्यवस्थापनासाठी ५ % (एनएसकेई) निंबोळी अर्क किंवा क्विनालफॉस २५ % इसी २० मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
करडई	बोंड वाढीची ते परिपक्वता	करडई पिकात माव्याचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास त्याच्या व्यवस्थापनासाठी डायमिथोएट ३० % १३ मिली किंवा असिफेट ७५ % १० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. करडई पिकास आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे.
उन्हाळी तीळ	पेरणी / वाणांची निवड/ बिजप्रक्रिया	उन्हाळी तीळ पिकाची पेरणी फेब्रुवारीच्या दूसऱ्या आठवड्या पर्यंत करता येते. उन्हाळी तीळ लागवडीपूर्वी बुरशीजन्य रोगाच्या बंदोबस्तासाठी पेरणीपूर्वी प्रति किलो बियाण्यास ३ ग्रॅम कार्बेन्डेझीम (बाविस्टीन) किंवा २.५ ग्रॅम थायरम किंवा ४ ग्रॅम ट्रायकोडर्माची बिज प्रक्रिया करावी. नंतर अँटॅगोफॉस २० मिली प्रति किलो बियाणे प्रमाणे चोळावे. उन्हाळी तीळ पिकाच्या पेरणीसाठी एकेटी-१०१, एकेटी-१०३, जेएलटी-४०८, एकेटी-६४, एनटी-११-११ या वाणांपैकी वाणाची निवड करावी.
संत्रा/ मोसंबी	फळवाढीची	मृग बहार संत्रा/मोसंबी बागेत फळगळ दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी जिब्रॅलिक ऑसिड १.५ ग्रॅम + चिलेटेड झिंक ५०० ग्रॅम प्रति १०० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. संत्रा/मोसंबी बागेत अंतरमशागतीची कामे करून तण नियंत्रण करावे व आवश्यकतेनुसार पाणी द्यावे.
डाळींब	फळवाढीची/ काढणी	डाळींब बागेत अंतरमशागतीची कामे करून तण नियंत्रण करावे व आवश्यकतेनुसार पाणी द्यावे. काढणीस तयार असलेल्या डाळींब फळांची काढणी करून घ्यावी.
चिकू	फळवाढीची / काढणी	चिकू बागेत अंतरमशागतीची कामे करून तण नियंत्रण करावे व आवश्यकतेनुसार पाणी द्यावे. काढणीस तयार असलेल्या चिकू फळांची काढणी करून घ्यावी.
भाजीपाला	वाढीची / काढणी	भाजीपाला पिकात खूरपणी करून तण विरहीत ठेवावे व आवश्यकतेनुसार पाटाने पाणी द्यावे. काढणीस तयार असलेल्या भाजीपाला पिकाची पिकाची काढणी करून घ्यावी. भाजीपाला (मिरची, वांगे व भेंडी) पिकात रसशोषण करणाऱ्या किडीचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास त्याच्या व्यवस्थापनासाठी पायरीप्रॉक्सीफेन ५ % + फेनप्रोपाथ्रीन १५ % १० मीली किंवा डायमिथोएट ३० % १३ मीली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
फुलशेती	वाढीची/ काढणी	फुल पिकात खूरपणी करून तण विरहीत ठेवावेत व आवश्यकतेनुसार पाटाने पाणी द्यावे. काढणीस तयार असलेल्या फुलांची काढणी करून घ्यावी.
पशुधन व्यवस्थापन	-----	जनावरे आजारी पडू नयेत म्हणून पशुवैद्यकाच्या सल्ल्याने जनावरांना जंतनाशक पाजावेत व लसीकरण करून घ्यावे तसेच दर पंधरा दिवसाला गोठा व गोठ्याचा परिसरात किटकनाशकाची फवारणी करावी व गोठ्यातील खड्डा व भेगा असतील तर त्या बुजवून घ्याव्यात व गोठा व गोठ्याचा परिसर स्वच्छ ठेवावा.

सदर कृषी हवामान सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.

मुख्य प्रकल्प समन्वयक
 ग्रामीण कृषी मौसम सेवा
 वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
अखिल भारतीय समन्वयित कृषि हवामानशास्त्र संशोधन प्रकल्प
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी - ४३१ ४०२
ईमेल - amfuparbhani@gmail.com



नांदेड जिल्हा कृषि हवामान सल्ला पत्रक क्रमांक - १०/२०२५ - २०२६

शुक्रवार, दिनांक - ०६.०२.२०२६

मागील आठवड्यातील हवामानस्थिती (दिनांक ३१ जानेवारी ते ०६ फेब्रुवारी, २०२६)							हवामान घटक	हवामान अंदाज (दिनांक ०७ ते ११ फेब्रुवारी, २०२६ साठी हवामान अंदाज)				
३१/०१	०१/०२	०२/०२	०३/०२	०४/०२	०५/०२	०६/०२	दिनांक	०७/०२	०८/०२	०९/०२	१०/०२	११/०२
							पाऊस (मिमी)	०.०	०.०	०.०	०.०	०.०
							कमाल तापमान (अं.से)	३३.०	३२.०	३१.०	३१.०	३१.०
							किमान तापमान (अं.से)	१५.०	१४.०	१५.०	१६.०	१६.०
							स. ढग स्थिती (आकाश)	स्वच्छ	अंशतः ढगाळ	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ
							सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	७२	६९	६०	५८	६१
							दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	४८	४७	४४	४४	४५
							वाऱ्याचा वेग (किमी /तास)	४	२	७	६	७
							स. वाऱ्याची दिशा	पूर्व	उत्तर-ईशान्य	पूर्व-ईशान्य	आग्नेय	आग्नेय
							दु.					

हवामान सारांश / चेतावनी :

प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई येथून प्राप्त झालेल्या अंदाजानुसार नांदेड जिल्ह्यात पुढील पाच दिवस हवामान कोरडे राहण्याची तर दिनांक ०८ फेब्रुवारी रोजी आकाश ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. नांदेड जिल्ह्यात पुढील पाच दिवसात कमाल तापमानात फारशी तफावत जाणवत नाही तर किमान तापमानात पुढील ४८ तासात १ अं.से. ने घट होण्याची तर त्यानंतर २४ तासात किंचित वाढ होऊन त्यानंतर घट होण्याची शक्यता आहे.

सामान्य सल्ला :

विस्तारीत अंदाजानुसार (ईआरएफएस) मराठवाड्यात दिनांक ०६ ते १२ फेब्रुवारी २०२६ व दिनांक १३ ते १९ फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान पाऊस सरासरीपेक्षा कमी, कमाल तापमान सरासरीपेक्षा कमी व किमान तापमान सरासरीपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे.

संदेश : मराठवाड्यात पुढील पाच दिवस हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता लक्षात घेता, पिकास, फळबागेस, भाजीपाला व फुल पिकास आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे.

पिकांचे नाव	अवस्था	कृषी हवामान सल्ला
तुर	मळणी / साठवणूक	काढणी केलेल्या तुर पिकची मळणी करून सुरक्षित ठिकाणी साठवणूक करावी.
ऊस	वाढीची / काढणी	ऊस पिकात आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे. काढणीस तयार असलेल्या ऊस पिकाची काढणी करून घ्यावी. ऊस पिकावर खोड किडीचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी क्लोरपायरीफॉस २० % २५ मिली किंवा क्लोरेंट्रानोलीप्रोल १८.५ % ४ मिली प्रति १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
हळद	कंद वाढीची / काढणीपूर्व	हळद पिकात आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे. हळद पिकाच्या काढणीस साधारणतः काढणी करण्यापूर्वी पंधरा दिवस आधी पिकाला पाणी देणे बंद करावे.
हरभरा	घाटे भरणे ते घाटे वाढीची	हरभरा पिकास आवश्यकतेनुसार तृषार सिंचन पद्धतीने पाणी द्यावे. हरभरा पिकात घाटे अळीचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास त्याच्या व्यवस्थापनासाठी शेतामध्ये इंग्रजी T आकाराचे प्रति एकर २० पक्षी थांबे लावावेत व घाटेअळीच्या सर्वेक्षणासाठी प्रति एकरी २ कामगंध सापळे लावावेत. हरभरा पिकात घाटे अळीच्या व्यवस्थापनासाठी ५ % (एनएसकेई) निंबोळी अर्क किंवा क्विनॉलफॉस २५ % इसी २० मिली प्रति १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
करडई	बोड वाढीची ते परिपक्वता	करडई पिकात माव्याचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास त्याच्या व्यवस्थापनासाठी डायमिथोएट ३० % १३ मिली किंवा असिफेट ७५ % १० ग्रॅम प्रति १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. करडई पिकास आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे.
उन्हाळी तीळ	पेरणी / वाणांची निवड/ बिजप्रक्रिया	उन्हाळी तीळ पिकाची पेरणी फेब्रुवारीच्या दूसऱ्या आठवड्या पर्यंत करता येते. उन्हाळी तीळ लागवडीपूर्वी बुरशीजन्य रोगाच्या बंदोबस्तासाठी पेरणीपूर्वी प्रति किलो बियाण्यास ३ ग्रॅम कार्बेन्डेझीम (बाविस्टीन) किंवा २.५ ग्रॅम थायरम किंवा ४ ग्रॅम ट्रायकोडर्माची बिज प्रक्रिया करावी. नंतर अॅझॅटोफॉस २० मिली प्रति किलो बियाणे प्रमाणे चोळावे. उन्हाळी तीळ पिकाच्या पेरणीसाठी एकेटी-१०१, एकेटी-१०३, जेएलटी-४०८, एकेटी-६४, एनटी-११-११ या वाणांपैकी वाणाची निवड करावी.
संत्रा/ मोसंबी	फळवाढीची	मृग बहार संत्रा/मोसंबी बागेत फळगळ दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी जिब्रॅलिक अॅसिड १.५ ग्रॅम + चिलेटेड झिंक ५०० ग्रॅम प्रति १०० लीटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. संत्रा/मोसंबी बागेत अंतरमशागतीची कामे करून तण नियंत्रण करावे व आवश्यकतेनुसार पाणी द्यावे.
डाळींब	फळवाढीची/ काढणी	डाळींब बागेत अंतरमशागतीची कामे करून तण नियंत्रण करावे व आवश्यकतेनुसार पाणी द्यावे. काढणीस तयार असलेल्या डाळींब फळांची काढणी करून घ्यावी.
चिक्कू	फळवाढीची / काढणी	चिक्कू बागेत अंतरमशागतीची कामे करून तण नियंत्रण करावे व आवश्यकतेनुसार पाणी द्यावे. काढणीस तयार असलेल्या चिक्कू फळांची काढणी करून घ्यावी.
भाजीपाला	वाढीची / काढणी	भाजीपाला पिकात खूरपणी करून तण विरहीत ठेवावे व आवश्यकतेनुसार पाटाने पाणी द्यावे. काढणीस तयार असलेल्या भाजीपाला पिकाची पिकाची काढणी करून घ्यावी. भाजीपाला (मिरची, वांगे व भेंडी) पिकात रसशोषण करणाऱ्या किडीचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास त्याच्या व्यवस्थापनासाठी पायरीप्रॉक्सीफेन ५% + फेनप्रोपाथ्रीन १५% १० मीली किंवा डायमिथोएट ३०% १३ मीली प्रति १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
फुलशेती	वाढीची/ काढणी	फुल पिकात खूरपणी करून तण विरहीत ठेवावेत व आवश्यकतेनुसार पाटाने पाणी द्यावे. काढणीस तयार असलेल्या फुलांची काढणी करून घ्यावी.
पशुधन व्यवस्थापन	-----	जनावरे आजारी पडू नयेत म्हणून पशुवैद्यकाच्या सल्ल्याने जनावरांना जंतनाशक पाजावेत व लसीकरण करून घ्यावे तसेच दर पंधरा दिवसाला गोठा व गोठ्याचा परिसरात किटकनाशकाची फवारणी करावी व गोठ्यातील खड्डा व भेगा असतील तर त्या बुजवून घ्याव्यात व गोठा व गोठ्याचा परिसर स्वच्छ ठेवावा.

सदर कृषी हवामान सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.

मुख्य प्रकल्प समन्वयक
 ग्रामीण कृषी मौसम सेवा
 वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
अखिल भारतीय समन्वयित कृषि हवामानशास्त्र संशोधन प्रकल्प
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी — ४३१ ४०२
ईमेल - amfuparbhani@gmail.com



परभणी जिल्हा कृषि हवामान सल्ला पत्रक क्रमांक — १०/२०२५ - २०२६ शुक्रवार, दिनांक — ०६.०२.२०२६

मागील आठवड्यातील हवामानस्थिती (दिनांक ३१ जानेवारी ते ०६ फेब्रुवारी, २०२६)							हवामान घटक		हवामान अंदाज (दिनांक ०७ ते ११ फेब्रुवारी, २०२६ साठी हवामान अंदाज)				
३१/०१	०१/०२	०२/०२	०३/०२	०४/०२	०५/०२	०६/०२	दिनांक		०७/०२	०८/०२	०९/०२	१०/०२	११/०२
०.०	०.०	०.०	०.०	०.०	०.०	०.०	पाऊस (मिमी)		०.०	०.०	०.०	०.०	०.०
२९.९	२९.६	२९.५	३०.२	२९.२	३०.०		कमाल तापमान (अं.से)		३१.०	३२.०	३२.०	३१.०	३०.०
१४.०	१२.९	११.४	१३.१	१३.०	११.५	११.५	किमान तापमान (अं.से)		१५.०	१५.०	१७.०	१५.०	१६.०
ढगाळ	ढगाळ	स्वच्छ	पूर्णतः ढगाळ	ढगाळ	अंशतः ढगाळ	ढगाळ	स.	दग स्थिती (आकाश)	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ
स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ	अंशतः ढगाळ	अंशतः ढगाळ	स्वच्छ		दु.						
८७	८९	९३	८२	८४	९०	८६	सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)		७२	६७	६०	५९	५९
३०	२५	२८	३४	३७	२७		दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)		४८	४८	४६	४६	४७
३.१	३.०	३.०	२.७	२.७	२.९	२.७	वाऱ्याचा वेग (किमी /तास)		६	६	९	९	४
उत्तर	शांत	शांत	शांत	शांत	शांत	पश्चिम	स.	वाऱ्याची दिशा	पूर्व-आग्नेय	ईशान्य	पूर्व-ईशान्य	आग्नेय	पूर्व
पूर्व-ईशान्य	उत्तर-ईशान्य	पूर्व-आग्नेय	पूर्व-ईशान्य	पूर्व-ईशान्य	उत्तर-ईशान्य		दु.						
पाऊस (मिमी) मागील आठवड्यातील						पाऊस (मिमी) ०१/०१/२०२६ पासून आजपर्यंत			पाऊस (मिमी) ०१/०६/२०२५ पासून आजपर्यंत				
०.०						०.०			११५१.२				
हवामान सारांश / चेतावनी : प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई येथून प्राप्त झालेल्या अंदाजानुसार परभणी जिल्ह्यात पुढील पाच दिवस हवामान कोरडे राहण्याची तर दिनांक ०८ फेब्रुवारी रोजी आकाश ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. परभणी जिल्ह्यात पुढील पाच दिवसात कमाल तापमानात फारशी तफावत जाणवत नाही तर किमान तापमानात पुढील ४८ तासात १ अं.से. ने घट होण्याची तर त्यानंतर २४ तासात किंचित वाढ होऊन त्यानंतर घट होण्याची शक्यता आहे.													
सामान्य सल्ला : विस्तारीत अंदाजानुसार (ईआरएफएस) मराठवाड्यात दिनांक ०६ ते १२ फेब्रुवारी २०२६ व दिनांक १३ ते १९ फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान पाऊस सरासरीपेक्षा कमी, कमाल तापमान सरासरीपेक्षा कमी व किमान तापमान सरासरीएवढे ते सरासरीपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे.													
संदेश : मराठवाड्यात पुढील पाच दिवस हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता लक्षात घेता, पिकास, फळबागेस, भाजीपाला व फुल पिकास आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे.													
पिकांचे नाव	अवस्था	कृषी हवामान सल्ला											
तुर	मळणी / साठवणूक	काढणी केलेल्या तूर पिकची मळणी करून सुरक्षित ठिकाणी साठवणूक करावी.											
ऊस	वाढीची / काढणी	ऊस पिकात आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे. काढणीस तयार असलेल्या ऊस पिकाची काढणी करून घ्यावी. ऊस पिकावर खोड किडीचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी क्लोरपायरीफॉस २० % २५ मिली किंवा क्लोरंट्रानोलीप्रोल १८.५ % ४ मिली प्रति १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.											
हळद	कंद वाढीची / काढणीपूर्व	हळद पिकात आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे. हळद पिकाच्या काढणीस साधारणतः काढणी करण्यापूर्वी पंधरा दिवस आधी पिकाला पाणी देणे बंद करावे.											
हरभरा	घाटे भरणे ते घाटे वाढीची	हरभरा पिकास आवश्यकतेनुसार तूषार सिंचन पद्धतीने पाणी द्यावे. हरभरा पिकात घाटे अळीचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास त्याच्या व्यवस्थापनासाठी शेतामध्ये इंग्रजी T आकाराचे प्रति एकर २० पक्षी थांबे लावावेत व घाटेअळीच्या सर्वेक्षणासाठी प्रति एकरी २ कामगंध सापळे लावावेत. हरभरा पिकात घाटे अळीच्या व्यवस्थापनासाठी ५ % (एनएसकेई) निंबोळी अर्क किंवा क्विनॉलफॉस २५ % इसी २० मिली प्रति १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.											
करडई	बोंड वाढीची ते परिपक्वता	करडई पिकात माव्याचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास त्याच्या व्यवस्थापनासाठी डायमिथोएट ३० % १३ मिली किंवा असिफेट ७५ % १० ग्रॅम प्रति १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. करडई पिकास आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे.											
उन्हाळी तीळ	पेरणी / वाणांची निवड/ बिजप्रक्रिया	उन्हाळी तीळ पिकाची पेरणी फेब्रुवारीच्या दूसऱ्या आठवड्या पर्यंत करता येते. उन्हाळी तीळ लागवडीपूर्वी बुरशीजन्य रोगाच्या बंदोबस्तासाठी पेरणीपूर्वी प्रति किलो बियाण्यास ३ ग्रॅम कार्बेन्डेझीम (बाविस्टीन) किंवा २.५ ग्रॅम थायरम किंवा ४ ग्रॅम ट्रायकोडर्माची बिज प्रक्रिया करावी. नंतर अँझंटोफॉस २० मिली प्रति किलो बियाणे प्रमाणे चोळावे. उन्हाळी तीळ पिकाच्या पेरणीसाठी एकेटी-१०१, एकेटी-१०३, जेएलटी-४०८, एकेटी-६४, एनटी-११-११ या वाणांपैकी वाणाची निवड करावी.											
संत्रा/ मोसंबी	फळवाढीची	मृग बहार संत्रा/मोसंबी बागेत फळगळ दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी जिब्रॅलिक ऑसिड १.५ ग्रॅम + चिलेटेड झिंक ५०० ग्रॅम प्रति १०० लीटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. संत्रा/मोसंबी बागेत अंतरमशागतीची कामे करून तण नियंत्रण करावे व आवश्यकतेनुसार पाणी द्यावे.											
डाळींब	फळवाढीची/ काढणी	डाळींब बागेत अंतरमशागतीची कामे करून तण नियंत्रण करावे व आवश्यकतेनुसार पाणी द्यावे. काढणीस तयार असलेल्या डाळींब फळांची काढणी करून घ्यावी.											
चिक्	फळवाढीची / काढणी	चिक् बागेत अंतरमशागतीची कामे करून तण नियंत्रण करावे व आवश्यकतेनुसार पाणी द्यावे. काढणीस तयार असलेल्या चिक् फळांची काढणी करून घ्यावी.											
भाजीपाला	वाढीची / काढणी	भाजीपाला पिकात खूरपणी करून तण विरहीत ठेवावे व आवश्यकतेनुसार पाटाने पाणी द्यावे. काढणीस तयार असलेल्या भाजीपाला पिकाची पिकाची काढणी करून घ्यावी. भाजीपाला (मिरची, वांगे व भेंडी) पिकात रसशोषण करणाऱ्या किडीचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास त्याच्या व्यस्थापनासाठी पायरीप्रॉक्सीफेन ५% + फेनप्रोपाथ्रीन १५% १० मीली किंवा डायमिथोएट ३०% १३ मीली प्रती १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.											
फुलशेती	वाढीची/ काढणी	फुल पिकात खूरपणी करून तण विरहीत ठेवावेत व आवश्यकतेनुसार पाटाने पाणी द्यावे. काढणीस तयार असलेल्या फुलांची काढणी करून घ्यावी.											
पशुधन व्यवस्थापन	-----	जनावरे आजारी पडू नयेत म्हणून पशुवैद्यकाच्या सल्ल्याने जनावरांना जंतनाशक पाजावेत व लसीकरण करून घ्यावे तसेच दर पंधरा दिवसाला गोठा व गोठ्याचा परिसरात किटकनाशकाची फवारणी करावी व गोठ्यातील खड्डा व भेगा असतील तर त्या बुजवून घ्याव्यात व गोठा व गोठ्याचा परिसर स्वच्छ ठेवावा.											
सदर कृषी हवामान सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मोसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.													

सदर कृषी हवामान सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.

मुख्य प्रकल्प समन्वयक
ग्रामीण कृषी मौसम सेवा
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी