



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
अखिल भारतीय समन्वयित कृषि हवामानशास्त्र संशोधन प्रकल्प
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी - ४३१ ४०२
ईमेल - amfuparbhani@gmail.com



बीड जिल्हा कृषि हवामान सल्ला पत्रक क्रमांक - २०/२०२५ - २०२६

शुक्रवार, दिनांक - ०६.०६.२०२५

मागील आठवड्यातील हवामानस्थिती (दिनांक ३१ मे ते ०६ जून २०२५)							हवामान घटक		हवामान अंदाज (दिनांक ०७ ते ११ जून २०२५ साठी हवामान अंदाज)				
३१/०५	०१/०६	०२/०६	०३/०६	०४/०६	०५/०६	०६/०६	दिनांक		०७/०६	०८/०६	०९/०६	१०/०६	११/०६
							पाऊस (मिमी)		५.०	२०.०	७.०	३.०	२.०
							कमाल तापमान (अं .से)		३४.०	३४.०	३५.०	३५.०	३५.०
							किमान तापमान (अं .से)		२३.०	२३.०	२४.०	२४.०	२४.०
							स.	ढग स्थिती (आकाश)	अंशतः	ढगाळ	अंशतः	अंशतः	अंशतः
						दु.	ढगाळ		ढगाळ		ढगाळ		
							सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)		७३	७८	७८	७२	७३
							दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)		५१	५१	५४	५४	४७
							वाऱ्याचा वेग (किमी /तास)		१३	१५	१४	१८	२०
							स.	वाऱ्याची दिशा	पश्चिम-	पश्चिम-	पश्चिम-	पश्चिम-	पश्चिम-
						दु.	वायव्य		वायव्य		वायव्य	वायव्य	

हवामान सारांश / चेतावनी :

प्रादेशिक हवामान केंद्र , मुंबई येथून प्राप्त झालेल्या अंदाजानुसार दिनांक ०६ जून रोजी बीड जिल्ह्यात तूरळक ठिकाणी वादळी वारा, मेघगर्जना, वाऱ्याचा वेग अधिक (ताशी ३० ते ४० कि.मी.) राहून हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. दिनांक ०८ जून रोजी बीड जिल्ह्यात तूरळक ठिकाणी वादळी वारा, मेघगर्जना, वाऱ्याचा वेग अधिक (ताशी ४० ते ५० कि.मी.) राहून हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. दिनांक ०७ जून रोजी बीड जिल्ह्यात तूरळक ठिकाणी वादळी वारा, मेघगर्जना, वाऱ्याचा वेग अधिक (ताशी ४० ते ५० कि.मी.) राहून मूसळधार स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. बीड जिल्ह्यात दिनांक ०६, ०९ व १० जून रोजी तूरळक ठिकाणी तर दिनांक ०७ व ०८ जून रोजी काही ठिकाणी हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. बीड जिल्ह्यात पुढील चोवीस तासात कमाल तापमानात फारशी तफावत जाणवत नाही व त्यानंतर हळूहळू २ ते ३ अं.से. ने वाढ होण्याची तर पुढील पाच दिवसात किमान तापमानात फारशी तफावत जाणवत नाही.

सामान्य सल्ला :

विस्तारीत अंदाजानुसार (ईआरएफएस) मराठवाड्यात दिनांक ०६ ते १२ जून २०२५ दरम्यान पाऊस सरासरीएवढा, कमाल तापमान सरासरीपेक्षा कमी व किमान तापमान सरासरीपेक्षा कमी व दिनांक १३ ते १९ जून २०२५ दरम्यान पाऊस सरासरीपेक्षा जास्त, कमाल तापमान सरासरीएवढे व किमान तापमान सरासरीएवढे राहण्याची शक्यता आहे.

संक, इसरो अहमदाबाद यांच्या उपग्रहाच्या बाष्पोत्सर्जनाच्या जिल्हानिहाय व तालुकानिहाय डायग्नोस्टिक मराठवाड्यात बाष्पोत्सर्जनाचा वेग कमी झालेला आहे.

संदेश : शेतकरी बांधवांनी पेरणीची चाई करू नये. जमिनिंत वापसा असतांना पूर्व मशागतीची कामे राहिली असल्यास पूर्व मशागतीची कामे करून घ्यावीत.

पिकांचे नाव	अवस्था	कृषी हवामान सल्ला
सोयाबीन	पूर्वमशागत / आंतरपीक	कोरडवाहू परिस्थितीत सोयाबीन + तुर हे आंतरपीक २:१ किंवा ४:२ या प्रमाणात घ्यावे. तसेच ओलीताखाली सोयाबीन + कापूस हे आंतरपीक १:१ किंवा २:१ या प्रमाणात घेता येते. सोयाबीन पिकाच्या पेरणीसाठी पूर्वमशागतीची कामे केली नसल्यास लवकरात लवकर करून घ्यावीत.
खरीप ज्वारी	पूर्वमशागत / आंतरपीक	आंतरपीक पध्दतीमध्ये खरीप ज्वारी + सोयाबीन २:४ किंवा ३:६ या प्रमाणात दोन ओळीतील अंतर ४५ सेंमी ठेवावे. तसेच खरीप ज्वारी + तुर ३:३ किंवा ४:२ या प्रमाणात आंतरपीक घेता येते. सोयाबीन, मुग, उडीद ही कमी कालावधीची पिके आंतरपीके म्हणून घेताना २:४ या आंतरपीक पध्दतीचा अवलंब करावा. खरीप ज्वारी पिकाच्या पेरणीसाठी पूर्वमशागतीची कामे केली नसल्यास लवकरात लवकर करून घ्यावीत.
बाजरी	पूर्वमशागत / आंतरपीक	बाजरी पिकामध्ये बाजरी + तुर हे आंतरपीक २:१, ३:३ किंवा ४:२ या प्रमाणात घ्यावे. बाजरी पिकाच्या पेरणीसाठी पूर्वमशागतीची कामे केली नसल्यास लवकरात लवकर करून घ्यावीत.
ऊस	वाढीची	ऊस पिकावर पांढऱ्या माशीचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास, प्रादुर्भावग्रस्त पाने काढून नष्ट करावीत, पिवळ्या चिकट सापळ्यांचा पिकात वापर करावा, रासायनिक कीटकनाशकांमध्ये व्यवस्थापनासाठी क्लोरोपायरीफॉस २० टक्के ३० मिली किंवा इमिडाक्लोप्रिड १७.८ टक्के ३ मिली किंवा अॅसीफेट ७५% २० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे. ऊस पिकावर खोड किडीचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी क्लोरोपायरीफॉस २० % २५ मिली किंवा क्लोरेट्रानोलीप्रोल १८.५% ४ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून पावसाची उघाड बघून फवारणी करावी.
हळद	आंतरपीक	पाण्याची उपलब्धता असल्यास हळद पिकाची लागवड करून घ्यावी. हळदीमध्ये आंतरपीके घेताना पहिल्या तीन ते साडेतीन महिन्यांपर्यंत काढणी होईल अशा प्रकारची आंतरपीके निवडावीत. यामध्ये पालेभाज्या सारख्या आंतरपिकांचा समावेश असावा.
संत्रा/ मोसंबी	जार्तीची निवड/ वाढीची	संत्रा/मोसंबी लागवडीसाठी १ X १ X १ मीटर या आकाराचे खडे घेऊन त्यात अर्धा किलो सुपर फॉस्फेट, ३ ते ४ घमेली शेणखत किंवा कंपोस्टखत व पोयटा माती यांनी खडे भरून घ्यावे. संत्रा नविन बाग लागवडीसाठी नागपूर संत्रा, किन्नो तर मोसंबी नविन बाग लागवडीसाठी न्यूसेलर, सातगुडी व फुले मोसंबी इत्यादी जार्तीची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी. अंबे बहार संत्रा/मोसंबी बागेत रोगनाशकाची फवारणी पावसाची उघाड बघून करावी.
डाळींब	जार्तीची निवड / वाढीची	डाळींब लागवडीसाठी घेतलेले खडे चांगली माती + चांगले कुजलेले व रापलेले शेणखत + १ ते १.५ किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट + पालापाचोळा यांनी जमिनीपासून वर १५ ते २० सेंमी खडे भरून घ्यावेत व मधोमध एक बांबूची काठी लावावी. डाळींब नविन बाग लागवडीसाठी भगवा, फुले भगवा सुपर, गणेश, फुले आरक्ता, इत्यादी जार्तीची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी.
चिक्कू	जार्तीची निवड / वाढीची	चिक्कू लागवडीसाठी घेतलेले १ X १ X १ मीटर आकाराचे खडे अर्धा किलो सुपर फॉस्फेट, १:३ या प्रमाणात शेणखत + माती या मिश्रणाने खडे भरावे. चिक्कू नविन बाग लागवडीसाठी कालीपत्ती, क्रिकेट बॉल इत्यादी जार्तीची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी. तूरळक ठिकाणी वादळी वाऱ्यासह पावसाचा अंदाज लक्षात घेता, नविन लागवड केलेल्या व लहान चिक्कू झाडांना काठीने आधार द्यावा.
भाजीपाला	रोपे तयार करणे / काढणी	पाण्याची उपलब्धता असल्यास भाजीपाला (वांगी, मिरची, टोमॅटो इत्यादी) पिकांची रोपे तयार करण्यासाठी गादी वाफ्यावर बी टाकावे. काढणीस तयार आसलेल्या भाजीपाला पिकांची काढणी करावी.
फुलशेती	रोपे तयार करणे / काढणी	पाण्याची उपलब्धता असल्यास फुल पिकांची रोपे तयार करण्यासाठी गादी वाफ्यावर बी टाकावे. काढणीस तयार आसलेल्या फुलपिकांची काढणी करून घ्यावी.
तुती रेशीम उद्योग	---	तुती रोपवाटीका जून महिन्यात एक एकर क्षेत्रासाठी २ गुंठे क्षेत्रावर गादी वाफे करावेत. ५० X ३१ X ५ फुट (लांबी-रुंदी-उंची) आकाराचे ३ गादी वाफे करावेत. ०६ ते ०८ महिने वयाचे तुती बेणे करण्यासाठी निवडावी. ३ ते ४ डोळे असलेले बेणे पेन्सील आकाराचे निवडून धारदार सिकेटरच्या साहाय्याने डोळ्याच्या लगत खालील बाजूस स्लॅटींग कट व ३ डोळ्यांच्या वरच्या डोळ्या लगत फ्लॅट कट घेऊन बेणे तयार करावे. बेणे तयार करताना बेण्याची साल फाटणार नाही याची काळजी घ्यावी. रोगीट बेण्याची छाटणी साठी निवड करू नये. ५ X ३ X २ किंवा ६ X ३ X २ फुट पट्टा पध्दत लागवडीसाठी एकरी ६ हजार बेणे लागवड करावी. दोन भाग शेणखत व एक भाग माती या प्रमाणे जमिनीपासून १.५ फुट उंचीच्या गादी वाफ्यावर २२ सेंमी लांबीचे तुती बेणे दोन ओळीत १५ सेंमी व दोन बेण्यात १० सेंमी अंतर ठेवून लागवड करावी.
पशुधन व्यवस्थापन	-----	पावसाळा ऋतुच्या आगमनासोबतच अनेक आजारांचे देखील आगमन होते. म्हणून पशुधनाच्या आरोग्यासाठी त्रिसुत्री १) भौतिक सुविधा म्हणजेच व्यवस्थित गोठा ज्यायोग्य किटक व पावसापासून संरक्षण. २) जैविक सुविधा जसेकी लसीकरण, जंतनाशकाची मात्रा आणि ३) रासायनिक सुविधा म्हणजे आजाराची लागण झाल्यास तात्काळ पशुवैद्यकाच्या मार्गदर्शनाखाली औषधोपचार लसीकरण आणि पावसाच्या आगमनासोबतच तात्काळ शेळी मेंढी मध्ये तसच वासरांना वयाच्या सातव्या दिवशी द्यावयाची जंतनाशकाची मात्रा आवश्यक ठरते.

सदर कृषी हवामान सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
अखिल भारतीय समन्वयित कृषि हवामानशास्त्र संशोधन प्रकल्प
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी - ४३१ ४०२
ईमेल - amfuparbhani@gmail.com



हिंगोली जिल्हा कृषि हवामान सल्ला पत्रक क्रमांक - २०/२०२५ - २०२६ शुक्रवार, दिनांक - ०६.०६.२०२५

मागील आठवड्यातील हवामानस्थिती (दिनांक ३१ मे ते ०६ जून २०२५)							हवामान घटक		हवामान अंदाज (दिनांक ०७ ते ११ जून २०२५ साठी हवामान अंदाज)				
३१/०५	०१/०६	०२/०६	०३/०६	०४/०६	०५/०६	०६/०६	दिनांक		०७/०६	०८/०६	०९/०६	१०/०६	११/०६
							पाऊस (मिमी)		३.०	१२.०	९.०	२.०	१.०
							कमाल तापमान (अं .से)		३५.०	३६.०	३६.०	३५.०	३५.०
							किमान तापमान (अं .से)		२५.०	२५.०	२५.०	२५.०	२४.०
							स.	ढग स्थिती (आकाश)	अंशतः ढगाळ	अंशतः ढगाळ	अंशतः ढगाळ	अंशतः ढगाळ	स्वच्छ
							दु.						
							सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)		७३	७३	७८	७०	६६
							दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)		५६	५५	५७	५८	५५
							वाऱ्याचा वेग (किमी /तास)		८	१४	१३	१९	२१
							स.	वाऱ्याची दिशा	पश्चिम-वायव्य	वायव्य	पश्चिम-वायव्य	पश्चिम-वायव्य	पश्चिम-वायव्य
							दु.						

हवामान सारांश / चेतावनी :

प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई येथून प्राप्त झालेल्या अंदाजानुसार दिनांक ०७ जून रोजी हिंगोली जिल्ह्यात तूरळक ठिकाणी वादळी वारा, मेघगर्जना, वाऱ्याचा वेग अधिक (ताशी ३० ते ४० कि.मी.) राहून हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. दिनांक ०८ जून रोजी हिंगोली जिल्ह्यात तूरळक ठिकाणी वादळी वारा, मेघगर्जना, वाऱ्याचा वेग अधिक (ताशी ४० ते ५० कि.मी.) राहून हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. हिंगोली जिल्ह्यात दिनांक ०६, ०९ व १० जून रोजी तूरळक ठिकाणी तर दिनांक ०७ व ०८ जून रोजी काही ठिकाणी हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. हिंगोली जिल्ह्यात पुढील चोवीस तासात कमाल तापमानात फारशी तफावत जाणवत नाही व त्यानंतर हळूहळू २ ते ३ अं.से. ने वाढ होण्याची तर पुढील पाच दिवसात किमान तापमानात फारशी तफावत जाणवत नाही.

सामान्य सल्ला :

विस्तारीत अंदाजानुसार (ईआरएफएस) मराठवाड्यात दिनांक ०६ ते १२ जून २०२५ दरम्यान पाऊस सरासरीएवढा, कमाल तापमान सरासरीपेक्षा कमी व किमान तापमान सरासरीपेक्षा कमी व दिनांक १३ ते १९ जून २०२५ दरम्यान पाऊस सरासरीपेक्षा जास्त, कमाल तापमान सरासरीएवढे व किमान तापमान सरासरीपेक्षा जास्त राहण्याची शक्यता आहे.

संक, इसरो अहमदाबाद यांच्या उपग्रहाच्या बायोत्सर्जनाच्या जिल्हानिहाय व तालुकानिहाय छायाचित्रानुसार मराठवाड्यात बायोत्सर्जनाचा वेग कमी झालेला आहे.

संदेश : शेतकरी बांधवांनी पेरणीची चाई करू नये. जमिनि तपास असतांना पूर्व मशागतीची कामे राहिली असल्यास पूर्व मशागतीची कामे करून घ्यावीत.

पिकांचे नाव	अवस्था	कृषी हवामान सल्ला
सोयाबीन	पूर्वमशागत / आंतरपीक	कोरडवाहू परिस्थितीत सोयाबीन + तुर हे आंतरपीक २:१ किंवा ४:२ या प्रमाणात घ्यावे. तसेच ओलीताखाली सोयाबीन + कापूस हे आंतरपीक १:१ किंवा २:१ या प्रमाणात घेता येते. सोयाबीन पिकाच्या पेरणीसाठी पूर्वमशागतीची कामे केली नसल्यास लवकरात लवकर करून घ्यावीत.
खरीप ज्वारी	पूर्वमशागत / आंतरपीक	आंतरपीक पध्दतीमध्ये खरीप ज्वारी + सोयाबीन २:४ किंवा ३:६ या प्रमाणात दोन ओळीतील अंतर ४५ सेंमी ठेवावे. तसेच खरीप ज्वारी + तुर ३:३ किंवा ४:२ या प्रमाणात आंतरपीक घेता येते. सोयाबीन, मुग, उडीद ही कमी कालावधीची पिके आंतरपीके म्हणून घेताना २:४ या आंतरपीक पध्दतीचा अवलंब करावा. खरीप ज्वारी पिकाच्या पेरणीसाठी पूर्वमशागतीची कामे केली नसल्यास लवकरात लवकर करून घ्यावीत.
बाजरी	पूर्वमशागत / आंतरपीक	बाजरी पिकाच्या बाजरी + तुर हे आंतरपीक २:१, ३:३ किंवा ४:२ या प्रमाणात घ्यावे. बाजरी पिकाच्या पेरणीसाठी पूर्वमशागतीची कामे केली नसल्यास लवकरात लवकर करून घ्यावीत.
ऊस	वाढीची	ऊस पिकावर पांढऱ्या माशीचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास, प्रादुर्भावग्रस्त पाने काढून नष्ट करावीत, पिवळ्या चिकट सापळ्यांचा पिकात वापर करावा, रासायनिक कीटकनाशकांमध्ये व्यवस्थापनासाठी क्लोरोपायरीफॉस २० टक्के ३० मिली किंवा इमिडाक्लोप्रिड १७.८ टक्के ३ मिली किंवा अॅसोफेट ७५% २० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे. ऊस पिकावर खोड किडीचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी क्लोरोपायरीफॉस २० % २५ मिली किंवा क्लोरेट्रानोलीप्रोल १८.५% ४ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून पावसाची उघाड बघून फवारणी करावी.
हळद	आंतरपीक	पाण्याची उपलब्धता असल्यास हळद पिकाची लागवड करून घ्यावी. हळदीमध्ये आंतरपीके घेताना पहिल्या तीन ते साडेतीन महिन्यांपर्यंत काढणी हाईल अशा प्रकारची आंतरपीके निवडावीत. यामध्ये पालेभाज्या सारख्या आंतरपिकांचा समावेश असावा.
संत्रा/मोसंबी	जातीची निवड/वाढीची	संत्रा/मोसंबी लागवडीसाठी १ X १ X १ मीटर या आकाराचे खड्डे घेऊन त्यात अर्धा किलो सुपर फॉस्फेट, ३ ते ४ घमेली शेणखत किंवा कंपोस्टखत व पोयटा माती यांनी खड्डे भरून घ्यावे. संत्रा नविन बाग लागवडीसाठी नागपूर संत्रा, किन्नो तर मोसंबी नविन बाग लागवडीसाठी न्यूसेलर, सातगुडी व फुले मोसंबी इत्यादी जातींची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी. अंबे बहार संत्रा/मोसंबी बागेत रोगनाशकाची फवारणी पावसाची उघाड बघून करावी.
डाळींब	जातीची निवड/वाढीची	डाळींब लागवडीसाठी घेतलेले खड्डे चांगली माती + चांगले कुजलेले व रापलेले शेणखत + १ ते १.५ किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट + पालापाचोळा यांनी जमिनीपासून वर १५ ते २० सेंमी खड्डे भरून घ्यावेत व मधोमध एक बांबूची काठी लावावी. डाळींब नविन बाग लागवडीसाठी भगवा, फुले भगवा सुपर, गणेश, फुले आरक्ता, इत्यादी जातींची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी.
चिकू	जातीची निवड/वाढीची	चिकू लागवडीसाठी घेतलेले १ X १ X १ मीटर आकाराचे खड्डे अर्धा किलो सुपर फॉस्फेट, १:३ या प्रमाणात शेणखत + माती या मिश्रणाने खड्डे भरावे. चिकू नविन बाग लागवडीसाठी कालीपती, क्रिकेट बॉल इत्यादी जातींची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी. तूरळक ठिकाणी वादळी वाऱ्यासह पावसाचा अंदाज लक्षात घेता, नविन लागवड केलेल्या व लहान चिकू झाडांना काठीने आधार द्यावा.
भाजीपाला	रोपे तयार करणे / काढणी	पाण्याची उपलब्धता असल्यास भाजीपाला (वांगी, मिरची, टोमॅटो इत्यादी) पिकाची रोपे तयार करण्यासाठी गादी वाफ्यावर बी टाकावे. काढणीस तयार आसलेल्या भाजीपाला पिकांची काढणी करावी.
फुलशेती	रोपे तयार करणे / काढणी	पाण्याची उपलब्धता असल्यास फुल पिकाची रोपे तयार करण्यासाठी गादी वाफ्यावर बी टाकावे. काढणीस तयार आसलेल्या फुलपिकांची काढणी करून घ्यावी.
तुती रेशीम उद्योग	---	तुती रोपवाटीका जून महिन्यात एक एकर क्षेत्रासाठी २ गुंठे क्षेत्रावर गादी वाफे करावेत. ५० X ३१ X १.५ फुट (लांबी-रुंदी-उंची) आकाराचे ३ गादी वाफे करावेत. ०६ ते ०८ महिने वयाचे तुती बेणे करण्यासाठी निवडावी. ३ ते ४ डोळे असलेले बेणे पेन्सिल आकाराचे निवडून धारदार सिकेटरच्या साहाय्याने डोळ्याच्या लगत खालील बाजूस स्लॅटिंग कट व ३ डोळ्याच्या वरच्या डोळ्या लगत फ्लॅट कट घेऊन बेणे तयार करावे. बेणे तयार करताना बेण्याची साल फाटणार नाही याची काळजी घ्यावी. रोगीट बेण्याची छाटणी साठी निवड करू नये. ५ X ३ X २ किंवा ६ X ३ X २ फुट पड्डा पध्दत लागवडीसाठी एकरी ६ हजार बेणे लागवड करावी. दोन भाग शेणखत व एक भाग माती या प्रमाणे जमिनीपासून १.५ फुट उंचीच्या गादी वाफ्यावर २२ सेंमी लांबीचे तुती बेणे दोन ओळीत १५ सेंमी व दोन बेण्यात १० सेंमी अंतर ठेवून लागवड करावी.
पशुधन व्यवस्थापन	---	पावसाळा ऋतुच्या आगमनासोबतच अनेक आजारांचे देखील आगमन होते. म्हणून पशुधनाच्या आरोग्यासाठी त्रिसूत्री १) भौतीक सुविधा म्हणजेच व्यवस्थित गोठा ज्यायोग्य किटक व पावसापासून संरक्षण. २) जैविक सुविधा जसेकी लसीकरण, जंतनाशकाची मात्रा आणि ३) रासायनिक सुविधा म्हणजे आजाराची लागण झाल्यास तात्काळ पशुवैद्यकाच्या मार्गदर्शनाखाली औषधोपचार लसीकरण आणि पावसाच्या आगमनासोबतच तात्काळ शेळी मेंढी मध्ये तसेच वासरांना वयाच्या सातव्या दिवशी द्यावयाची जंतनाशकाची मात्रा आवश्यक ठरते.

सदर कृषी हवामान सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.

मुख्य प्रकल्प समन्वयक
 ग्रामीण कृषी मौसम सेवा
 वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
अखिल भारतीय समन्वयित कृषि हवामानशास्त्र संशोधन प्रकल्प
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी - ४३१ ४०२
ईमेल - amfuparbhani@gmail.com



जालना जिल्हा कृषि हवामान सल्ला पत्रक क्रमांक - २०/२०२५ - २०२६

शुक्रवार, दिनांक - ०६.०६.२०२५

मागील आठवड्यातील हवामानस्थिती (दिनांक ३१ मे ते ०६ जून २०२५)							हवामान घटक	हवामान अंदाज (दिनांक ०७ ते ११ जून २०२५ साठी हवामान अंदाज)				
३१/०५	०१/०६	०२/०६	०३/०६	०४/०६	०५/०६	०६/०६	दिनांक	०७/०६	०८/०६	०९/०६	१०/०६	११/०६
							पाऊस (मिमी)	२.०	१५.०	७.०	३.०	१.०
							कमाल तापमान (अं.से)	३६.०	३५.०	३५.०	३४.०	३४.०
							किमान तापमान (अं.से)	२४.०	२५.०	२५.०	२५.०	२५.०
							स. ढग स्थिती (आकाश)	स्वच्छ	ढगाळ	ढगाळ	अंशतः ढगाळ	स्वच्छ
							सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	७३	७८	७७	७०	६९
							दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	५६	५४	५८	५८	५२
							वाऱ्याचा वेग (किमी /तास)	१३	१४	१८	१९	२२
							स. वाऱ्याची दिशा	वायव्य	वायव्य	वायव्य	पश्चिम-वायव्य	पश्चिम-वायव्य
							दु.					

हवामान सारांश / चेतावनी :

प्रादेशिक हवामान केंद्र , मुंबई येथून प्राप्त झालेल्या अंदाजानुसार दिनांक ०७ जून रोजी जालना जिल्ह्यात तूरळक ठिकाणी वादळी वारा, मेघगर्जना, वाऱ्याचा वेग अधिक (ताशी ३० ते ४० कि.मी.) राहून हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. दिनांक ०८ जून रोजी जालना जिल्ह्यात तूरळक ठिकाणी वादळी वारा, मेघगर्जना, वाऱ्याचा वेग अधिक (ताशी ४० ते ५० कि.मी.) राहून हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. जालना जिल्ह्यात दिनांक ०६, ०९ व १० जून रोजी तूरळक ठिकाणी तर दिनांक ०७ व ०८ जून रोजी काही ठिकाणी हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. जालना जिल्ह्यात पुढील चोवीस तासात कमाल तापमानात फारशी तफावत जाणवत नाही व त्यानंतर हळूहळू २ ते ३ अं.से. ने वाढ होण्याची तर पुढील पाच दिवसात किमान तापमानात फारशी तफावत जाणवत नाही.

सामान्य सल्ला :

विस्तारीत अंदाजानुसार (ईआरएफएस) मराठवाड्यात दिनांक ०६ ते १२ जून २०२५ दरम्यान पाऊस सरासरीएवढा, कमाल तापमान सरासरीपेक्षा कमी व किमान तापमान सरासरीपेक्षा कमी व दिनांक १३ ते १९ जून २०२५ दरम्यान पाऊस सरासरीपेक्षा जास्त, कमाल तापमान सरासरीएवढे व किमान तापमान सरासरीएवढे राहण्याची शक्यता आहे.

संक, इसरो अहमदाबाद यांच्या उपग्रहाच्या बाष्पोत्सर्जनाच्या जिल्हानिहाय व तालुकानिहाय छायाचित्रानुसार मराठवाड्यात बाष्पोत्सर्जनाचा वेग कमी झालेला आहे.

संदेश : शेतकरी बांधवांनी पेरणीची चाई करू नये. जमिनिन वापसा असतांना पूर्व मशागतीची कामे राहिली असल्यास पूर्व मशागतीची कामे करून घ्यावीत.

पिकांचे नाव	अवस्था	कृषी हवामान सल्ला
सोयाबीन	पूर्वमशागत / आंतरपीक	कोरडवाहू परिस्थितीत सोयाबीन + तुर हे आंतरपीक २:१ किंवा ४:२ या प्रमाणात घ्यावे. तसेच ओलीताखाली सोयाबीन + कापूस हे आंतरपीक १:१ किंवा २:१ या प्रमाणात घेता येते. सोयाबीन पिकाच्या पेरणीसाठी पूर्वमशागतीची कामे केली नसल्यास लवकरात लवकर करून घ्यावीत.
खरीप ज्वारी	पूर्वमशागत / आंतरपीक	आंतरपीक पद्धतीमध्ये खरीप ज्वारी + सोयाबीन २:४ किंवा ३:६ या प्रमाणात दोन ओळीतील अंतर ४५ सेंमी ठेवावे. तसेच खरीप ज्वारी + तुर ३:३ किंवा ४:२ या प्रमाणात आंतरपीक घेता येते. सोयाबीन, मुग, उडीद ही कमी कालावधीची पिके आंतरपीके म्हणून घेताना २:४ या आंतरपीक पद्धतीचा अवलंब करावा. खरीप ज्वारी पिकाच्या पेरणीसाठी पूर्वमशागतीची कामे केली नसल्यास लवकरात लवकर करून घ्यावीत.
बाजरी	पूर्वमशागत / आंतरपीक	बाजरी पिकाच्या बाजरी + तुर हे आंतरपीक २:१, ३:३ किंवा ४:२ या प्रमाणात घ्यावे. बाजरी पिकाच्या पेरणीसाठी पूर्वमशागतीची कामे केली नसल्यास लवकरात लवकर करून घ्यावीत.
ऊस	वाढीची	ऊस पिकावर पांढऱ्या माशीचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास, प्रादुर्भावग्रस्त पाने काढून नष्ट करावीत, पिवळ्या चिकट सापळ्यांचा पिकात वापर करावा, रासायनिक कीटकनाशकांमध्ये व्यवस्थापनासाठी क्लोरोपायरीफॉस २० टक्के ३० मिली किंवा इमिडाक्लोप्रिड १७.८ टक्के ३ मिली किंवा अंसेफेठ ७५% २० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे. ऊस पिकावर खोड किडीचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी क्लोरोपायरीफॉस २० % २५ मिली किंवा क्लोरेट्रानोलीप्रोल १८.५% ४ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून पावसाची उघाड बघून फवारणी करावी.
हळद	आंतरपीक	पाण्याची उपलब्धता असल्यास हळद पिकाची लागवड करून घ्यावी. हळदीमध्ये आंतरपीके घेताना पहिल्या तीन ते साडेतीन महिन्यांपर्यंत काढणी होईल अशा प्रकारची आंतरपीके निवडावीत. यामध्ये पालेभाज्या सारख्या आंतरपिकांचा समावेश असावा.
संत्रा/मोसंबी	जातीची निवड/वाढीची	संत्रा/मोसंबी लागवडीसाठी १X१X१ मीटर या आकाराचे खड्डे घेऊन त्यात अर्धा किलो सुपर फॉस्फेट, ३ ते ४ घमेली शेणखत किंवा कंपोस्टखत व पोयटा माती यांनी खड्डे भरून घ्यावे. संत्रा नविन बाग लागवडीसाठी नागपूर संत्रा, किन्नो तर मोसंबी नविन बाग लागवडीसाठी न्यूसेलर, सातगुडी व फुले मोसंबी इत्यादी जातींची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी. अंबे बहार संत्रा/मोसंबी बागेत रोगनाशकाची फवारणी पावसाची उघाड बघून करावी.
डाळींब	जातीची निवड / वाढीची	डाळींब लागवडीसाठी घेतलेले खड्डे चांगली माती + चांगले कुजलेले व रापलेले शेणखत + १ ते १.५ किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट + पालापाचोळा यांनी जमिनीपासून वर १५ ते २० सेंमी खड्डे भरून घ्यावेत व मधोमध एक बांबूची काठी लावावी. डाळींब नविन बाग लागवडीसाठी भगवा, फुले भगवा सुपर, गणेश, फुले आरक्ता, इत्यादी जातींची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी.
चिकू	जातीची निवड / वाढीची	चिकू लागवडीसाठी घेतलेले १X१X१ मीटर आकाराचे खड्डे अर्धा किलो सुपर फॉस्फेट, १:३ या प्रमाणात शेणखत + माती या मिश्रणाने खड्डे भरावे. चिकू नविन बाग लागवडीसाठी कालीपत्ती, क्रिकेट बॉल इत्यादी जातींची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी. तूरळक ठिकाणी वादळी वाऱ्यासह पावसाचा अंदाज लक्षात घेता, नविन लागवड केलेल्या व लहान चिकू झाडांना काठीने आधार द्यावा.
भाजीपाला	रोपे तयार करणे / काढणी	पाण्याची उपलब्धता असल्यास भाजीपाला (वांगी, मिरची, टोमॅटो इत्यादी) पिकाची रोपे तयार करण्यासाठी गादी वाफ्यावर बी टाकावे. काढणीस तयार आसलेल्या भाजीपाला पिकांची काढणी करावी.
फुलशेती	रोपे तयार करणे / काढणी	पाण्याची उपलब्धता असल्यास फुल पिकाची रोपे तयार करण्यासाठी गादी वाफ्यावर बी टाकावे. काढणीस तयार असलेल्या फुलपिकांची काढणी करून घ्यावी.
तुती रेशीम उद्योग	---	तुती रोपवाटीका जून महिन्यात एक एकर क्षेत्रासाठी २ गुंठे क्षेत्रावर गादी वाफे करावेत. ५० X३X१.५ फुट (लांबी-रुंदी-उंची) आकाराचे ३ गादी वाफे करावेत. ०६ ते ०८ महिने वयाचे तुती बेणे करण्यासाठी निवडावी. ३ ते ४ डोळे असलेले बेणे पेन्सील आकाराचे निवडून धारदार सिकेटरच्या साहाय्याने डोळ्याच्या लगत खालील बाजूस रेलॅटींग कट व ३ डोळ्याच्या वरच्या डोळ्या लगत फ्लॅट कट घेऊन बेणे तयार करावे. बेणे तयार करताना बेण्याची साल फाटणार नाही याची काळजी घ्यावी. रोगीट बेण्याची छाटणी साठी निवड करू नये. ५X३X२ किंवा ६X३X२ फुट पट्टा पद्धत लागवडीसाठी एकरी ६ हजार बेणे लागवड करावी. दोन भाग शेणखत व एक भाग माती या प्रमाणे जमीनीपासून १.५ फुट उंचीच्या गादी वाफ्यावर २२ सेंमी लांबीचे तुती बेणे दोन ओळीत १५ सेंमी व दोन बेण्यात १० सेंमी अंतर ठेवून लागवड करावी.
पशुधन व्यवस्थापन	-----	पावसाळा ऋतूच्या आगमनासोबतच अनेक आजारांचे देखील आगमन होते. म्हणून पशुधनाच्या आरोग्यासाठी त्रिसुत्री १) भौतिक सुविधा म्हणजेच व्यवस्थित गोठा ज्यायोग्य किटक व पावसापासून संरक्षण. २) जैविक सुविधा जसेकी लसीकरण, जंतनाशकाची मात्रा आणि ३) रासायनिक सुविधा म्हणजे आजाराची लागण झाल्यास तात्काळ पशुवैद्यकाच्या मार्गदर्शनाखाली औषधोपचार लसीकरण आणि पावसाच्या आगमनासोबतच तात्काळ शेळी मेंढी मध्ये तसच वासरांना वयाच्या सातव्या दिवशी द्यावयाची जंतनाशकाची मात्रा आवश्यक ठरते.

सदर कृषी हवामान सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
अखिल भारतीय समन्वयित कृषि हवामानशास्त्र संशोधन प्रकल्प
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी - ४३१ ४०२
ईमेल - amfuparbhani@gmail.com



लातूर जिल्हा कृषि हवामान सल्ला पत्रक क्रमांक - २०/२०२५ - २०२६

शुक्रवार, दिनांक - ०६.०६.२०२५

मागील आठवड्यातील हवामानस्थिती (दिनांक ३१ मे ते ०६ जून २०२५)							हवामान घटक	हवामान अंदाज (दिनांक ०७ ते ११ जून २०२५ साठी हवामान अंदाज)				
३१/०५	०१/०६	०२/०६	०३/०६	०४/०६	०५/०६	०६/०६	दिनांक	०७/०६	०८/०६	०९/०६	१०/०६	११/०६
							पाऊस (मिमी)	१.०	६.०	३.०	५.०	१.०
							कमाल तापमान (अं.से)	३४.०	३४.०	३४.०	३४.०	३३.०
							किमान तापमान (अं.से)	२५.०	२४.०	२४.०	२४.०	२४.०
							स. ढग स्थिती (आकाश)	अंशतः ढगाळ	ढगाळ	अंशतः ढगाळ	अंशतः ढगाळ	स्वच्छ
							सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	६५	६३	६४	५९	६२
							दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	५१	४६	५०	४९	४४
							वाऱ्याचा वेग (किमी /तास)	११	१५	१७	१९	२१
							स. वाऱ्याची दिशा	वायव्य	पश्चिम-वायव्य	वायव्य	पश्चिम-वायव्य	पश्चिम-वायव्य
							दु.					

हवामान सारांश / चेतावनी :

प्रादेशिक हवामान केंद्र , मुंबई येथून प्राप्त झालेल्या अंदाजानुसार दिनांक ०६ जून रोजी लातूर जिल्ह्यात तूरळक ठिकाणी वादळी वारा, मेघगर्जना, वाऱ्याचा वेग अधिक (ताशी ३० ते ४० कि.मी.) राहून हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. लातूर जिल्ह्यात दिनांक ०६, ०९ व १० जून रोजी तूरळक ठिकाणी तर दिनांक ०७ व ०८ जून रोजी काही ठिकाणी हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. लातूर जिल्ह्यात पुढील चोवीस तासात कमाल तापमानात फारशी तफावत जाणवत नाही व त्यानंतर हळूहळू २ ते ३ अंसे. ने वाढ होण्याची तर पुढील पाच दिवसात किमान तापमानात फारशी तफावत जाणवत नाही.

सामान्य सल्ला :

विस्तारीत अंदाजानुसार (ईआरएफएस) मराठवाड्यात दिनांक ०६ ते १२ जून २०२५ दरम्यान पाऊस सरासरीएवढा, कमाल तापमान सरासरीपेक्षा कमी व किमान तापमान सरासरीपेक्षा कमी व दिनांक १३ ते १९ जून २०२५ दरम्यान पाऊस सरासरीपेक्षा जास्त, कमाल तापमान सरासरीएवढे व किमान तापमान सरासरीएवढे राहण्याची शक्यता आहे.

संक, इसरो अहमदाबाद यांच्या उपग्रहाच्या बाष्पोत्सर्जनाच्या जिल्हानिहाय व तालुकानिहाय छायाचित्रानुसार मराठवाड्यात बाष्पोत्सर्जनाचा वेग कमी झालेला आहे.

संदेश : शेतकरी बांधवांनी पेरणीची घाई करू नये. जमिनिन वापसा असतांना पूर्व मशागतीची कामे राहिली असल्यास पूर्व मशागतीची कामे करून घ्यावीत.

पिकांचे नाव	अवस्था	कृषी हवामान सल्ला
सोयाबीन	पूर्वमशागत / आंतरपीक	कोरडवाहू परिस्थितीत सोयाबीन + तुर हे आंतरपीक २:१ किंवा ४:२ या प्रमाणात घ्यावे. तसेच ओलीताखाली सोयाबीन + कापूस हे आंतरपीक १:१ किंवा २:१ या प्रमाणात घेता येते. सोयाबीन पिकाच्या पेरणीसाठी पूर्वमशागतीची कामे केली नसल्यास लवकरात लवकर करून घ्यावीत.
खरीप ज्वारी	पूर्वमशागत / आंतरपीक	आंतरपीक पध्दतीमध्ये खरीप ज्वारी + सोयाबीन २:४ किंवा ३:६ या प्रमाणात दोन ओळीतील अंतर ४५ सेंमी ठेवावे. तसेच खरीप ज्वारी + तुर ३:३ किंवा ४:२ या प्रमाणात आंतरपीक घेता येते. सोयाबीन, मुग, उडीद ही कमी कालावधीची पिके आंतरपीके म्हणून घेताना २:४ या आंतरपीक पध्दतीचा अवलंब करावा. खरीप ज्वारी पिकाच्या पेरणीसाठी पूर्वमशागतीची कामे केली नसल्यास लवकरात लवकर करून घ्यावीत.
बाजरी	पूर्वमशागत / आंतरपीक	बाजरी पिकामध्ये बाजरी + तुर हे आंतरपीक २:१, ३:३ किंवा ४:२ या प्रमाणात घ्यावे. बाजरी पिकाच्या पेरणीसाठी पूर्वमशागतीची कामे केली नसल्यास लवकरात लवकर करून घ्यावीत.
ऊस	वाढीची	ऊस पिकावर पांढऱ्या माशीचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास, प्रादुर्भावग्रस्त पाने काढून नष्ट करावीत, पिवळ्या चिकट सापळ्यांचा पिकात वापर करावा, रासायनिक कीटकनाशकांमध्ये व्यवस्थापनासाठी क्लोरोपायरीफॉस २० टक्के ३० मिली किंवा इमिडाक्लोप्रिड १७.८ टक्के ३ मिली किंवा अॅसीफेन ७५% २० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे. ऊस पिकावर खोड किडीचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी क्लोरोपायरीफॉस २० % २५ मिली किंवा क्लोरेट्रानोलीप्रोल १८.५% ४ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून पावसाची उघाड बघून फवारणी करावी.
हळद	आंतरपीक	पाण्याची उपलब्धता असल्यास हळद पिकाची लागवड करून घ्यावी. हळदीमध्ये आंतरपीके घेताना पहिल्या तीन ते साडेतीन महिन्यांपर्यंत काढणी होईल अशा प्रकारची आंतरपीके निवडावीत. यामध्ये पालेभाज्या सारख्या आंतरपिकांचा समावेश असावा.
संत्रा/मोसंबी	जातीची निवड/वाढीची	संत्रा/मोसंबी लागवडीसाठी १ X १ X १ मीटर या आकाराचे खड्डे घेऊन त्यात अर्धा किलो सुपर फॉस्फेट, ३ ते ४ घमेली शेणखत किंवा कंपोस्टखत व पोयटा माती यांनी खड्डे भरून घ्यावे. संत्रा नविन बाग लागवडीसाठी नागपूर संत्रा, किन्नो तर मोसंबी नविन बाग लागवडीसाठी न्युसेलर, सातगुडी व फुले मोसंबी इत्यादी जातींची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी. अंबे बहार संत्रा/मोसंबी बागेत रोगनाशकाची फवारणी पावसाची उघाड बघून करावी.
डाळींब	जातीची निवड/वाढीची	डाळींब लागवडीसाठी घेतलेले खड्डे चांगली माती + चांगले कुजलेले व रापलेले शेणखत + १ ते १.५ किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट + पालापाचोळा यांनी जमिनीपासून वर १५ ते २० सेंमी खड्डे भरून घ्यावेत व मधोमध एक बांबूची काठी लावावी. डाळींब नविन बाग लागवडीसाठी भगवा, फुले भगवा सुपर, गणेश, फुले आरक्ता, इत्यादी जातींची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी.
चिक्कू	जातीची निवड/वाढीची	चिक्कू लागवडीसाठी घेतलेले १ X १ X १ मीटर आकाराचे खड्डे अर्धा किलो सुपर फॉस्फेट, १:३ या प्रमाणात शेणखत + माती या मिश्रणाने खड्डे भरावे. चिक्कू नविन बाग लागवडीसाठी कालीपत्ती, क्रिकेट बॉल इत्यादी जातींची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी. तूरळक ठिकाणी वादळी वाऱ्यासह पावसाचा अंदाज लक्षात घेता, नविन लागवड केलेल्या व लहान चिक्कू झाडांना काठीने आधार द्यावा.
भाजीपाला	रोपे तयार करणे / काढणी	पाण्याची उपलब्धता असल्यास भाजीपाला (वांगी, मिरची, टोमॅटो इत्यादी) पिकाची रोपे तयार करण्यासाठी गादी वाफ्यावर बी टाकावे. काढणीस तयार आसलेल्या भाजीपाला पिकांची काढणी करावी.
फुलशेती	रोपे तयार करणे / काढणी	पाण्याची उपलब्धता असल्यास फुल पिकाची रोपे तयार करण्यासाठी गादी वाफ्यावर बी टाकावे. काढणीस तयार असलेल्या फुलपिकांची काढणी करून घ्यावी.
तुती रेशीम उद्योग	---	तुती रोपवाटीका जुन महिन्यात एक एकर क्षेत्रासाठी २ गुंठे क्षेत्रावर गादी वाफे करावेत. ५० X ३५ फुट (लांबी-रुंदी-उंची) आकाराचे ३ गादी वाफे करावेत. ०६ ते ०८ महिने वयाचे तुती बेणे करण्यासाठी निवडावी. ३ ते ४ डोळे असलेले बेणे पेन्सील आकाराचे निवडून धारदार सिकेटरच्या साहाय्याने डोळ्याच्या लगत खालील बाजूस स्लॅटींग कट व ३ डोळ्याच्या वरच्या डोळ्याला लगत फ्लॅट कट घेऊन बेणे तयार करावे. बेणे तयार करताना बेण्याची साल फाटणार नाही याची काळजी घ्यावी. रोगीट बेण्याची छाटणीसाठी निवड करू नये. ५ X ३ X २ किंवा ६ X ३ X २ फुट पट्टा पध्दत लागवडीसाठी एकरी ६ हजार बेणे लागवड करावी. दोन भाग शेणखत व एक भाग माती या प्रमाणे जमीनीपासून १.५ फुट उंचीच्या गादी वाफ्यावर २२ सेंमी लांबीचे तुती बेणे दोन ओळीत १५ सेंमी व दोन बेण्यात १० सेंमी अंतर ठेवून लागवड करावी.
पशुधन व्यवस्थापन	-----	पावसाळा ऋतूच्या आगमनासोबतच अनेक आजारांचे देखील आगमन होते. म्हणून पशुधनाच्या आरोग्यासाठी त्रिसुत्री १) भौतिक सुविधा म्हणजेच व्यवस्थित गोठा ज्यायोग्य कितक व पावसापासून संरक्षण. २) जैविक सुविधा जसेकी लसीकरण, जंतनाशकाची मात्रा आणि ३) रासायनिक सुविधा म्हणजे आजाराची लागण झाल्यास तात्काळ पशुवैद्यकाच्या मार्गदर्शनाखाली औषधोपचार लसीकरण आणि पावसाच्या आगमनासोबतच तात्काळ शेळी मेंढी मध्ये तसच वासरांना वयाच्या सातव्या दिवशी द्यावयाची जंतनाशकाची मात्रा आवश्यक ठरते.

सदर कृषी हवामान सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.

मुख्य प्रकल्प समन्वयक
 ग्रामीण कृषी मौसम सेवा
 वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
अखिल भारतीय समन्वयित कृषि हवामानशास्त्र संशोधन प्रकल्प
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी - ४३१ ४०२
ईमेल - amfuparbhani@gmail.com



नांदेड जिल्हा कृषि हवामान सल्ला पत्रक क्रमांक - २०/२०२५ - २०२६

शुक्रवार, दिनांक - ०६.०६.२०२५

मागील आठवड्यातील हवामानस्थिती (दिनांक ३१ मे ते ०६ जून २०२५)							हवामान घटक	हवामान अंदाज (दिनांक ०७ ते ११ जून २०२५ साठी हवामान अंदाज)				
३१/०५	०१/०६	०२/०६	०३/०६	०४/०६	०५/०६	०६/०६	दिनांक	०७/०६	०८/०६	०९/०६	१०/०६	११/०६
							पाऊस (मिमी)	७.०	५.०	९.०	११.०	२.०
							कमाल तापमान (अं.से)	३६.०	३७.०	३७.०	३७.०	३७.०
							किमान तापमान (अं.से)	२५.०	२४.०	२३.०	२३.०	२३.०
							स. ढग स्थिती (आकाश)	अंशतः ढगाळ	अंशतः ढगाळ	ढगाळ	अंशतः ढगाळ	अंशतः ढगाळ
							सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	९२	९८	९७	९१	९३
							दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	५६	५५	६०	५९	५३
							वाऱ्याचा वेग (किमी/तास)	८	११	१४	२०	२०
							स. वाऱ्याची दिशा	पश्चिम-वायव्य	पश्चिम-वायव्य	पश्चिम	पश्चिम-वायव्य	पश्चिम-वायव्य
							दु.					

हवामान सारांश / चेतावनी :

प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई येथून प्राप्त झालेल्या अंदाजानुसार दिनांक ०६ जून रोजी नांदेड जिल्ह्यात तूरळक ठिकाणी वादळी वारा, मेघगर्जना, वाऱ्याचा वेग अधिक (ताशी ३० ते ४० कि.मी.) राहून हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. दिनांक ०८ व ०९ जून रोजी नांदेड जिल्ह्यात तूरळक ठिकाणी वादळी वारा, मेघगर्जना, वाऱ्याचा वेग अधिक (ताशी ४० ते ५० कि.मी.) राहून हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. नांदेड जिल्ह्यात दिनांक ०६, ०९ व १० जून रोजी तूरळक ठिकाणी तर दिनांक ०७ व ०८ जून रोजी काही ठिकाणी हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. नांदेड जिल्ह्यात पुढील चोवीस तासात कमाल तापमानात फारशी तफावत जाणवत नाही व त्यानंतर हळूहळू २ ते ३ अं.से. ने वाढ होण्याची तर पुढील पाच दिवसात किमान तापमानात फारशी तफावत जाणवत नाही.

सामान्य सल्ला :

विस्तारीत अंदाजानुसार (ईआरएफएस) मराठवाड्यात दिनांक ०६ ते १२ जून २०२५ दरम्यान पाऊस सरासरीएवढा, कमाल तापमान सरासरीपेक्षा कमी व किमान तापमान सरासरीपेक्षा कमी व दिनांक १३ ते १९ जून २०२५ दरम्यान पाऊस सरासरीपेक्षा जास्त, कमाल तापमान सरासरीएवढे व किमान तापमान सरासरीएवढे राहण्याची शक्यता आहे.

संक, इसरो अहमदाबाद यांच्या उपग्रहाच्या बायोत्सर्जनाच्या जिल्हानिहाय व तालुकानिहाय छायाचित्रानुसार मराठवाड्यात बायोत्सर्जनाचा वेग कमी झालेला आहे.

संदेश : शेतकरी बांधवांनी पेरणीची चाई करू नये. जमिनिन वापसा असतांना पूर्व मशागतीची कामे राहिली असल्यास पूर्व मशागतीची कामे करून घ्यावीत.

पिकांचे नाव	अवस्था	कृषी हवामान सल्ला
सोयाबीन	पूर्वमशागत / आंतरपीक	कोरडवाहू परिस्थितीत सोयाबीन + तुर हे आंतरपीक २:१ किंवा ४:२ या प्रमाणात घ्यावे. तसेच ओलीताखाली सोयाबीन + कापूस हे आंतरपीक १:१ किंवा २:१ या प्रमाणात घेता येते. सोयाबीन पिकाच्या पेरणीसाठी पूर्वमशागतीची कामे केली नसल्यास लवकरात लवकर करून घ्यावीत.
खरीप ज्वारी	पूर्वमशागत / आंतरपीक	आंतरपीक पद्धतीमध्ये खरीप ज्वारी + सोयाबीन २:४ किंवा ३:६ या प्रमाणात दोन ओळीतील अंतर ४५ सेंमी ठेवावे. तसेच खरीप ज्वारी + तुर ३:३ किंवा ४:२ या प्रमाणात आंतरपीक घेता येते. सोयाबीन, मुग, उडीद ही कमी कालावधीची पिके आंतरपीके म्हणून घेताना २:४ या आंतरपीक पद्धतीचा अवलंब करावा. खरीप ज्वारी पिकाच्या पेरणीसाठी पूर्वमशागतीची कामे केली नसल्यास लवकरात लवकर करून घ्यावीत.
बाजरी	पूर्वमशागत / आंतरपीक	बाजरी पिकामध्ये बाजरी + तुर हे आंतरपीक २:१, ३:३ किंवा ४:२ या प्रमाणात घ्यावे. बाजरी पिकाच्या पेरणीसाठी पूर्वमशागतीची कामे केली नसल्यास लवकरात लवकर करून घ्यावीत.
ऊस	वाढीची	ऊस पिकावर पांढऱ्या माशीचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास, प्रादुर्भावग्रस्त पाने काढून नष्ट करावीत, पिवळ्या चिकट सापळ्यांचा पिकात वापर करावा, रासायनिक कीटकनाशकांमध्ये व्यवस्थापनासाठी क्लोरोपायरीफॉस २० टक्के ३० मिली किंवा इमिडाक्लोप्रिड १७.८ टक्के ३ मिली किंवा अॅसीफेट ७५% २० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे. ऊस पिकावर खोड किडीचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी क्लोरोपायरीफॉस २० % २५ मिली किंवा क्लोरेट्रानोलीप्रोल १८.५% ४ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून पावसाची उघाड बघून फवारणी करावी.
हळद	आंतरपीक	पाण्याची उपलब्धता असल्यास हळद पिकाची लागवड करून घ्यावी. हळदीमध्ये आंतरपीके घेताना पहिल्या तीन ते साडेतीन महिन्यांपर्यंत काढणी होईल अशा प्रकारची आंतरपीके निवडावीत. यामध्ये पालेभाज्या सारख्या आंतरपिकांचा समावेश असावा.
संत्रा/मोसंबी	जातीची निवड / वाढीची	संत्रा/मोसंबी लागवडीसाठी १X१X१ मीटर या आकाराचे खडे घेऊन त्यात अर्धा किलो सुपर फॉस्फेट, ३ ते ४ घमेली शेणखत किंवा कंपोस्टखत व पोयटा माती यांनी खडे भरून घ्यावे. संत्रा नविन बाग लागवडीसाठी नागपूर संत्रा, किन्नो तर मोसंबी नविन बाग लागवडीसाठी न्यूसेलर, सातगुडी व फुले मोसंबी इत्यादी जातींची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी. अंबे बहार संत्रा/मोसंबी बागेत रोगनाशकाची फवारणी पावसाची उघाड बघून करावी.
डाळींब	जातीची निवड / वाढीची	डाळींब लागवडीसाठी घेतलेले खडे चांगली माती + चांगले कुजलेले व रापलेले शेणखत + १ ते १.५ किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट + पालापाचोळा यांनी जमिनीपासून वर १५ ते २० सेंमी खडे भरून घ्यावेत व मधोमध एक बांबूची काठी लावावी. डाळींब नविन बाग लागवडीसाठी भगवा, फुले भगवा सुपर, गणेश, फुले आरक्ता, इत्यादी जातींची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी.
चिक्कू	जातीची निवड / वाढीची	चिक्कू लागवडीसाठी घेतलेले १X१X१ मीटर आकाराचे खडे अर्धा किलो सुपर फॉस्फेट, १:३ या प्रमाणात शेणखत + माती या मिश्रणाने खडे भरावे. चिक्कू नविन बाग लागवडीसाठी कालीपत्ती, क्रिकेट बॉल इत्यादी जातींची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी. तूरळक ठिकाणी वादळी वाऱ्यासह पावसाचा अंदाज लक्षात घेता, नविन लागवड केलेल्या व लहान चिक्कू झाडांना काठीने आधार द्यावा.
भाजीपाला	रोपे तयार करणे / काढणी	पाण्याची उपलब्धता असल्यास भाजीपाला (वांगी, मिरची, टोमॅटो इत्यादी) पिकाची रोपे तयार करण्यासाठी गादी वाफ्यावर बी टाकावे. काढणीस तयार आसलेल्या भाजीपाला पिकांची काढणी करावी.
फुलशेती	रोपे तयार करणे / काढणी	पाण्याची उपलब्धता असल्यास फुल पिकाची रोपे तयार करण्यासाठी गादी वाफ्यावर बी टाकावे. काढणीस तयार आसलेल्या फुलपिकांची काढणी करून घ्यावी.
तुती रेशीम उद्योग	---	तुती रोपवाटीका जून महिन्यात एक एकर क्षेत्रासाठी २ गुंठे क्षेत्रावर गादी वाफे करावेत. ५० X३X१.५ फुट (लांबी-रुंदी-उंची) आकाराचे ३ गादी वाफे करावेत. ०६ ते ०८ महिने वयाचे तुती बेणे करण्यासाठी निवडावी. ३ ते ४ डोळे असलेले बेणे पेन्सील आकाराचे निवडून धारदार सिकेटरच्या साहाय्याने डोळ्याच्या लागत खालील बाजूस स्टॅंटींग कट व ३ डोळ्याच्या वरच्या डोळ्या लागत फ्लॅट कट घेऊन बेणे तयार करावे. बेणे तयार करताना बेण्याची साल फाटणार नाही याची काळजी घ्यावी. रोगीट बेण्याची छाटणी साठी निवड करू नये. ५X३X२ किंवा ६X३X२ फुट पट्टा पद्धत लागवडीसाठी एकरी ६ हजार बेणे लागवड करावी. दोन भाग शेणखत व एक भाग माती या प्रमाणे जमीनीपासून १.५ फुट उंचीच्या गादी वाफ्यावर २२ सेंमी लांबीचे तुती बेणे दोन ओळीत १५ सेंमी व दोन बेण्यात १० सेंमी अंतर ठेवून लागवड करावी.
पशुधन व्यवस्थापन	-----	पावसाळा ऋतुच्या आगमनासोबतच अनेक आजारांचे देखील आगमन होते. म्हणून पशुधनाच्या आरोग्यासाठी त्रिसुत्री १) भौतिक सुविधा म्हणजेच व्यवस्थित गोठा ज्यायोग्य किटक व पावसापासून संरक्षण. २) जैविक सुविधा जसेकी लसीकरण, जंतनाशकाची मात्रा आणि ३) रासायनिक सुविधा म्हणजे आजाराची लागण झाल्यास तात्काळ पशुवैद्यकाच्या मार्गदर्शनाखाली औषधोपचार लसीकरण आणि पावसाच्या आगमनासोबतच तात्काळ शेळी मेंढी मध्ये तसेच वासरांना वयाच्या सातव्या दिवशी टाव्याची जंतनाशकाची मात्रा आवश्यक ठरते.

सदर कृषी हवामान सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.

मुख्य प्रकल्प समन्वयक

ग्रामीण कृषी मौसम सेवा

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
अखिल भारतीय समन्वयीत कृषि हवामानशास्त्र संशोधन प्रकल्प
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी — ४३१ ४०२
ईमेल - amfuparbhani@gmail.com



परभणी जिल्हा कृषि हवामान सल्ला पत्रक क्रमांक — २०/२०२५ - २०२६ शुक्रवार, दिनांक — ०६.०६.२०२५

मागील आठवड्यातील हवामानस्थिती (दिनांक ३१ मे ते ०६ जून २०२५)							हवामान घटक		हवामान अंदाज (दिनांक ०७ ते ११ जून २०२५ साठी हवामान अंदाज)				
३१/०५	०१/०६	०२/०६	०३/०६	०४/०६	०५/०६	०६/०६	दिनांक		०७/०६	०८/०६	०९/०६	१०/०६	११/०६
०.०	०.०	७.४	०.०	२.०	०.२	०.०	पाऊस (मिमी)		२.०	१३.०	१०.०	२.०	१.०
३५.६	३५.५	३४.७	३५.५	३५.६	३४.९		कमाल तापमान (अं.से)		३६.०	३५.०	३५.०	३४.०	३४.०
२३.०	२३.१	२१.७	२४.०	२१.६	२३.४	२३.५	किमान तापमान (अं.से)		२४.०	२५.०	२५.०	२५.०	२५.०
स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ	स.	ढग स्थिती (आकाश)	अंशतः ढगाळ	ढगाळ	ढगाळ	अंशतः ढगाळ	स्वच्छ
स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ	ढगाळ	ढगाळ	स्वच्छ		दु.						
७६	७९	७४	८६	८२	८१	७४	सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)		७३	८३	७६	६८	६७
६१	४२	४०	३९	३४	३९		दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)		५६	५४	५८	५९	५४
६.८	६.६	५.२	५.६	५.२	४.७	३.६	वाऱ्याचा वेग (किमी /तास)		११	१४	१७	२०	२२
पश्चिम-नैऋत्य	शांत	उत्तर	पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम-वायव्य	स.	वाऱ्याची दिशा	पश्चिम-वायव्य	पश्चिम-वायव्य	पश्चिम	पश्चिम-वायव्य	पश्चिम-वायव्य
पश्चिम-वायव्य	पश्चिम-नैऋत्य	पश्चिम-नैऋत्य	पश्चिम-वायव्य	पश्चिम-नैऋत्य	पश्चिम-नैऋत्य		दु.						
पाऊस (मिमी) मागील आठवड्यातील					पाऊस (मिमी) ०१/०१/२०२५ पासून आजपर्यंत				पाऊस (मिमी) ०१/०६/२०२५ पासून आजपर्यंत				
९.६					१२९.३				९.६				

हवामान सारांश / चेतावनी :

प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई येथून प्राप्त झालेल्या अंदाजानुसार दिनांक ०७ जून रोजी परभणी जिल्ह्यात तूरळ ठिकाणी वादळी वारा, मेघगर्जना, वाऱ्याचा वेग अधिक (ताशी ३० ते ४० कि.मी.) राहून हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. दिनांक ०८ जून रोजी परभणी जिल्ह्यात तूरळ ठिकाणी वादळी वारा, मेघगर्जना, वाऱ्याचा वेग अधिक (ताशी ४० ते ५० कि.मी.) राहून हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. परभणी जिल्ह्यात दिनांक ०६, ०९ व १० जून रोजी तूरळ ठिकाणी तर दिनांक ०७ व ०८ जून रोजी काही ठिकाणी हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. परभणी जिल्ह्यात पुढील चोवीस तासात कमाल तापमानात फारशी तफावत जाणवत नाही व त्यानंतर हळूहळू २ ते ३ अं.से. ने वाढ होण्याची तर पुढील पाच दिवसात किमान तापमानात फारशी तफावत जाणवत नाही.

सामान्य सल्ला :

विस्तारीत अंदाजानुसार (ईआरएफएस) मराठवाड्यात दिनांक ०६ ते १२ जून २०२५ दरम्यान पाऊस सरासरीएवढा, कमाल तापमान सरासरीपेक्षा कमी व किमान तापमान सरासरीपेक्षा कमी व दिनांक १३ ते १९ जून २०२५ दरम्यान पाऊस सरासरीपेक्षा जास्त, कमाल तापमान सरासरीएवढे व किमान तापमान सरासरीएवढे राहण्याची शक्यता आहे.

संक, इसरो अहमदाबाद यांच्या उपग्रहाच्या बाष्पोत्सर्जनाच्या जिल्हानिहाय व तालुकानिहाय छायाचित्रानुसार मराठवाड्यात बाष्पोत्सर्जनाचा वेग कमी झालेला आहे.

संदेश : शेतकरी बांधवांनी पेरणीची घाई करू नये. जमिनि त वापसा असतांना पूर्व मशागतीची कामे राहिली असल्यास पूर्व मशागतीची कामे करून घ्यावीत.

पिकांचे नाव	अवस्था	कृषी हवामान सल्ला
सांयाबीन	पूर्वमशागत / आंतरपीक	कोरडवाहू परिस्थितीत सांयाबीन + तुर हे आंतरपीक २:१ किंवा ४:२ या प्रमाणात घ्यावे. तसेच ओलांताखाली सांयाबीन + कापूस हे आंतरपीक १:१ किंवा २:१ या प्रमाणात घेता येते. सांयाबीन पिकाच्या पेरणीसाठी पूर्वमशागतीची कामे केली नसल्यास लवकरात लवकर करून घ्यावीत.
खरीप ज्वारी	पूर्वमशागत / आंतरपीक	आंतरपीक पध्दतीमध्ये खरीप ज्वारी + सांयाबीन २:४ किंवा ३:६ या प्रमाणात दोन ओळींतील अंतर ४५ सेंमी ठेवावे. तसेच खरीप ज्वारी + तुर ३:३ किंवा ४:२ या प्रमाणात आंतरपीक घेता येते. सांयाबीन, मूग, उडीद ही कमी कालावधीची पिके आंतरपीके म्हणून घेताना २:४ या आंतरपीक पध्दतीचा अवलंब करावा. खरीप ज्वारी पिकाच्या पेरणीसाठी पूर्वमशागतीची कामे केली नसल्यास लवकरात लवकर करून घ्यावीत.
बाजरी	पूर्वमशागत / आंतरपीक	बाजरी पिकांमध्ये बाजरी + तुर हे आंतरपीक २:१, ३:३ किंवा ४:२ या प्रमाणात घ्यावे. बाजरी पिकाच्या पेरणीसाठी पूर्वमशागतीची कामे केली नसल्यास लवकरात लवकर करून घ्यावीत.
ऊस	वाडीची	ऊस पिकावर पांढऱ्या माशीचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास, प्रादुर्भावग्रस्त पाने काढून नष्ट करावीत, पिवळ्या चिकट सापळ्यांचा पिकात वापर करावा, रासायनिक कीटकनाशकांमध्ये व्यवस्थापनासाठी क्लोरोपायरीफॉस २० टक्के ३० मिली किंवा इमिडाक्लोप्रिड १७.८ टक्के ३ मिली किंवा अॅसिफे ७५% २० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारवे. ऊस पिकावर खोड किडीचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी क्लोरोपायरीफॉस २० % २५ मिली किंवा क्लोरेट्रानोलीप्रोल १८.५% ४ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून पावसाची उघाड बघून फवारणी करावी.
हळद	आंतरपीक	पाण्याची उपलब्धता असल्यास हळद पिकाची लागवड करून घ्यावी. हळदीमध्ये आंतरपीके घेताना पहिल्या तीन ते साडेतीन महिन्यांपर्यंत काढणी होईल अशा प्रकारची आंतरपीके निवडावीत. यामध्ये पालेभाज्या सारख्या आंतरपिकांचा समावेश असावा.
संत्रा/मोसंबी	जातीची निवड/वाडीची	संत्रा/मोसंबी लागवडीसाठी १X१X१ मीटर या आकाराचे खड्डे घेऊन त्यात अर्धा किलो सुपर फॉस्फेट, ३ ते ४ घमेली शेणखत किंवा कंपोस्टखत व पोयटा माती यांनी खड्डे भरून घ्यावे. संत्रा नविन बाग लागवडीसाठी नागपूर संत्रा, किन्नो तर मोसंबी नविन बाग लागवडीसाठी न्यूसेलर, सातगुडी व फुले मोसंबी इत्यादी जातींची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी. अंबे बहार संत्रा/मोसंबी बागेत रोगनाशकाची फवारणी पावसाची उघाड बघून करावी.
डाळींब	जातीची निवड/वाडीची	डाळींब लागवडीसाठी घेतलेले खड्डे चांगली माती + चांगले कुजलेले व रापलेले शेणखत + १ ते १.५ किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट + पालापाचोळा यांनी जमिनीपासून वर १५ ते २० सेंमी खड्डे भरून घ्यावेत व मधोमध एक बांबूची काठी लावावी. डाळींब नविन बाग लागवडीसाठी भगवा, फुले भगवा सुपर, गणेश, फुले आरक्ता, इत्यादी जातींची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी.
चिकू	जातीची निवड/वाडीची	चिकू लागवडीसाठी घेतलेले १ X१X१ मीटर आकाराचे खड्डे अर्धा किलो सुपर फॉस्फेट, १:३ या प्रमाणात शेणखत + माती या मिश्रणाने खड्डे भरावे. चिकू नविन बाग लागवडीसाठी कालीपती, क्रिकेट बॉल इत्यादी जातींची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी. तूरळ ठिकाणी वादळी वाऱ्यासह पावसाचा अंदाज लक्षात घेता, नविन लागवड केलेल्या व लहान चिकू झाडांना काठीने आधार द्यावा.
भाजीपाला	रोपे तयार करणे / काढणी	पाण्याची उपलब्धता असल्यास भाजीपाला (वांगी, मिरची, टोमॅटो इत्यादी) पिकांची रोपे तयार करण्यासाठी गादी वाफ्यावर बीं टाकावे. काढणीस तयार आसलेल्या भाजीपाला पिकांची काढणी करावी.
फुलशेती	रोपे तयार करणे / काढणी	पाण्याची उपलब्धता असल्यास फुल पिकांची रोपे तयार करण्यासाठी गादी वाफ्यावर बीं टाकावे. काढणीस तयार आसलेल्या फुलपिकांची काढणी करून घ्यावी.
तुती रेशीम उद्योग	---	तुती रोपवाटीका जून महिन्यात एक एकर क्षेत्रासाठी २ गुंठे क्षेत्रावर गादी वाफे करावेत. ५० X३X१.५ फुट (लांबी-रुंदी-उंची) आकाराचे ३ गादी वाफे करावेत. ०६ ते ०८ महिने वयाचे तुती बेणे करण्यासाठी निवडावी. ३ ते ४ डोळे असलेले बेणे पेन्सील आकाराचे निवडून धारदार सिकेटरच्या साहाय्याने डोळ्याच्या लागत खालील बाजूस स्लॅटींग कट व ३ डोळ्याच्या वरच्या डोळ्या लागत फ्लॅट कट घेऊन बेणे तयार करावे. बेणे तयार करताना बेण्याची साल फाटणार नाही याची काळजी घ्यावी. रोगीट बेण्याची छाटणी साठी निवड करू नये. ५X३X२ किंवा ६X३X२ फुट पड्डा पध्दत लागवडीसाठी एकरी ६ हजार बेणे लागवड करावी. दोन भाग शेणखत व एक भाग माती या प्रमाणे जमिनीपासून १.५ फुट उंचीच्या गादी वाफ्यावर २२ सेंमी लांबीचे तुती बेणे दोन ओळीत १५ सेंमी व दोन बेण्यात १० सेंमी अंतर ठेवून लागवड करावी.
पशुधन व्यवस्थापन	-----	पावसाळा ऋतूच्या आगमनासोबतच अनेक आजारांचे देखील आगमन होते. म्हणून पशुधनाच्या आरोग्यासाठी त्रिसुत्री १) भौतिक सुविधा म्हणजेच व्यवस्थित गोठा ज्योग्य किटक व पावसापासून संरक्षण. २) जैविक सुविधा जसेकी लसीकरण, जंतुनाशकाची मात्रा आणि ३) रासायनिक सुविधा म्हणजे आजाराची लागण झाल्यास तात्काळ पशुवैद्यकाच्या मार्गदर्शनाखाली औषधोपचार लसीकरण आणि पावसाच्या आगमनासोबतच तात्काळ शेळी मेंढी मध्ये तसेच वासरांना वयाच्या सातव्या दिवशी घावयाची जंतुनाशकाची मात्रा आवश्यक ठरते.

सदर कृषी हवामान सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.

मुख्य प्रकल्प समन्वयक
ग्रामीण कृषी मौसम सेवा
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी