



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
अखिल भारतीय समन्वयित कृषि हवामानशास्त्र संशोधन प्रकल्प
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी - ४३१ ४०२
ईमेल - amfuparbhani@gmail.com



बीड जिल्हा कृषि हवामान सल्ला पत्रक क्रमांक - ५६/२०२५ - २०२६ शुक्रवार, दिनांक - १०.१०.२०२५

मागील आठवड्यातील हवामानस्थिती (दिनांक ०४ ते १० ऑक्टोबर, २०२५)							हवामान घटक	हवामान अंदाज (दिनांक ११ ते १५ ऑक्टोबर, २०२५ साठी हवामान अंदाज)				
०४/१०	०५/१०	०६/१०	०७/१०	०८/१०	०९/१०	१०/१०	दिनांक	११/१०	१२/१०	१३/१०	१४/१०	१५/१०
							पाऊस (मिमी)	०.०	०.०	०.०	०.०	०.०
							कमाल तापमान (अं.से)	३२.०	३३.०	३३.०	३४.०	३३.०
							किमान तापमान (अं.से)	१७.०	१७.०	१८.०	१९.०	२०.०
							स. ढग स्थिती (आकाश)	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ
							सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	७२	७२	७४	७१	७४
							दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	३२	३२	३४	३०	३४
							वाऱ्याचा वेग (किमी/तास)	५	५	४	४	६
							स. वाऱ्याची दिशा	उत्तर-ईशान्य	ईशान्य	ईशान्य	ईशान्य	पूर्व-ईशान्य
							दु.					

हवामान सारांश / चेतावनी :

प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई येथून प्राप्त झालेल्या अंदाजानुसार बीड जिल्ह्यात पुढील पाच दिवस आकाश स्वच्छ राहून हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. बीड जिल्ह्यात पुढील ४८ तासात कमाल तापमानात फारशी तफावत जाणवत नाही व त्यानंतर हळूहळू २ ते ३ अं.से. ने वाढ होण्याची तर पुढील तीन ते चार दिवसात किमान तापमानात फारशी तफावत जाणवत नाही.

सामान्य सल्ला :

विस्तारीत अंदाजानुसार (ईआरएफएस) मराठवाड्यात दिनांक १० ते १६ ऑक्टोबर, २०२५ दरम्यान पाऊस सरासरीएवढा, कमाल तापमान सरासरीएवढे ते सरासरीपेक्षा कमी व किमान तापमान सरासरी एवढे ते सरासरीपेक्षा किंचीत कमी व दिनांक १७ ते २३ ऑक्टोबर, २०२५ दरम्यान पाऊस सरासरीपेक्षा कमी तर कमाल तापमान सरासरीएवढे व किमान तापमान सरासरी एवढे ते सरासरीपेक्षा किंचीत कमी राहण्याची शक्यता आहे.

संदेश : पुढील पाच दिवस हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता लक्षात घेता, फवारणीची, काढणीची व अंतरमशागतीची कामे करून घ्यावीत.

पिकांचे नाव	अवस्था	कृषी हवामान सल्ला
सोयाबीन	काढणी	काढणीस तयार असलेल्या सोयाबीन पिकची काढणी लवकरात लवकर करावी व सुरक्षित ठिकाणी साठवणूक करावी. काढणी केलेले सोयाबीन पिक वाळवल्यानंतर मळणी करावी.
तूर	वाढीची	जमिनीत साचलेल्या पाण्यामुळे किंवा ओलाव्या मुळे तूर पिकात फायटोथेरा रोग मोठ्या प्रमाणात पसरतो, प्रादुर्भाव दिसून आल्यास, याच्या व्यवस्थापनासाठी ५०० ग्रॅम (२५ ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात) मेटालेझील एम ४ टक्के + मॅन्कोझेब ६४ टक्के (पुर्व मिश्रीत बुरशीनाशक) प्रति एकर या प्रमाणात खोडावर आणि झाडावर फवारणी करून आळवणी पण करावी. किंवा ट्रायकोडर्मा ५०० ग्रॅम (२५ ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात) पाण्यात मिसळून प्रति एकर या प्रमाणात फवारणी व आळवणी करावी. जमिनीत वापसा असतांना तूर पिकात तण नियंत्रण करावे.
ऊस	वाढीची	ऊस पिकात पांढरी माशीचा व पाकोळीचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी, लिक्वॅन्सिलियम लिक्वॅन्स या जैविक बुरशीची ४० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. रासायनिक कीटकनाशकांमध्ये क्लोरोपायरीफॉस २० टक्के ३० मिली किंवा इमिडाक्लोप्रिड १७.८ टक्के ३ मिली किंवा अॅसीफेट ७५ % २० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून पावसाची उघाड बघून फवारणे. इमिडाक्लोप्रिड १७.८% कीटकनाशकासोबत २ टक्के युरिया (२०० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात) मिसळून फवारणी करावी. ऊस पिकात पोक्का बोईंग या रोगाचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी कार्बेन्डाझिम १२ % + मॅन्कोझेब ६३% डब्ल्यूपी ५० ग्रॅम किंवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ५०% डब्ल्यूपी २० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून स्टीकरसह १० ते १२ दिवसांच्या अंतराने २ ते ३ फवारण्या कराव्यात.
हळद	कंद वाढीची	कंदकृजचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास, याच्या व्यवस्थापनासाठी जमिनीतून कार्बेन्डाझिम ५०% -२०० ग्रॅम (१० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात) किंवा मॅन्कोझेब ७५% -६०० ग्रॅम (३० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात) किंवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ५०% -२००० ग्रॅम (५० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात) यापैकी एका बुरशीनाशकाची प्रति एकर या प्रमाणात दरवेळी महिन्यातून एकदा आळवणी करावी. (आळवणी करताना जमिनीमध्ये वापसा असावा. आळवणी केल्यानंतर पिकास पाण्याचा थोडा ताण द्यावा.) हळद पिकास २५ किलो नत्र प्रति हेक्टरी सूक्ष्म सिंचन पद्धतीने तीन ते चार वेळा विभागून द्यावे.
हरभरा	पेरणीची वेळ, अंतर व बियाणे प्रमाण /वाणांची निवड	हरभरा पिकाची पेरणी ३०X१० सेंमी अंतरावर करावी. पेरणीसाठी लहान आकाराच्या देशी वाणासाठी ६० किलो, मध्यम आकाराचे बियाणे ७० किलो तर टपोरे दाण्याच्या काबूली वाणासाठी १०० किलो प्रति हेक्टर बियाणे वापरावे. हरभरा पिकाच्या पेरणीसाठी बीडीएनजी-१-३, बीडीएनजी-७९७ (आकाश), दिग्विजय, जाकी-१२१८, साकी-१५१६, फुले विक्रम, फुले विक्रान्त, पीडीकेडी कांचन, विश्वास इत्यादी वाणांपैकी निवड करावी.
करडई	पेरणीची वेळ, अंतर व बियाणे प्रमाण /वाणांची निवड	करडई पिकाची पेरणी ४५X२० सेंमी अंतरावर करावी. पेरणीसाठी हेक्टरी १० ते १२ किलो बियाणे वापरावे. करडई पिकाच्या पेरणीसाठी शारदा, परभणी कुसुम (परभणी-१२), पूर्णा (परभणी-८६), परभणी-४० (निम काटेरी), अन्नेगीरी-१, एकेएस-३२७, एसएसएफ-७०८, आयएसएफ-७६४ इत्यादी वाणांपैकी निवड करावी.
संत्रा/मोसंबी	फळवाढीची	मृग बहार संत्रा/मोसंबी बागेत ००:००:५० १.५ किलो प्रति १०० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. संत्रा/मोसंबी बागेत रोगनाशकाची फवारणी करून घ्यावी.
डाळींब	फळधारणा ते फळवाढीची	डाळींब बागेत ००:००:५० १.५ किलो प्रति १०० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. काढणीस तयार असलेल्या डाळींब फळांची काढणी करून घ्यावी.
चिकू	काढणी	काढणीस तयार असलेल्या चिकू फळांची काढणी करून घ्यावी व सुरक्षित ठिकाणी साठवणूक करावी.
भाजीपाला	वाढीची/काढणी	रब्बी हंगामात ब्रोकोली, टोमॅटो, फुल कोबी व पत्ता कोबी या भाजीपाला पिकांचे गादी वाफ्यावर रोपे तयार करण्यासाठी बी टाकावे तर मुळा, गाजर, मेथी व पालक इत्यादी पिकांची लागवड करून घ्यावी. काढणीस तयार असलेल्या भाजीपाला पिकांची काढणी करून घ्यावी.
फुलशेती	काढणी	आष्टूर व जिलाडीया या फुलपिकांची लागवड करण्यासाठी गादीवाफ्यावर रोपे तयार करण्यासाठी बी टाकावे. लांब दांड्यांच्या फुलांची (गुलाब) काढणी करताना कळी उमलण्याच्या अवस्थेत असतांना काढणी करावी तर झेंडू, आष्टूर या सारख्या फुलांची काढणी पूर्ण उमलल्याच्या नंतर करावी.
तुती रेशीम उद्योग	----	भरपूर रेशीम उद्योजक शेतकरी तुती बागेस पशुधन व शेणखत उपलब्ध नसल्यामुळे देण्याचे टाळत आहेत आणि पर्यायी बाजारात उपलब्ध जाहिरातीच प्रभावामुळे तुती बागेत इतर निविष्ठा देत आहेत. जमिनीची प्रत खराब होण्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर जबाबदार रासायनिक खतच आहेत. नक्षयुक्त खताच्या अनिर्बंध वापर वाढला असून त्यामुळे कपाशी, सोयाबीन सारखे पीके किडीस बळी पडत आहेत. रेशीम किटक संगणानंतर तुतीची पाने, फांद्या, रेशीम कीटक विष्ठा प्रति एकर ६ टन तर हेक्टरी १५ टन पर्यंत शिल्लक राहते. त्यापासून कॅम्पोस्ट खत किंवा गांडूळखत तयार करता येतो त्यासाठी १६ X ८ X ४ फुट आकाराच्या दोन खड्ड्यात ६ महिने तुतीचे शिल्लक अवशेष कुजवल्यास उत्तम प्रकारचा खत तयार होतो.
पशुधन व्यवस्थापन	-----	दुधावरील जनावरांना योग्य प्रमाणात खनिज द्राव्याचे मिश्रण द्यावे तसेच हिरवा चारा (बरसीम/लुसर्ण) व सुका चारा (गव्हाचा पेंढा) यांचे पशुधनांना संतुलित आहार द्यावा. पशुवैद्यकाच्या सल्ल्याने योग्य वेळी जंतनाशकाची औषधे देण्यात यावी.

सदर कृषी हवामान सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.

मुख्य प्रकल्प समन्वयक
 ग्रामीण कृषी मौसम सेवा
 वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
अखिल भारतीय समन्वयित कृषि हवामानशास्त्र संशोधन प्रकल्प
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी - ४३१ ४०२
ईमेल - amfuparbhani@gmail.com



हिंगोली जिल्हा कृषि हवामान सल्ला पत्रक क्रमांक - ५६/२०२५ - २०२६

शुक्रवार, दिनांक - १०.१०.२०२५

मागील आठवड्यातील हवामानस्थिती (दिनांक ०४ ते १० ऑक्टोबर, २०२५)							हवामान घटक	हवामान अंदाज (दिनांक ११ ते १५ ऑक्टोबर, २०२५ साठी हवामान अंदाज)				
०४/१०	०५/१०	०६/१०	०७/१०	०८/१०	०९/१०	१०/१०	दिनांक	११/१०	१२/१०	१३/१०	१४/१०	१५/१०
							पाऊस (मिमी)	०.०	०.०	०.०	०.०	०.०
							कमाल तापमान (अं.से)	३४.०	३४.०	३५.०	३५.०	३५.०
							किमान तापमान (अं.से)	१९.०	१८.०	१८.०	१९.०	२१.०
							स. ढग स्थिती (आकाश)	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ	अंशतः ढगाळ
							सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	६३	६६	६६	६०	६७
							दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	३८	३८	३८	३८	४१
							वाऱ्याचा वेग (किमी/तास)	८	७	६	६	६
							स. वाऱ्याची दिशा	उत्तर-ईशान्य	उत्तर-ईशान्य	उत्तर-ईशान्य	उत्तर-ईशान्य	ईशान्य
							दु.					

हवामान सारांश / चेतावनी :

प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई येथून प्राप्त झालेल्या अंदाजानुसार हिंगोली जिल्ह्यात पुढील पाच दिवस आकाश स्वच्छ राहून हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. हिंगोली जिल्ह्यात पुढील ४८ तासात कमाल तापमानात फारशी तफावत जाणवत नाही व त्यानंतर हळूहळू २ ते ३ अं.से. ने वाढ होण्याची तर पुढील तीन ते चार दिवसात किमान तापमानात फारशी तफावत जाणवत नाही.

सामान्य सल्ला :

विस्तारीत अंदाजानुसार (ईआरएफएस) मराठवाड्यात दिनांक १० ते १६ ऑक्टोबर, २०२५ दरम्यान पाऊस सरासरीएवढा, कमाल तापमान सरासरीएवढे ते सरासरीपेक्षा कमी व किमान तापमान सरासरी एवढे ते सरासरीपेक्षा किंचित कमी व दिनांक १७ ते २३ ऑक्टोबर, २०२५ दरम्यान पाऊस सरासरीपेक्षा कमी तर कमाल तापमान सरासरीएवढे व किमान तापमान सरासरी एवढे ते सरासरीपेक्षा किंचित कमी राहण्याची शक्यता आहे.

संदेश : पुढील पाच दिवस हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता लक्षात घेता, फवारणीची, काढणीची व अंतरमशागतीची कामे करून घ्यावीत.

पिकांचे नाव	अवस्था	कृषी हवामान सल्ला
सोयाबीन	काढणी	काढणीस तयार असलेल्या सोयाबीन पिकची काढणी लवकरात लवकर करावी व सुरक्षित ठिकाणी साठवणूक करावी. काढणी केलेले सोयाबीन पिक वाळवल्यानंतर मळणी करावी.
तुर	वाढीची	जमिनीत साचलेल्या पाण्यामुळे किंवा ओलाव्या मुळे तुर पिकात फायटोथेरा रोग मोठ्या प्रमाणात पसरतो, प्रादुर्भाव दिसून आल्यास, याच्या व्यवस्थापनासाठी ५०० ग्रॅम (२५ ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात) मेटालॅक्झील एम ४ टक्के + मॅन्कोझेब ६४ टक्के (पूर्व मिश्रीत बुरशीनाशक) प्रति एकर या प्रमाणात खोडावर आणि झाडावर फवारणी करून आळवणी पण करावी. किंवा ट्रायकोडर्मा ५०० ग्रॅम (२५ ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात) पाण्यात मिसळून प्रति एकर या प्रमाणात फवारणी व आळवणी करावी. जमिनीत वापसा असतांना तुर पिकात तण नियंत्रण करावे.
ऊस	वाढीची	ऊस पिकात पांढरी माशीचा व पाकोळीचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी, लिक्नेनीसिलियम लिक्नेनी या जैविक बुरशीची ४० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. रासायनिक कीटकनाशकांमध्ये क्लोरोपायरीफॉस २० टक्के ३० मिली किंवा इमिडाक्लोप्रिड १७.८ टक्के ३ मिली किंवा अॅसीफेट ७५ % २० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून पावसाची उधाड बघून फवारावे. इमिडाक्लोप्रिड १७.८% कीटकनाशकासोबत २ टक्के युरिया (२०० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात) मिसळून फवारणी करावी. ऊस पिकात पोवका बोईंग या रोगाचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी कार्बेन्डाझिम १२ % + मॅन्कोझेब ६३% डब्ल्यूपी ५० ग्रॅम किंवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ५०% डब्ल्यू पी २० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून स्टीकरसह १० ते १२ दिवसांच्या अंतराने २ ते ३ फवारण्या कराव्यात.
हळद	कंद वाढीची	कंदकृजचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास, याच्या व्यवस्थापनासाठी जमिनीतून कार्बेन्डाझिम ५०% -२०० ग्रॅम (१० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात) किंवा मॅन्कोझेब ७५% -६०० ग्रॅम (३० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात) किंवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ५०% -१००० ग्रॅम (५० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात) यापैकी एका बुरशीनाशकाची प्रति एकर या प्रमाणात दरवेळी महिन्यातून एकदा आळवणी करावी. (आळवणी करताना जमिनीमध्ये वापसा असावा. आळवणी केल्यानंतर पिकास पाण्याचा थोडा ताण द्यावा.) हळद पिकास २५ किलो नत्र प्रति हेक्टरी सूक्ष्म सिंचन पध्दतीने तीन ते चार वेळा विभागून द्यावे.
हरभरा	पेरणीची वेळ, अंतर व बियाणे प्रमाण /वाणांची निवड	हरभरा पिकाची पेरणी ३०X१० सेंमी अंतरावर करावी. पेरणीसाठी लहान आकाराच्या देशी वाणासाठी ६० किलो, मध्यम आकाराचे बियाणे ७० किलो तर टपोरे जाण्याच्या काबूली वाणासाठी १०० किलो प्रति हेक्टर बियाणे वापरावे. हरभरा पिकाच्या पेरणीसाठी बीडीएनजी-१-३, बीडीएनजी-७९७ (आकाश), दिग्विजय, जाकी-१२१८, साकी-१५१६, फुले विक्रम, फुले विक्रान्त, पीडीकेव्ही कांचन, विश्वास इत्यादी वाणांपैकी निवड करावी.
करडई	पेरणीची वेळ, अंतर व बियाणे प्रमाण /वाणांची निवड	करडई पिकाची पेरणी ४५X२० सेंमी अंतरावर करावी. पेरणीसाठी हेक्टरी १० ते १२ किलो बियाणे वापरावे. करडई पिकाच्या पेरणीसाठी शारदा, परभणी कुसुम (परभणी-१२), पूर्णा (परभणी-८६), परभणी-४० (निम काटेरी), अन्नेगीरी-१, एकेएस-३२७, एसएसएफ-७०८, आयएसएफ-७६४ इत्यादी वाणांपैकी निवड करावी.
संत्रा/मोसंबी	फळवाढीची	मृग बहार संत्रा/मोसंबी बागेत ००:००:५० १.५ किलो प्रति १०० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. संत्रा/मोसंबी बागेत रोगनाशकाची फवारणी करून घ्यावी.
डाळींब	फळधारणा ते फळवाढीची	डाळींब बागेत ००:००:५० १.५ किलो प्रति १०० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. काढणीस तयार असलेल्या डाळींब फळांची काढणी करून घ्यावी.
चिकू	काढणी	काढणीस तयार असलेल्या चिकू फळांची काढणी करून घ्यावी व सुरक्षित ठिकाणी साठवणूक करावी.
भाजीपाला	वाढीची/काढणी	रब्बी हंगामात ब्रोकोली, टोमॅटो, फुल कोबी व पत्ता कोबी या भाजीपाला पिकांचे गादी वाफ्यावर रोपे तयार करण्यासाठी बी टाकावे तर मुळा, गाजर, मेथी व पालक इत्यादी पिकाची लागवड करून घ्यावी. काढणीस तयार असलेल्या भाजीपाला पिकाची काढणी करून घ्यावी.
फुलशेती	काढणी	आष्टूर व जिलाडीया या फुलपिकाची लागवड करण्यासाठी गादीवाफ्यावर रोपे तयार करण्यासाठी बी टाकावे. लांब दांड्यांच्या फुलांची (गुलाब) काढणी करताना कळी उमलण्याच्या अवस्थेत असतांना काढणी करावी तर झेंडू, आष्टूर या सारख्या फुलांची काढणी पूर्ण उमलल्याच्या नंतर करावी.
तुती रेशीम उद्योग	----	भरपूर रेशीम उद्योजक शेतकरी तुती बागेस पशूधन व शेणखत उपलब्ध नसल्यामुळे देण्याचे टाळत आहेत आणि पर्यायी बाजारात उपलब्ध जाहिरातीचे प्रभावामुळे तुती बागेत इतर निविष्टा देत आहेत. जमिनीची प्रत खराब होण्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर जबाबदार रासायनिक खतच आहेत. नरुयुक्त खताच्या अर्निर्बंध वापर वाढला असून त्यामुळे कपाशी, सोयाबीन सारखे पीके किडीस बळी पडत आहेत. रेशीम किटक संगणानंतर तुतीची पाने, फांद्या, रेशीम कीटक विष्ठा प्रती एकर ६ टन तर हेक्टरी १५ टन पर्यंत शिल्लक राहते. त्यापासून कॅम्पोस्ट खत किंवा गांडूळखत तयार करता येतो त्यासाठी १६ X ८ X ४ फुट आकाराच्या दोन खड्ड्यात ६ महिने तुतीचे शिल्लक अवशेष कुजवल्यास उत्तम प्रकारचा खत तयार होतो.
पशूधन व्यवस्थापन	-----	दुधावरील जनावरांना योग्य प्रमाणात खनिज द्राव्याचे मिश्रण द्यावे तसेच हिरवा चारा (बरसीम/लुसर्ण) व सुका चारा (गव्हाचा पेंढा) यांचे पशूधनांना संतुलित आहार द्यावा. पशूवैद्यकाच्या सल्ल्याने योग्य वेळी जंतनाशकाची औषधे देण्यात यावी.

सदर कृषी हवामान सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.

मुख्य प्रकल्प समन्वयक
 ग्रामीण कृषी मौसम सेवा
 वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
अखिल भारतीय समन्वयित कृषि हवामानशास्त्र संशोधन प्रकल्प
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी - ४३१ ४०२
ईमेल - amfuparbhani@gmail.com



जालना जिल्हा कृषि हवामान सल्ला पत्रक क्रमांक - ५६/२०२५ - २०२६

शुक्रवार, दिनांक - १०.१०.२०२५

मागील आठवड्यातील हवामानस्थिती (दिनांक ०४ ते १० ऑक्टोबर, २०२५)							हवामान घटक	हवामान अंदाज (दिनांक ११ ते १५ ऑक्टोबर, २०२५ साठी हवामान अंदाज)				
०४/१०	०५/१०	०६/१०	०७/१०	०८/१०	०९/१०	१०/१०	दिनांक	११/१०	१२/१०	१३/१०	१४/१०	१५/१०
							पाऊस (मिमी)	०.०	०.०	०.०	०.०	०.०
							कमाल तापमान (अं.से)	३३.०	३३.०	३३.०	३३.०	३४.०
							किमान तापमान (अं.से)	१८.०	१७.०	१७.०	१८.०	१८.०
							स. ढग स्थिती (आकाश)	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ
							दु.					
							सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	६२	६२	६४	६०	६८
							दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	४८	४९	५०	४७	५०
							वाऱ्याचा वेग (किमी /तास)	६	७	५	५	६
							स. वाऱ्याची दिशा	उत्तर-ईशान्य	उत्तर-ईशान्य	उत्तर-ईशान्य	उत्तर-ईशान्य	पूर्व-ईशान्य
							दु.					

हवामान सारांश / चेतावनी :

प्रादेशिक हवामान केंद्र , मुंबई येथून प्राप्त झालेल्या अंदाजानुसार जालना जिल्ह्यात पुढील पाच दिवस आकाश स्वच्छ राहून हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. जालना जिल्ह्यात पुढील ४८ तासात कमाल तापमानात फारशी तफावत जाणवत नाही व त्यानंतर हळूहळू २ ते ३ अं.से. ने वाढ होण्याची तर पुढील तीन ते चार दिवसात किमान तापमानात फारशी तफावत जाणवत नाही.

सामान्य सल्ला :

विस्तारीत अंदाजानुसार (ईआरएफएस) मराठवाड्यात दिनांक १० ते १६ ऑक्टोबर, २०२५ दरम्यान पाऊस सरासरीएवढा, कमाल तापमान सरासरीएवढे ते सरासरीपेक्षा कमी व किमान तापमान सरासरी एवढे ते सरासरीपेक्षा किंचीत कमी व दिनांक १७ ते २३ ऑक्टोबर, २०२५ दरम्यान पाऊस सरासरीपेक्षा कमी तर कमाल तापमान सरासरीएवढे व किमान तापमान सरासरी एवढे ते सरासरीपेक्षा किंचीत कमी राहण्याची शक्यता आहे.

संदेश : पुढील पाच दिवस हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता लक्षात घेता, फवारणीची, काढणीची व अंतरमशागतीची कामे करून घ्यावीत.

पिकांचे नाव	अवस्था	कृषी हवामान सल्ला
सोयाबीन	काढणी	काढणीस तयार असलेल्या सोयाबीन पिकची काढणी लवकरात लवकर करावी व सुरक्षित ठिकाणी साठवणूक करावी. काढणी केलेले सोयाबीन पिक वाळवल्यानंतर मळणी करावी.
तुर	वाढीची	जमिनीत साचलेल्या पाण्यामुळे किंवा ओलाव्या मुळे तुर पिकात फायटोथेरा रोग मोठ्या प्रमाणात पसरतो, प्रादुर्भाव दिसून आल्यास, याच्या व्यवस्थापनासाठी ५०० ग्रॅम (२५ ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात) मेटालॅक्झील एम ४ टक्के + मॅन्कोझेब ६४ टक्के (पूर्व मिश्रीत बुरशीनाशक) प्रति एकर या प्रमाणात खोडावर आणि झाडावर फवारणी करून आळवणी पण करावी. किंवा ट्रायकोडर्मा ५०० ग्रॅम (२५ ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात) पाण्यात मिसळून प्रति एकर या प्रमाणात फवारणी व आळवणी करावी. जमिनीत वापसा असतांना तुर पिकात तण नियंत्रण करावे.
ऊस	वाढीची	ऊस पिकात पांढरी माशीचा व पाकोळीचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी, लिक्नेनीसिलियम लिक्नेनी या जैविक बुरशीची ४० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. रासायनिक कीटकनाशकांमध्ये क्लोरोपायरीफॉस २० टक्के ३० मिली किंवा इमिडाक्लोप्रिड १७.८ टक्के ३ मिली किंवा अॅसीफेट ७५ % २० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून पावसाची उघाड बघून फवारावे. इमिडाक्लोप्रिड १७.८% कीटकनाशकासोबत २ टक्के युरिया (२०० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात) मिसळून फवारणी करावी. ऊस पिकात पोवका बोझिंग या रोगाचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी कार्बेन्डाझिम १२ % + मॅन्कोझेब ६३% डब्ल्यूपी ५० ग्रॅम किंवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ५०% डब्ल्यू पी २० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून स्टीकरसह १० ते १२ दिवसांच्या अंतराने २ ते ३ फवारण्या कराव्यात.
हळद	कंद वाढीची	कंदकृजचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास, याच्या व्यवस्थापनासाठी जमिनीतून कार्बेन्डाझिम ५०% -२०० ग्रॅम (१० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात) किंवा मॅन्कोझेब ७५% -६०० ग्रॅम (३० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात) किंवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ५०% -१००० ग्रॅम (५० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात) यापैकी एका बुरशीनाशकाची प्रति एकरी या प्रमाणात दरवेळी महिन्यातून एकदा आळवणी करावी. (आळवणी करताना जमिनीमध्ये वापसा असावा. आळवणी केल्यानंतर पिकास पाण्याचा थोडा ताण द्यावा.) हळद पिकास २५ किलो नत्र प्रति हेक्टरी सूक्ष्म सिंचन पद्धतीने तीन ते चार वेळा विभागून द्यावे.
हरभरा	पेरणीची वेळ, अंतर व बियाणे प्रमाण /वाणांची निवड	हरभरा पिकाची पेरणी ३०X१० सेंमी अंतरावर करावी. पेरणीसाठी लहान आकाराच्या देशी वाणासाठी ६० किलो, मध्यम आकाराचे बियाणे ७० किलो तर टपोरे दाण्याच्या काबूली वाणासाठी १०० किलो प्रति हेक्टर बियाणे वापरावे. हरभरा पिकाच्या पेरणीसाठी बीडीएनजी-१-३, बीडीएनजी-७९७ (आकाश), दिग्विजय, जाकी-१२१८, साकी-१५१६, फुले विक्रम, फुले विक्रान्त, पीडीकेव्ही कांचन, विश्वास इत्यादी वाणांपैकी निवड करावी.
करडई	पेरणीची वेळ, अंतर व बियाणे प्रमाण /वाणांची निवड	करडई पिकाची पेरणी ४५X२० सेंमी अंतरावर करावी. पेरणीसाठी हेक्टरी १० ते १२ किलो बियाणे वापरावे. करडई पिकाच्या पेरणीसाठी शारदा, परभणी कुसुम (परभणी-१२), पूर्णा (परभणी-८६), परभणी-४० (निम काटेरी), अन्नेगीरी-१, एकेएस-३२७, एसएसएफ-७०८, आयएसएफ-७६४ इत्यादी वाणांपैकी निवड करावी.
संत्रा/मोसंबी	फळवाढीची	मृग बहार संत्रा/मोसंबी बागेत ००:००:५० १.५ किलो प्रति १०० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. संत्रा/मोसंबी बागेत रोगनाशकाची फवारणी करून घ्यावी.
डाळींब	फळधारणा ते फळवाढीची	डाळींब बागेत ००:००:५० १.५ किलो प्रति १०० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. काढणीस तयार असलेल्या डाळींब फळांची काढणी करून घ्यावी.
चिक्	काढणी	काढणीस तयार असलेल्या चिक् फळांची काढणी करून घ्यावी व सुरक्षित ठिकाणी साठवणूक करावी.
भाजीपाला	वाढीची/काढणी	रब्बी हंगामात ब्रोकोली, टोमॅटो, फुल कोबी व पत्ता कोबी या भाजीपाला पिकांचे गादी वाफ्यावर रोपे तयार करण्यासाठी बी टाकावे तर मुळा, गाजर, मैथी व पालक इत्यादी पिकाची लागवड करून घ्यावी. काढणीस तयार असलेल्या भाजीपाला पिकाची काढणी करून घ्यावी.
फुलशेती	काढणी	आष्टूर व जिलाडीया या फुलपिकाची लागवड करण्यासाठी गादीवाफ्यावर रोपे तयार करण्यासाठी बी टाकावे. लांब दांड्यांच्या फुलाची (गुलाब) काढणी करताना कळी उमलण्याच्या अवस्थेत असतांना काढणी करावी तर झेंडू, आष्टूर या सारख्या फुलांची काढणी पूर्ण उमलल्याच्या नंतर करावी.
तुती रेशीम उद्योग	----	भरपूर रेशीम उद्योजक शेतकरी तुती बागेस पशुधन व शेणखत उपलब्ध नसल्यामुळे देण्याचे टाळत आहेत आणि पर्यायी बाजारात उपलब्ध जाहिरातीचे प्रभावामुळे तुती बागेत इतर निविष्टा देत आहेत. जमिनीची प्रत खराब होण्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर जबाबदार रासायनिक खतच आहेत. नश्वरुक्त खताच्या अनिर्बंध वापर वाढला असून त्यामुळे कपाशी, सोयाबीन सारखे पीके किडीस बळी पडत आहेत. रेशीम किटक संगणपानानंतर तुतीची पाने, फांद्या, रेशीम कीटक विष्ठा प्रती एकर ६ टन तर हेक्टरी १५ टन पर्यंत शिल्लक राहते. त्यापासून कॅम्पोस्ट खत किंवा गांडूळखत तयार करता येतो त्यासाठी १६ X ८ X ४ फुट आकाराच्या दोन खड्ड्यात ६ महिने तुतीचे शिल्लक अवशेष कुजवल्यास उत्तम प्रकारचा खत तयार होतो.
पशुधन व्यवस्थापन	-----	दुधावरील जनावरांना योग्य प्रमाणात खनिज द्राव्याचे मिश्रण द्यावे तसेच हिरवा चारा (बरसीम/लुसर्ण) व सुका चारा (गव्हाचा पेंढा) यांचे पशुधनांना संतुलित आहार द्यावा. पशुवैद्यकाच्या सल्ल्याने योग्य वेळी जंतनाशकाची औषधे देण्यात यावी.

सदर कृषी हवामान सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.

मुख्य प्रकल्प समन्वयक
 ग्रामीण कृषी मौसम सेवा
 वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
अखिल भारतीय समन्वयित कृषि हवामानशास्त्र संशोधन प्रकल्प
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी - ४३१ ४०२
ईमेल - amfuparbhani@gmail.com



लातूर जिल्हा कृषि हवामान सल्ला पत्रक क्रमांक - ५६/२०२५ - २०२६

शुक्रवार, दिनांक - १०.१०.२०२५

मागील आठवड्यातील हवामानस्थिती (दिनांक ०४ ते १० ऑक्टोबर, २०२५)							हवामान घटक	हवामान अंदाज (दिनांक ११ ते १५ ऑक्टोबर, २०२५ साठी हवामान अंदाज)				
०४/१०	०५/१०	०६/१०	०७/१०	०८/१०	०९/१०	१०/१०	दिनांक	११/१०	१२/१०	१३/१०	१४/१०	१५/१०
							पाऊस (मिमी)	०.०	०.०	०.०	०.०	०.०
							कमाल तापमान (अं.सें)	३२.०	३३.०	३३.०	३२.०	३२.०
							किमान तापमान (अं.सें)	१७.०	१७.०	१८.०	१८.०	१९.०
							स. ढग स्थिती	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ	अंशतः ढगाळ	अंशतः ढगाळ
							दु. (आकाश)					
							सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	५४	५७	५८	५९	६१
							दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	५३	५३	५३	५२	५७
							वाऱ्याचा वेग (किमी /तास)	७	७	६	६	५
							स. वाऱ्याची दिशा	उत्तर-ईशान्य	उत्तर-ईशान्य	उत्तर-ईशान्य	उत्तर-ईशान्य	ईशान्य
							दु.					

हवामान सारांश / चेतावनी :

प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई येथून प्राप्त झालेल्या अंदाजानुसार लातूर जिल्ह्यात पुढील पाच दिवस आकाश स्वच्छ राहून हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. लातूर जिल्ह्यात पुढील ४८ तासात कमाल तापमानात फारशी तफावत जाणवत नाही व त्यानंतर हळूहळू २ ते ३ अं.से. ने वाढ होण्याची तर पुढील तीन ते चार दिवसात किमान तापमानात फारशी तफावत जाणवत नाही.

सामान्य सल्ला :

विस्तारीत अंदाजानुसार (ईआरएफएस) मराठवाड्यात दिनांक १० ते १६ ऑक्टोबर, २०२५ दरम्यान पाऊस सरासरीएवढा, कमाल तापमान सरासरीएवढे ते सरासरीपेक्षा कमी व किमान तापमान सरासरी एवढे ते सरासरीपेक्षा किंचित कमी व दिनांक १७ ते २३ ऑक्टोबर, २०२५ दरम्यान पाऊस सरासरीपेक्षा कमी तर कमाल तापमान सरासरीएवढे व किमान तापमान सरासरी एवढे ते सरासरीपेक्षा किंचित कमी राहण्याची शक्यता आहे.

संदेश : पुढील पाच दिवस हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता लक्षात घेता, फवारणीची, काढणीची व अंतरमशागतीची कामे करून घ्यावीत.

पिकांचे नाव	अवस्था	कृषी हवामान सल्ला
सोयाबीन	काढणी	काढणीस तयार असलेल्या सोयाबीन पिकची काढणी लवकरात लवकर करावी व सुरक्षित ठिकाणी साठवणूक करावी. काढणी केल्याने सोयाबीन पिक वाळल्यानंतर मळणी करावी.
तूर	वाढीची	जमिनीत साचलेल्या पाण्यामुळे किंवा ओलाव्या मुळे तूर पिकात फायटोथेरा रोग मोठ्या प्रमाणात पसरतो, प्रादुर्भाव दिसून आल्यास, याच्या व्यवस्थापनासाठी ५०० ग्रॅम (२५ ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात) मेटालॅक्झील एम ४ टक्के + मॅन्कोझेब ६४ टक्के (पुर्व मिश्रीत बुरशीनाशक) प्रति एकर या प्रमाणात खोडावर आणि झाडावर फवारणी करून आळवणी पण करावी. किंवा ट्रायकोडर्मा ५०० ग्रॅम (२५ ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात) पाण्यात मिसळून प्रति एकर या प्रमाणात फवारणी व आळवणी करावी. जमिनीत वापसा असतांना तूर पिकात तण नियंत्रण करावे.
ऊस	वाढीची	ऊस पिकात पांढरी माशीचा व पाकोळीचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी, लिक्वॅन्सिलियम लिक्वॅन्स या जैविक बुरशीची ४० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. रासायनिक कीटकनाशकांमध्ये क्लोरोपायरीफॉस २० टक्के ३० मिली किंवा इमिडाक्लोप्रिड १७.८ टक्के ३ मिली किंवा अॅसीफे ७५ % २० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून पावसाची उघाड बघून फवारावे. इमिडाक्लोप्रिड १७.८% कीटकनाशकासोबत २ टक्के युरिया (२०० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात) मिसळून फवारणी करावी. ऊस पिकात पोवळा बोडिंग या रोगाचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी कार्बेन्डाझिम १२ % + मॅन्कोझेब ६३% डब्ल्यूपी ५० ग्रॅम किंवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ५०% डब्ल्यू पी २० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून स्टीकरसह १० ते १२ दिवसांच्या अंतराने २ ते ३ फवारण्या कराव्यात.
हळद	कंद वाढीची	कंदकूजचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास, याच्या व्यवस्थापनासाठी जमिनीतून कार्बेन्डाझिम ५०% -२०० ग्रॅम (१० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात) किंवा मॅन्कोझेब ७५% -६०० ग्रॅम (३० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात) किंवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ५०% -१००० ग्रॅम (५० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात) यापैकी एका बुरशीनाशकाची प्रति एकरी या प्रमाणात दरवेळी महिन्यातून एकदा आळवणी करावी. (आळवणी करताना जमिनीमध्ये वापसा असावा. आळवणी केल्यानंतर पिकास पाण्याचा थोडा ताण द्यावा.) हळद पिकास २५ किलो नत्र प्रति हेक्टरी सूक्ष्म सिंचन पद्धतीने तीन ते चार वेळा विभागून द्यावे.
हरभरा	पेरणीची वेळ, अंतर व बियाणे प्रमाण /वाणांची निवड	हरभरा पिकाची पेरणी ३० X १० सेंमी अंतरावर करावी. पेरणीसाठी लहान आकाराच्या देशी वाणासाठी ६० किलो, मध्यम आकाराचे बियाणे ७० किलो तर टपोरे दाण्याच्या काबूली वाणासाठी १०० किलो प्रति हेक्टर बियाणे वापरावे. हरभरा पिकाच्या पेरणीसाठी बीडीएनजी-१-३, बीडीएनजी-७९७ (आकाश), दिग्विजय, जाकी-१२१८, साकी-१५१६, फुले विक्रम, फुले विक्रान्त, पीडीकेव्ही कांचन, विश्वास इत्यादी वाणांपैकी निवड करावी.
करडई	पेरणीची वेळ, अंतर व बियाणे प्रमाण /वाणांची निवड	करडई पिकाची पेरणी ४५ X २० सेंमी अंतरावर करावी. पेरणीसाठी हेक्टररी १० ते १२ किलो बियाणे वापरावे. करडई पिकाच्या पेरणीसाठी शारदा, परभणी कुसुम (परभणी-१२), पूर्णा (परभणी-८६), परभणी-४० (निम काटेरी), अन्नेगीरी-१, एकेएस-३२७, एसएसएफ-७०८, आयएसएफ-७६४ इत्यादी वाणांपैकी निवड करावी.
संत्रा/मोसंबी	फळवाढीची	मृग बहार संत्रा/मोसंबी बागेत ००:००:५० १.५ किलो प्रति १०० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. संत्रा/मोसंबी बागेत रोगनाशकाची फवारणी करून घ्यावी.
डाळींब	फळधारणा ते फळवाढीची	डाळींब बागेत ००:००:५० १.५ किलो प्रति १०० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. काढणीस तयार असलेल्या डाळींब फळांची काढणी करून घ्यावी.
चिकू	काढणी	काढणीस तयार असलेल्या चिकू फळांची काढणी करून घ्यावी व सुरक्षित ठिकाणी साठवणूक करावी.
भाजीपाला	वाढीची/काढणी	रब्बी हंगामात ब्रोकोली, टोमॅटो, फुल कोबी व पत्ता कोबी या भाजीपाला पिकांचे गादी वाफ्यावर रोपे तयार करण्यासाठी बी टाकावे तर मुळा, गाजर, मेथी व पालक इत्यादी पिकांची लागवड करून घ्यावी. काढणीस तयार असलेल्या भाजीपाला पिकांची काढणी करून घ्यावी.
फुलशेती	काढणी	आष्टूर व जिलाडीया या फुलपिकांची लागवड करण्यासाठी गादीवाफ्यावर रोपे तयार करण्यासाठी बी टाकावे. लांब दांड्यांच्या फुलाची (गुलाब) काढणी करताना कळी उमलण्याच्या अवस्थेत असतांना काढणी करावी तर झेंडू, आष्टूर या सारख्या फुलांची काढणी पूर्ण उमलल्याच्या नंतर करावी.
तुती रेशीम उद्योग	----	भरपूर रेशीम उद्योजक शेतकरी तुती बागेस पशूधन व शेणखत उपलब्ध नसल्यामुळे देण्याचे टाळत आहेत आणि पर्यायी बाजारात उपलब्ध जाहिरातीचे प्रभावामुळे तुती बागेत इतर निविष्टा देत आहेत. जमिनीची प्रत खराब होण्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर जबाबदार रासायनिक खतच आहेत. नश्वरुक्त खताच्या अनिर्बंध वापर वाढला असून त्यामुळे कपाशी, सोयाबीन सारखे पीके किडीस बळी पडत आहेत. रेशीम किटक संगणपनानंतर तुतीची पाने, फांद्या, रेशीम कीटक विच्छा प्रती एकर ६ टन तर हेक्टर १५ टन पर्यंत शिल्लक राहते. त्यापासून कॅम्पोस्ट खत किंवा गांडूळखत तयार करता येतो त्यासाठी १६ X ८ X ४ फुट आकाराच्या दोन खड्ड्यात ६ महिने तुतीचे शिल्लक अवशेष कुजवल्यास उत्तम प्रकारचा खत तयार होतो.
पशूधन व्यवस्थापन	-----	दुधावरील जनावरांना योग्य प्रमाणात खनिज द्राव्याचे मिश्रण द्यावे तसेच हिरवा चारा (बरसीम/लुसर्ण) व सुका चारा (गव्हाचा पेंढा) यांचे पशूधनांना संतुलित आहार द्यावा. पशुवैद्यकाच्या सल्ल्याने योग्य वेळी जंतनाशकाची औषधे देण्यात यावी.

सदर कृषी हवामान सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.

मुख्य प्रकल्प समन्वयक
 ग्रामीण कृषी मौसम सेवा
 वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
अखिल भारतीय समन्वयित कृषि हवामानशास्त्र संशोधन प्रकल्प
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी - ४३१ ४०२
ईमेल - amfuparbhani@gmail.com



नांदेड जिल्हा कृषि हवामान सल्ला पत्रक क्रमांक - ५६/२०२५ - २०२६

शुक्रवार, दिनांक - १०.१०.२०२५

मागील आठवड्यातील हवामानस्थिती (दिनांक ०४ ते १० ऑक्टोबर, २०२५)							हवामान घटक	हवामान अंदाज (दिनांक ११ ते १५ ऑक्टोबर, २०२५ साठी हवामान अंदाज)				
०४/१०	०५/१०	०६/१०	०७/१०	०८/१०	०९/१०	१०/१०	दिनांक	११/१०	१२/१०	१३/१०	१४/१०	१५/१०
							पाऊस (मिमी)	०.०	०.०	०.०	०.०	०.०
							कमाल तापमान (अं.से)	३३.०	३३.०	३४.०	३५.०	३५.०
							किमान तापमान (अं.से)	१९.०	१९.०	१९.०	२०.०	२१.०
							स. ढग स्थिती (आकाश)	स्वच्छ	स्वच्छ	अंशतः ढगाळ	अंशतः ढगाळ	ढगाळ
							सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	६३	६४	६४	६१	६६
							दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	३८	३७	३८	३७	४१
							वाऱ्याचा वेग (किमी/तास)	५	४	४	४	४
							स. वाऱ्याची दिशा	उत्तर	पूर्व	उत्तर-वायव्य	पूर्व	ईशान्य
							दु.					

हवामान सारांश / चेतावनी :

प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई येथून प्राप्त झालेल्या अंदाजानुसार नांदेड जिल्ह्यात पुढील पाच दिवस आकाश स्वच्छ राहून हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. नांदेड जिल्ह्यात पुढील ४८ तासात कमाल तापमानात फारशी तफावत जाणवत नाही व त्यानंतर हळूहळू २ ते ३ अं.से. ने वाढ होण्याची तर पुढील तीन ते चार दिवसात किमान तापमानात फारशी तफावत जाणवत नाही.

सामान्य सल्ला :

विस्तारीत अंदाजानुसार (ईआरएफएस) मराठवाड्यात दिनांक १० ते १६ ऑक्टोबर, २०२५ दरम्यान पाऊस सरासरीएवढा, कमाल तापमान सरासरीएवढे ते सरासरीपेक्षा कमी व किमान तापमान सरासरी एवढे ते सरासरीपेक्षा किंचीत कमी व दिनांक १७ ते २३ ऑक्टोबर, २०२५ दरम्यान पाऊस सरासरीपेक्षा कमी तर कमाल तापमान सरासरीएवढे व किमान तापमान सरासरी एवढे ते सरासरीपेक्षा किंचीत कमी राहण्याची शक्यता आहे.

संदेश : पुढील पाच दिवस हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता लक्षात घेता, फवारणीची, काढणीची व अंतरमशागतीची कामे करून घ्यावीत.

पिकांचे नाव	अवस्था	कृषी हवामान सल्ला
सोयाबीन	काढणी	काढणीस तयार असलेल्या सोयाबीन पिकची काढणी लवकरात लवकर करावी व सुरक्षित ठिकाणी साठवणूक करावी. काढणी केलेले सोयाबीन पिक वाळवल्यानंतर मळणी करावी.
तुर	वाढीची	जमिनीत साचलेल्या पाण्यामुळे किंवा ओलाव्या मुळे तुर पिकात फायटोथेरा रोग मोठ्या प्रमाणात पसरतो, प्रादुर्भाव दिसून आल्यास, याच्या व्यवस्थापनासाठी ५०० ग्रॅम (२५ ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात) मेटालॅक्झील एम ४ टक्के + मॅन्कोझेब ६४ टक्के (पूर्व मिश्रीत बुरशीनाशक) प्रति एकर या प्रमाणात खोडावर आणि झाडावर फवारणी करून आळवणी पण करावी. किंवा ट्रायकोडर्मा ५०० ग्रॅम (२५ ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात) पाण्यात मिसळून प्रति एकर या प्रमाणात फवारणी व आळवणी करावी. जमिनीत वापसा असतांना तुर पिकात तण नियंत्रण करावे.
ऊस	वाढीची	ऊस पिकात पांढरी माशीचा व पाकोळीचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी, लिक्नेनीसिलियम लिक्नेनी या जैविक बुरशीची ४० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. रासायनिक कीटकनाशकांमध्ये क्लोरोपायरीफॉस २० टक्के ३० मिली किंवा इमिडाक्लोप्रिड १७.८ टक्के ३ मिली किंवा अॅसीफेड ७५ % २० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून पावसाची उघाड बघून फवारावे. इमिडाक्लोप्रिड १७.८% कीटकनाशकासोबत २ टक्के युरिया (२०० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात) मिसळून फवारणी करावी. ऊस पिकात पोवका बोईंग या रोगाचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी कार्बेन्डाझिम १२ % + मॅन्कोझेब ६३% डब्ल्यूपी ५० ग्रॅम किंवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ५०% डब्ल्यू पी २० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून स्टीकरसह १० ते १२ दिवसांच्या अंतराने २ ते ३ फवारण्या कराव्यात.
हळद	कंद वाढीची	कंदकृजचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास, याच्या व्यवस्थापनासाठी जमिनीतून कार्बेन्डाझिम ५०% -२०० ग्रॅम (१० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात) किंवा मॅन्कोझेब ७५% -६०० ग्रॅम (३० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात) किंवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ५०% -१००० ग्रॅम (५० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात) यापैकी एका बुरशीनाशकाची प्रति एकरी या प्रमाणात दरवेळी महिन्यातून एकदा आळवणी करावी. (आळवणी करताना जमिनीमध्ये वापसा असावा. आळवणी केल्यानंतर पिकास पाण्याचा थोडा ताण द्यावा.) हळद पिकास २५ किलो नत्र प्रति हेक्टरी सूक्ष्म सिंचन पद्धतीने तीन ते चार वेळा विभागून द्यावे.
हरभरा	पेरणीची वेळ, अंतर व बियाणे प्रमाण/वाणांची निवड	हरभरा पिकाची पेरणी ३०X१० सेंमी अंतरावर करावी. पेरणीसाठी लहान आकाराच्या देशी वाणासाठी ६० किलो, मध्यम आकाराचे बियाणे ७० किलो तर टपोरे दाण्याच्या काबूली वाणासाठी १०० किलो प्रति हेक्टर बियाणे वापरावे. हरभरा पिकाच्या पेरणीसाठी बीडीएनजी-१-३, बीडीएनजी-७९७ (आकाश), दिग्विजय, जाकी-१२१८, साकी-१५१६, फुले विक्रम, फुले विक्रान्त, पीडीकेव्ही कांचन, विश्वास इत्यादी वाणांपैकी निवड करावी.
करडई	पेरणीची वेळ, अंतर व बियाणे प्रमाण/वाणांची निवड	करडई पिकाची पेरणी ४५X२० सेंमी अंतरावर करावी. पेरणीसाठी हेक्टरी १० ते १२ किलो बियाणे वापरावे. करडई पिकाच्या पेरणीसाठी शारदा, परभणी कुसुम (परभणी-१२), पूर्णा (परभणी-८६), परभणी-४० (निम काटेरी), अन्नेगीरी-१, एकेएस-३२७, एसएसएफ-७०८, आयएसएफ-७६४ इत्यादी वाणांपैकी निवड करावी.
संत्रा/मोसंबी	फळवाढीची	मृग बहार संत्रा/मोसंबी बागेत ००:००:५० १.५ किलो प्रति १०० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. संत्रा/मोसंबी बागेत रोगनाशकाची फवारणी करून घ्यावी.
डाळींब	फळधारणा ते फळवाढीची	डाळींब बागेत ००:००:५० १.५ किलो प्रति १०० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. काढणीस तयार असलेल्या डाळींब फळांची काढणी करून घ्यावी.
चिकू	काढणी	काढणीस तयार असलेल्या चिकू फळांची काढणी करून घ्यावी व सुरक्षित ठिकाणी साठवणूक करावी.
भाजीपाला	वाढीची/काढणी	रब्बी हंगामात ब्रोकोली, टोमॅटो, फुल कोबी व पत्ता कोबी या भाजीपाला पिकांचे गादी वाफ्यावर रोपे तयार करण्यासाठी बी टाकावे तर मुळा, गाजर, मैथी व पालक इत्यादी पिकांची लागवड करून घ्यावी. काढणीस तयार असलेल्या भाजीपाला पिकांची काढणी करून घ्यावी.
फुलशेती	काढणी	आष्टूर व जिलाडीया या फुलपिकांची लागवड करण्यासाठी गादीवाफ्यावर रोपे तयार करण्यासाठी बी टाकावे. लांब दांड्यांच्या फुलाची (गुलाब) काढणी करताना कळी उमलण्याच्या अवस्थेत असतांना काढणी करावी तर झेंडू, आष्टूर या सारख्या फुलांची काढणी पूर्ण उमलल्याच्या नंतर करावी.
तुती रेशीम उद्योग	----	भरपूर रेशीम उद्योजक शेतकरी तुती बागेस पशुधन व शेणखत उपलब्ध नसल्यामुळे देण्याचे टाळत आहेत आणि पर्यायी बाजारात उपलब्ध जाहिरातीचे प्रभावामुळे तुती बागेत इतर निविष्टा देत आहेत. जमिनीची प्रत खराब होण्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर जबाबदार रासायनिक खतच आहेत. नष्टयुक्त खताच्या अनिर्बंध वापर वाढला असून त्यामुळे कपाशी, सोयाबीन सारखे पीके किडीस बळी पडत आहेत. रेशीम किटक संगणपानानंतर तुतीची पाने, फांद्या, रेशीम कीटक विष्ठा प्रती एकर ६ टन तर हेक्टर १५ टन पर्यंत शिल्लक राहते. त्यापासून कॅम्पोस्ट खत किंवा गांडूळखत तयार करता येतो त्यासाठी १६ X ८ X ४ फुट आकाराच्या दोन खड्ड्यात ६ महिने तुतीचे शिल्लक अवशेष कुजवल्यास उत्तम प्रकारचा खत तयार होतो.
पशुधन व्यवस्थापन	-----	दुधावरील जनावरांना योग्य प्रमाणात खनिज द्राव्याचे मिश्रण द्यावे तसेच हिरवा चारा (बरसीम/लुसर्ण) व सुका चारा (गव्हाचा पेंढा) यांचे पशुधनांना संतुलित आहार द्यावा. पशुवैद्यकाच्या सल्ल्याने योग्य वेळी जंतनाशकाची औषधे देण्यात यावी.

सदर कृषी हवामान सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.

मुख्य प्रकल्प समन्वयक
 ग्रामीण कृषी मौसम सेवा
 वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
अखिल भारतीय समन्वयीत कृषि हवामानशास्त्र संशोधन प्रकल्प
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी — ४३१ ४०२
ईमेल - amfuparbhani@gmail.com



परभणी जिल्हा कृषि हवामान सल्ला पत्रक क्रमांक — ५६/२०२५ - २०२६ शुक्रवार, दिनांक — १०.१०.२०२५

मागील आठवड्यातील हवामानस्थिती (दिनांक ०४ ते १० ऑक्टोबर, २०२५)							हवामान घटक		हवामान अंदाज (दिनांक ११ ते १५ ऑक्टोबर, २०२५ साठी हवामान अंदाज)				
०४/१०	०५/१०	०६/१०	०७/१०	०८/१०	०९/१०	१०/१०	दिनांक		११/१०	१२/१०	१३/१०	१४/१०	१५/१०
०.०	०.०	१८.२	०.४	०.०	०.०	०.०	पाऊस (मिमी)		०.०	०.०	०.०	०.०	०.०
३२.५	३२.६	२९.१	३०.७	३१.३	३२.०		कमाल तापमान (अं.से)		३४.०	३४.०	३५.०	३५.०	३५.०
२२.५	२२.८	२०.६	२१.३	२०.३	१८.१	१७.८	किमान तापमान (अं.से)		१९.०	१८.०	१८.०	१९.०	२१.०
स्वच्छ	ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	ढगाळ	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ	स.	दृग स्थिती (आकाश)	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ	अंशतः ढगाळ
स्वच्छ	अंशतः ढगाळ	ढगाळ	ढगाळ	स्वच्छ	स्वच्छ		दु.						
११	१०	१००	१५	१३	११	८९	सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)		६३	६५	६७	६२	७०
५५	५३	६९	५८	५४	३५		दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)		३८	३७	३९	३७	४०
३.५	३.४	३.६	१.८	२.०	३.०	३.५	वाऱ्याचा वेग (किमी /तास)		४	४	४	४	४
उत्तर- वायव्य	पश्चिम	पश्चिम- वायव्य	शांत	पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम- वायव्य	स.	वाऱ्याची दिशा	उत्तर	उत्तर- ईशान्य	उत्तर- ईशान्य	उत्तर- ईशान्य	ईशान्य
पश्चिम- वायव्य	पश्चिम- नैऋत्य	पश्चिम- वायव्य	उत्तर- वायव्य	उत्तर- वायव्य	पश्चिम- नैऋत्य		दु.						
पाऊस (मिमी) मागील आठवड्यातील					पाऊस (मिमी) ०१/०१/२०२५ पासून आजपर्यंत			पाऊस (मिमी) ०१/०६/२०२५ पासून आजपर्यंत					
१८.६					१२२६.८			११०७.१					

हवामान सारांश / चेतावनी :

प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई येथून प्राप्त झालेल्या अंदाजानुसार परभणी जिल्ह्यात पुढील पाच दिवस आकाश स्वच्छ राहून हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. परभणी जिल्ह्यात पुढील ४८ तासात कमाल तापमानात फारशी तफावत जाणवत नाही व त्यानंतर हळूहळू २ ते ३ अंसे. ने वाढ होण्याची तर पुढील तीन ते चार दिवसात किमान तापमानात फारशी तफावत जाणवत नाही.

सामान्य सल्ला :

विस्तारीत अंदाजानुसार (ईआरएफएस) मराठवाड्यात दिनांक १० ते १६ ऑक्टोबर, २०२५ दरम्यान पाऊस सरासरीएवढा, कमाल तापमान सरासरीएवढे ते सरासरीपेक्षा कमी व किमान तापमान सरासरी एवढे ते सरासरीपेक्षा किंचित कमी व दिनांक १७ ते २३ ऑक्टोबर, २०२५ दरम्यान पाऊस सरासरीपेक्षा कमी तर कमाल तापमान सरासरीएवढे व किमान तापमान सरासरी एवढे ते सरासरीपेक्षा किंचित कमी राहण्याची शक्यता आहे.

संदेश : पुढील पाच दिवस हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता लक्षात घेता, फवारणीची, काढणीची व अंतरमशागतीची कामे करून घ्यावीत.

पिकाचे नाव	अवस्था	कृषी हवामान सल्ला
सोयाबीन	काढणी	काढणीस तयार असलेल्या सोयाबीन पिकची काढणी लवकरात लवकर करावी व सुरक्षित ठिकाणी साठवणूक करावी. काढणी केलेले सोयाबीन पिक वाळवल्यानंतर मळणी करावी.
तुर	वाढीची	जमिनीत साचलेल्या पाण्यामुळे किंवा ओलाव्या मुळे तुर पिकात फायटोथेरा रोग मोठ्या प्रमाणात पसरतो, प्रादुर्भाव दिसून आल्यास, याच्या व्यवस्थापनासाठी ५०० ग्रॅम (२५ ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात) मेटालेक्झील एम ४ टक्के + मॅन्कोझेब ६४ टक्के (पुर्व मिश्रीत बुरशीनाशक) प्रति एकर या प्रमाणात खोडावर आणि झाडावर फवारणी करून आळवणी पण करावी. किंवा ट्रायकोडर्मा ५०० ग्रॅम (२५ ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात) पाण्यात मिसळून प्रति एकर या प्रमाणात फवारणी व आळवणी करावी. जमिनीत वापसा असतांना तुर पिकात तण नियंत्रण करावे.
ऊस	वाढीची	ऊस पिकात पांढरी माशीचा व पाकोळीचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी, लिक्नेनीसिलियम लिक्नेनी या जैविक बुरशीची ४० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. रासायनिक कीटकनाशकांमध्ये क्लोरोपायरीफॉस २० टक्के ३० मिली किंवा इमिडाक्लोप्रिड १७.८ टक्के ३ मिली किंवा अॅसोफेट ७५ % २० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून पावसाची उघाड बघून फवारावे. इमिडाक्लोपीड १७.८% कीटकनाशकासोबत २ टक्के युरिया (२०० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात) मिसळून फवारणी करावी. ऊस पिकात पोक्का बोईंग या रोगाचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी कार्बेन्डाझिम १२ % + मॅन्कोझेब ६३% डब्ल्यूपी ५० ग्रॅम किंवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ५०% डब्ल्यू पी २० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून स्टीकरसह १० ते १२ दिवसांच्या अंतराने २ ते ३ फवारण्या कराव्यात.
हळद	कंद वाढीची	कंदकृजचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास, याच्या व्यवस्थापनासाठी जमिनीतून कार्बेन्डाझिम ५०% -२०० ग्रॅम (१० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात) किंवा मॅन्कोझेब ७५% -६०० ग्रॅम (३० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात) किंवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ५०% -१००० ग्रॅम (५० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात) यापैकी एका बुरशीनाशकाची प्रति एकर या प्रमाणात दरवेळी महिन्यातून एकदा आळवणी करावी. (आळवणी करताना जमिनीमध्ये वापसा असावा. आळवणी केल्यानंतर पिकास पाण्याचा थोडा ताण द्यावा.) हळद पिकास २५ किलो नत्र प्रति हेक्टरी सूक्ष्म सिंचन पध्दतीने तीन ते चार वेळा विभागून द्यावे.
हरभरा	पेरणीची वेळ, अंतर व बियाणे प्रमाण /वाणांची निवड	हरभरा पिकाची पेरणी ३० X १० सेंमी अंतरावर करावी. पेरणीसाठी लहान आकाराच्या देशी वाणासाठी ६० किलो, मध्यम आकाराचे बियाणे ७० किलो तर टपोरे दाण्याच्या काबूली वाणासाठी १०० किलो प्रति हेक्टरी बियाणे वापरावे. हरभरा पिकाच्या पेरणीसाठी बीडीएनजी-१-३, बीडीएनजी-७९७ (आकाश), दिग्विजय, जाकी-१२१८, साकी-१५१६, फुले विक्रम, फुले विक्रांत, पीडीकेव्ही कांचन, विश्वास इत्यादी वाणांपैकी निवड करावी.
करडई	पेरणीची वेळ, अंतर व बियाणे प्रमाण /वाणांची निवड	करडई पिकाची पेरणी ४५ X २० सेंमी अंतरावर करावी. पेरणीसाठी हेक्टरी १० ते १२ किलो बियाणे वापरावे. करडई पिकाच्या पेरणीसाठी शारदा, परभणी कुसुम (परभणी-१२), पूर्णा (परभणी-८६), परभणी-४० (निम काटेरी), अन्नेगीरी-१, एकेएस-३२७, एसएसएफ-७०८, आयएसएफ-७६४ इत्यादी वाणांपैकी निवड करावी.
संत्रा/मोसंबी	फळवाढीची	मृग बहार संत्रा/मोसंबी बागेत ००:००:५० १.५ किलो प्रति १०० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. संत्रा/मोसंबी बागेत रोगनाशकाची फवारणी करून घ्यावी.
डाळींब	फळवाढीची	डाळींब बागेत ००:००:५० १.५ किलो प्रति १०० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. काढणीस तयार असलेल्या डाळींब फळांची काढणी करून घ्यावी.
चिकू	काढणी	काढणीस तयार असलेल्या चिकू फळांची काढणी करून घ्यावी व सुरक्षित ठिकाणी साठवणूक करावी.
भाजीपाला	वाढीची/काढणी	रब्बी हंगामात ब्रोकोली, टोमॅटो, फुल कोबी व पत्ता कोबी या भाजीपाला पिकांचे गादी वाफ्यावर रोपे तयार करण्यासाठी बी टाकावे तर मुळा, गाजर, मेथी व पालक इत्यादी पिकाची लागवड करून घ्यावी. काढणीस तयार असलेल्या भाजीपाला पिकाची काढणी करून घ्यावी.
फुलशेती	काढणी	आष्टूर व जिलाडीया या फुलपिकाची लागवड करण्यासाठी गादीवाफ्यावर रोपे तयार करण्यासाठी बी टाकावे. लांब दांड्यांच्या फुलाची (गुलाब) काढणी करताना कळी उमलण्याच्या अवस्थेत असतांना काढणी करावी तर झेंडू, आष्टूर या सारख्या फुलांची काढणी पूर्ण उमलल्याच्या नंतर करावी.
तुती रेशीम उद्योग		भरपूर रेशीम उद्योजक शेतकरी तुती बागेस पशूधन व शेणखत उपलब्ध नसल्यामुळे देण्याचे टाळत आहेत आणि पर्यायी बाजारात उपलब्ध जाहिरातींचे प्रभावामुळे तुती बागेत इतर निविडा देत आहेत. जमिनीची प्रत खराब होण्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर जबाबदार रासायनिक खतच आहेत. नश्वरुत खताच्या अनिर्बंध वापर वाढला असून त्यामुळे कपाशी, सोयाबीन सारखे पीके किडीस बळी पडत आहेत. रेशीम किटक संगापनानंतर तुतीची पाने, फांद्या, रेशीम कीटक विष्ठा प्रति एकर ६ टन तर हेक्टरी १५ टन पर्यंत शिल्लक राहते. त्यापासून कॅम्पोस्ट खत किंवा गांडूळखत तयार करता येतो त्यासाठी १६ X ८ X ४ फुट आकाराच्या दोन खड्ड्यात ६ महिने तुतीचे शिल्लक अवशेष कुजवल्यास उत्तम प्रकारचा खत तयार होतो.
पशूधन व्यवस्थापन		दुधावरील जनावरांना योग्य प्रमाणात खनिज द्राव्याचे मिश्रण द्यावे तसेच हिरवा चारा (बरसीम/लुसर्ण) व सुका चारा (गव्हाचा पेंढा) यांचे पशूधनांना संतुलित आहार द्यावा. पशूवैद्यकाच्या सल्ल्याने योग्य वेळी जंतनाशकाची औषधे देण्यात यावी.

सदर कृषी हवामान सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.

मुख्य प्रकल्प समन्वयक

ग्रामीण कृषी मौसम सेवा

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी