



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
अखिल भारतीय समन्वयित कृषि हवामानशास्त्र संशोधन प्रकल्प
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी - ४३१ ४०२
ईमेल - amfuparbhani@gmail.com



बीड जिल्हा कृषि हवामान सल्ला पत्रक क्रमांक - ३२/२०२५ - २०२६ शुक्रवार, दिनांक - १८.०७.२०२५

मागील आठवड्यातील हवामानस्थिती (दिनांक १२ ते १८ जूलै २०२५)							हवामान घटक	हवामान अंदाज (दिनांक १९ ते २३ जुलै, २०२५ साठी हवामान अंदाज)				
१२/०७	१३/०७	१४/०७	१५/०७	१६/०७	१७/०७	१८/०७	दिनांक	१९/०७	२०/०७	२१/०७	२२/०७	२३/०७
							पाऊस (मिमी)	१०.०	१.०	५.०	६.०	३.०
							कमाल तापमान (अं.से)	३१.०	३१.०	३२.०	३१.०	३०.०
							किमान तापमान (अं.से)	२४.०	२४.०	२४.०	२४.०	२४.०
							स. ढग स्थिती (आकाश)	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ
							स. दु.					
							सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	८०	८२	८३	८०	७९
							दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	५८	५३	५९	५३	५७
							वाऱ्याचा वेग (किमी/तास)	१४	१४	१६	१७	२१
							स. दु.	पश्चिम-वायव्य	पश्चिम-वायव्य	पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम

हवामान सारांश / चेतावनी :

प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई येथून प्राप्त झालेल्या अंदाजानुसार दिनांक १८ जूलै रोजी बीड जिल्ह्यात तूरळक ठिकाणी वादळी वारा, मेघगर्जना, वाऱ्याचा वेग अधिक (ताशी ३० ते ४० कि.मी.) राहून हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. बीड जिल्ह्यात दिनांक १८ व २१ जूलै रोजी काही ठिकाणी तर दिनांक १९, २० व २२ जूलै रोजी तूरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. बीड जिल्ह्यात पुढील तीन ते चार दिवसात कमाल तापमानात तर किमान तापमानात पुढील चार ते पाच दिवसात फारशी तफावत जाणवत नाही.

सामान्य सल्ला :

विस्तारीत अंदाजानुसार (ईआरएफएस) मराठवाड्यात दिनांक १८ ते २४ जूलै, २०२५ दरम्यान पाऊस सरासरीपेक्षा कमी, कमाल तापमान सरासरीपेक्षा जास्त व किमान तापमान सरासरीपेक्षा व दिनांक २५ ते ३१ जूलै २०२५ दरम्यान पाऊस सरासरीपेक्षा, कमाल तापमान व किमान तापमान सरासरीपेक्षा राहण्याची शक्यता आहे.

संक, इसरो अहमदाबाद यांच्या उपग्रहाच्या बाष्पोत्सर्जनाच्या जिल्हानिहाय व तालुकानिहाय छायाचित्रानुसार मराठवाड्यात बाष्पोत्सर्जनाचा वेग किंचित कमी झालेला आहे.

संदेश : पेरणी न झालेल्या ठिकाणी पेरणी योग्य पाऊस (७५ ते १०० मिमी) झाला असल्यास सूर्यफुल, तूर, संकरीत बाजरी, सोयाबीन + तूर (४:२), बाजरी + तूर (३:३), एरंडी, कारळ आणि तिळ, एरंडी + धने ही पिके घ्यावीत.

पिकांचे नाव	अवस्था	कृषी हवामान सल्ला
सोयाबीन	वाढीची	सोयाबीन पिकात अंतरमशागतीची कामे करून पिक तण विरहीत ठेवावे. सोयाबीन पिकात पाने खाणाऱ्या अळ्या व घाटेअळी (उंट अळी)चा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास, याच्या व्यवस्थापनासाठी प्रोफेनोफॉस ५०% ईसी २० मिली किंवा लॅम्बडा सायहॅलोप्रॉन ४.९० % सीएस ६ मिली किंवा इंडोक्झकाब १५.८० % ईसी ७ मिली प्रति १० लिटर पाणी यापैकी कुठलेही एक किटकनाशक पाऊसाने उघाड दिल्यास फवारवे. सोयाबीन पिक पेरणी करून २० दिवस झाले असल्यास तणांच्या व्यवस्थापनासाठी इमॅझॉमेक्स ३५ % + इमीझीथीपायर ३५% २ ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून पावसाची उघाड बघून फवारवे. सोयाबीन पिकास पाण्याचा ताण बसत असल्यास उपलब्धतेनुसार पाणी द्यावे. सोयाबीन पिकाची पेरणी करून एक महिना झाला असल्यास १ % (१०० ग्रॅम प्रति १० लिटर) पोटॅशियम नायट्रेटची (१३:००:४५) फवारणी करावी. सूक्ष्म अन्नद्रव्यांच्या कमतरतेमुळे सोयाबीन पिक पिवळे दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी मायक्रोन्यूट्रिएंट ग्रेड-२ ५० मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून पावसाची उघाड बघून फवारणी करावी.
खरीप ज्वारी	वाढीची	खरीप ज्वारी पिकात अंतरमशागतीची कामे करून पिक तण विरहीत ठेवावे. खरीप ज्वारी पिकास पाण्याचा ताण बसत असल्यास उपलब्धतेनुसार पाणी द्यावे. खरीप ज्वारी पिकाची पेरणी करून एक महिना झाला असल्यास १ % (१०० ग्रॅम प्रति १० लिटर) पोटॅशियम नायट्रेटची (१३:००:४५) फवारणी करावी. खरीप ज्वारी पिकाची पेरणी करून एक महिना झाला असल्यास उर्वरीत ४० किलो नत्र, २० किलो स्फुरद व २० किलो पालाश प्रति हेक्टर खतमात्रा द्यावी.
बाजरी	पेरणी/वाढीची	पेरणी न केलेल्या भागात पेरणीयोग्य पाऊस (७५-१०० मिमी) झाल्यानंतर बिजप्रक्रिया करूनच बाजरी पिकाची पेरणी करावी. बाजरी पिकाची पेरणी ३० जुलैपर्यंत करता येते. बाजरी पिकात अंतरमशागतीची कामे करून पिक तण विरहीत ठेवावे. बाजरी पिकास पाण्याचा ताण बसत असल्यास उपलब्धतेनुसार पाणी द्यावे. बाजरी पिकाची पेरणी करून एक महिना झाला असल्यास १ % (१०० ग्रॅम प्रति १० लिटर) पोटॅशियम नायट्रेटची (१३:००:४५) फवारणी करावी. बाजरी पिकाची पेरणी करून एक महिना झाला असल्यास उर्वरीत ४० किलो नत्र, २० किलो स्फुरद व २० किलो पालाश प्रति हेक्टर खतमात्रा द्यावी.
ऊस	वाढीची	ऊस पिकात पांढरी माशीचा व पाकोळीचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी, लिक्वॅन्सीलियम लिक्वॅन्सी या जैविक बुरशीची ४० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. रासायनिक कीटकनाशकांमध्ये क्लोरोपायरीफॉस २० टक्के ३० मिली किंवा इमिडाक्लोप्रिड १७.८ टक्के ३ मिली किंवा अॅसीफेन ७५ % २० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारवे. इमिडाक्लोप्रिड १७.८% कीटकनाशकासोबत २ टक्के युरिया २०० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून (पावसाची उघाड बघून फवारणी करावी. ऊस पिकास पाण्याचा ताण बसत असल्यास उपलब्धतेनुसार पाणी द्यावे.
हळद	आंतरपिक/वाढीची	हळदीमध्ये आंतरपिके घेताना पहिल्या तीन ते साडेतीन महिन्यांपर्यंत काढणी होईल अशा प्रकारची आंतरपिके निवडावीत. यामध्ये पालेभाज्या सारख्या आंतरपिकांचा समावेश असावा. हळद पिकास पाण्याचा ताण बसत असल्यास उपलब्धतेनुसार पाणी द्यावे. हळद पिकात अंतरमशागतीची कामे करून पिक तण विरहीत ठेवावे. हळद पिकास २५ किलो नत्र प्रति हेक्टर सूक्ष्म सिंचन पद्धतीने महिन्यातून तीन ते चार वेळा द्यावे.
संत्रा/मोसंबी	जातीची निवड/वाढीची/फुलधारणा	मृग बहार संत्रा/मोसंबी बागेत पाण्याचा ताण बसणार नाही याची दक्षत घ्यावी व आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे. संत्रा नविन बाग लागवडीसाठी नागपूर संत्रा, किन्नो तर मोसंबी नविन बाग लागवडीसाठी न्यूसेलर, सातगुडी व फुले मोसंबी इत्यादी जातींची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी. अंबे बहार संत्रा/मोसंबी बागेत रसशोषण करणाऱ्या किडीच्या व्यवस्थापनासाठी कीटकनाशकाची फवारणी पावसाची उघाड बघून करावी.
डाळींब	जातीची निवड/फुलारा, वाढीची	डाळींब बागेतील अतिरिक्त फुटवे काढावेत. मृग बहार डाळींब बागेत पाण्याचा ताण बसणार नाही याची दक्षत घ्यावी व आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे. डाळींब नविन बाग लागवडीसाठी भगवा, फुले भगवा सुपर, गणेश, फुले आरक्ता, इत्यादी जातींची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी. डाळींब बागेत ००:५२:३४ १५ ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात मिसळून पावसाची उघाड बघून फवारणी करावी.
चिक्कू	जातीची निवड/वाढीची	चिक्कू नविन बाग लागवडीसाठी कालीपत्ती, क्रिकेट बॉल इत्यादी जातींची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी. चिक्कू बागेत आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे.
भाजीपाला	पूर्णलागवड/काढणी/वाढीची	भाजीपाला पिकास पाण्याचा ताण बसत असल्यास आवश्यकतेनुसार सूक्ष्म सिंचन पद्धतीने पाणी व्यवस्थापन करावे. गादीवाफ्यावर तयार केलेल्या भाजीपाला पिकांच्या रोपांना ४५ दिवस झाले असल्यास पाऊस झालेल्या ठिकाणी जमिनीत ओलावा बघून भाजीपाला पिकांची (वांगी, मिरची, टोमॅटो इ.) पूर्णलागवड करावी. पाऊस झालेल्या ठिकाणी जमिनीत ओलावा बघून बियाद्वारे लागवड केल्या जाणाऱ्या भाज्या उदा. भेंडी, कारले, भोपळा, दोडका इत्यादी भाजीपाला पिकांची लागवड करावी. काढणीस तयार असलेल्या भाजीपाला पिकांची काढणी करून घ्यावी. भाजीपाला (मिरची, वांगे व भेंडी) पिकात रसशोषण करणाऱ्या किडीचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास त्याच्या व्यवस्थापनासाठी पायरीप्रॉक्सीफेन ५% + फेनप्रोपाथ्रीन १५% १० मीली किंवा डायमथोएट ३०% १३ मीली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
फुलशेती	पूर्णलागवड/काढणी/वाढीची	फुल पिकास पाण्याचा ताण बसत असल्यास आवश्यकतेनुसार सूक्ष्म सिंचन पद्धतीने पाणी व्यवस्थापन करावे. पाऊस झालेल्या ठिकाणी जमिनीत ओलावा असल्याची खात्री करून फुल पिकाची पूर्णलागवड करावी. काढणीस तयार असलेल्या फुलपिकांची काढणी करून घ्यावी. काढणीस तयार असलेल्या फुलपिकांची काढणी करून घ्यावी.
तुती रेशीम उद्योग	---	चिन देशाच्या तुलनेत भारतात वर्षाकाठी रेशीम कोषाची सरासरी निम्मी पिके म्हणजे ४-५ पिके घेतली जातात याउलट चिन देशात वर्षाला कोषाची १० ते १२ पिके घेतली जातात. प्रती एकर प्रती पिक चिन देशात २५० ते ३०० अंडीपूजाचे एक पीक तर भारतात १५५० ते २०० अंडीपूज सरासरी घेतले जातात. जागतीक कच्च्या रेशीम उत्पादनात सातत्याने चिन देश प्रथम क्रमांकावर आहे. भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. रेशीम उद्योगात भारत देशात ८.९ दशलक्ष लोकांना रोजगार उपलब्ध होतो तर चिन देशात फक्त १ दशलक्ष लोक हे रेशीम उद्योगाचे कार्य करत आहेत. देशाच्या तुलनेत आपल्या शेतकऱ्यांनी तुती पानाची प्रत आणि रेशीम किटक संशोधन तंत्रज्ञान सुधारणा करणे गरजेचे आहे तरच जागतीक स्पर्धेत राहता येईल.
पशुधन व्यवस्थापन	---	गोवंशीय पशुधनामध्ये लम्पी स्क्रीन रोगाचा प्रादुर्भाव अत्यंत वेगाने होत आहे. याची सर्वात जास्त झळ लहान वयातील वासरूंना जाणवत असून मृत्यूचे प्रमाण वाढत आहे. अशा वेळी नियंत्रणासाठी व त्यांची शारीरिक प्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी १) वासरूंना चिक पाजवा. २) वयाच्या सातव्या दिवशी जंतनाशक औषधीची मात्रा द्यावी. ३) महाराष्ट्र शासन यांच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार लसीकरण करून घ्यावे. ४) आजारी आणि निरोगी वासरे, गोधन स्वतंत्र पणे विलगीकरण करावे. ५) सर्वात महत्वाचे म्हणजे २० % सूश्रूषा व ८०% काळजी (ज्यामध्ये पाणी, सकस चारा, जखमांची सुश्रूषा इत्यादी) गोष्टी काळ्यात.

सदर कृषि हवामान सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.

मुख्य प्रकल्प समन्वयक
ग्रामीण कृषी मौसम सेवा
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
अखिल भारतीय समन्वयित कृषि हवामानशास्त्र संशोधन प्रकल्प
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी - ४३१ ४०२
ईमेल - amfuparbhani@gmail.com



हिंगोली जिल्हा कृषि हवामान सल्ला पत्रक क्रमांक - ३२/२०२५ - २०२६ शुक्रवार, दिनांक - १८.०७.२०२५

मागील आठवड्यातील हवामानस्थिती (दिनांक १२ ते १८ जुलै २०२५)							हवामान घटक	हवामान अंदाज (दिनांक १९ ते २३ जुलै, २०२५ साठी हवामान अंदाज)				
१२/०७	१३/०७	१४/०७	१५/०७	१६/०७	१७/०७	१८/०७	दिनांक	१९/०७	२०/०७	२१/०७	२२/०७	२३/०७
							पाऊस (मिमी)	१.०	५.०	४.०	६.०	४.०
							कमाल तापमान (अं.से)	३२.०	३२.०	३२.०	३१.०	३१.०
							किमान तापमान (अं.से)	२६.०	२६.०	२५.०	२५.०	२५.०
							स. दु.	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ
							सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	७९	७८	८०	७९	७६
							दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	५९	५९	५०	५५	५६
							वाऱ्याचा वेग (किमी /तास)	८	१२	१४	१५	१८
							स. दु.	वायव्य	वायव्य	पश्चिम- वायव्य	पश्चिम- वायव्य	पश्चिम

हवामान सारांश / चेतावनी :

प्रादेशिक हवामान केंद्र , मुंबई येथून प्राप्त झालेल्या अंदाजानुसार दिनांक १८ व २१ जुलै रोजी हिंगोली जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी वादळी वारा, मेघगर्जना, वाऱ्याचा वेग अधिक (ताशी ३० ते ४० कि.मी.) राहून हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. हिंगोली जिल्ह्यात दिनांक १८ व २१ जुलै रोजी काही ठिकाणी तर दिनांक १९, २० व २२ जुलै रोजी तुरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. हिंगोली जिल्ह्यात पुढील तीन ते चार दिवसात कमाल तापमानात तर किमान तापमानात पुढील चार ते पाच दिवसात फारशी तफावत जाणवत नाही.

सामान्य सल्ला :

विस्तारीत अंदाजानुसार (ईआरएफएस) मराठवाड्यात दिनांक १८ ते २४ जुलै, २०२५ दरम्यान पाऊस सरासरीपेक्षा कमी, कमाल तापमान सरासरीपेक्षा जास्त व किमान तापमान सरासरीपेक्षा व दिनांक २५ ते ३१ जुलै २०२५ दरम्यान पाऊस सरासरीपेक्षा, कमाल तापमान व किमान तापमान सरासरीपेक्षा राहण्याची शक्यता आहे.

संक, इसरो अहमदाबाद यांच्या उपग्रहाच्या बाष्पोत्सर्जनाच्या जिल्हानिहाय व तालुकानिहाय छायाचित्रानुसार मराठवाड्यात बाष्पोत्सर्जनाचा वेग किंचित कमी झालेला आहे.

संदेश : पेरणी न झालेल्या ठिकाणी पेरणी योग्य पाऊस (७५ ते १०० मिमी) झाला असल्यास सूर्यफुल, तूर, संकरीत बाजरी, सोयाबीन + तूर (४:२), बाजरी + तूर (३:३), एरंडी, कारळ आणि तिळ, एरंडी + धने ही पिके घ्यावीत.

पिकांचे नाव	अवस्था	कृषी हवामान सल्ला
सोयाबीन	वाडीची	सोयाबीन पिकात अंतरमशागतीची कामे करून पिक तण विरहीत ठेवावे. सोयाबीन पिकात पाने खाणाऱ्या अळ्या व घाटेअळी (उंट अळी)चा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास, याच्या व्यवस्थापनासाठी प्रोफेनोफॉस ५०% ईसी २० मिली किंवा लॅम्बडा सायहॅलोथ्रीन ४.९० % सीएस ६ मिली किंवा इंडोक्झाकार्ब ५५.८० % ईसी ७ मिली प्रति १० लिटर पाणी यापैकी कुठलेही एक किटकनाशक पाऊसाने उघाड दिल्यास फवारवे. सोयाबीन पिक पेरणी करून २० दिवस झाले असल्यास तणांच्या व्यवस्थापनासाठी इमॅझोमेक्स ३५ % + इमीझीथोपायर ३५% २ ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून पावसाची उघाड बघून फवारवे. सोयाबीन पिकास पाण्याचा ताण बसत असल्यास उपलब्धतेनुसार पाणी द्यावे. सोयाबीन पिकाची पेरणी करून एक महिना झाला असल्यास १ % (१०० ग्रॅम प्रति १० लिटर) पोर्टोशियम नायट्रेटची (१३:००:४५) फवारणी करावी. सूक्ष्म अन्नद्रव्यांच्या कमतरतेमुळे सोयाबीन पिक पिवळे दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी मायक्रोन्यूट्रिएंट ग्रेड-२ ५० मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून पावसाची उघाड बघून फवारणी करावी.
खरीप ज्वारी	वाडीची	खरीप ज्वारी पिकात अंतरमशागतीची कामे करून पिक तण विरहीत ठेवावे. खरीप ज्वारी पिकास पाण्याचा ताण बसत असल्यास उपलब्धतेनुसार पाणी द्यावे. खरीप ज्वारी पिकाची पेरणी करून एक महिना झाला असल्यास १ % (१०० ग्रॅम प्रति १० लिटर) पोर्टोशियम नायट्रेटची (१३:००:४५) फवारणी करावी. खरीप ज्वारी पिकाची पेरणी करून एक महिना झाला असल्यास उर्वरीत ४ ० किलो नत्र, २० किलो स्फुरद व २० किलो पालाश प्रति हेक्टर खतमात्रा द्यावी.
बाजरी	पेरणी/वाडीची	पेरणी न केलेल्या भागात पेरणीयोग्य पाऊस (७५-१०० मिमी) झाल्यानंतर बिजप्रक्रिया करूनच बाजरी पिकाची पेरणी करावी. बाजरी पिकाची पेरणी ३० जुलैपर्यंत करता येते. बाजरी पिकात अंतरमशागतीची कामे करून पिक तण विरहीत ठेवावे. बाजरी पिकास पाण्याचा ताण बसत असल्यास उपलब्धतेनुसार पाणी द्यावे. बाजरी पिकाची पेरणी करून एक महिना झाला असल्यास १ % (१०० ग्रॅम प्रति १० लिटर) पोर्टोशियम नायट्रेटची (१३:००:४५) फवारणी करावी. बाजरी पिकाची पेरणी करून एक महिना झाला असल्यास उर्वरीत ४ ० किलो नत्र, २० किलो स्फुरद व २० किलो पालाश प्रति हेक्टर खतमात्रा द्यावी.
ऊस	वाडीची	ऊस पिकात पाहरी माशांचा व पाकोळीचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी, लिंकेनीसिलियम लिंकेनी या जैविक बुरशीची ४० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. रासायनिक कीटकनाशकांमध्ये क्लोरोपायरीफॉस २० टक्के ३० मिली किंवा इमिडाक्लोप्रिड १७.८ टक्के ३ मिली किंवा अॅसीफे ७५ % २० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारवे. इमिडाक्लोपीड १७.८% कीटकनाशकासोबत २ टक्के युरिया (२०० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात) मिसळून पावसाची उघाड बघून फवारणी करावी. ऊस पिकास पाण्याचा ताण बसत असल्यास उपलब्धतेनुसार पाणी द्यावे.
हळद	आंतरपिक/वाडीची	हळदीमध्ये आंतरपिक घेताना पहिल्या तीन ते साडेतीन महिन्यांपर्यंत काढणी होईल अशा प्रकारची आंतरपिके निवडावीत. यामध्ये पालेभाज्या सारख्या आंतरपिकांचा समावेश असावा. हळद पिकास पाण्याचा ताण बसत असल्यास उपलब्धतेनुसार पाणी द्यावे. हळद पिकात अंतरमशागतीची कामे करून पिक तण विरहीत ठेवावे. हळद पिकास २५ किलो नत्र प्रति हेक्टर सूक्ष्म सिंचन पध्दतीने महिन्यातून तीन ते चार वेळा द्यावे.
संत्रा/मोसंबी	जातीची निवड/वाडीची/फुलधारणा	मृग बहार संत्रा/मोसंबी बागेत पाण्याचा ताण बसणार नाही याची दक्षत घ्यावी व आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे. संत्रा नविन बाग लागवडीसाठी नागपूर संत्रा, किन्नो तर मोसंबी नविन बाग लागवडीसाठी न्यूसेलर, सातगुडी व फुले मोसंबी इत्यादी जातींची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी. अंबे बहार संत्रा/मोसंबी बागेत रसशोषण करणाऱ्या किडींच्या व्यवस्थापनासाठी कीटकनाशकाची फवारणी पावसाची उघाड बघून करावी.
डाळींब	जातीची निवड / फुलोरा, वाडीची	डाळींब बागेतील अतिरिक्त फुटवे काढावेत. मृग बहार डाळींब बागेत पाण्याचा ताण बसणार नाही याची दक्षत घ्यावी व आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे. डाळींब नविन बाग लागवडीसाठी भगवा, फुले भगवा सुपर, गणेश, फुले आरक्ता, इत्यादी जातींची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी. डाळींब बागेत ००:५२:३४ १५ ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात मिसळून पावसाची उघाड बघून फवारणी करावी.
चिक्कू	जातीची निवड / वाडीची	चिक्कू नविन बाग लागवडीसाठी कालीपती, क्रिकेट बॉल इत्यादी जातींची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी. चिक्कू बागेत आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे.
भाजीपाला	पुनर्लागवड / काढणी/ वाडीची	भाजीपाला पिकास पाण्याचा ताण बसत असल्यास आवश्यकतेनुसार सूक्ष्म सिंचन पध्दतीने पाणी व्यवस्थापन करावे. गादीवाफवार तयार केलेल्या भाजीपाला पिकांच्या रोपांना ४५ दिवस झाले असल्यास पाऊस झालेल्या ठिकाणी जमिनीत ओलावा बघून भाजीपाला पिकांची (वांगी, मिरची, टोमॅटो इ.) पुनर्लागवड करावी. पाऊस झालेल्या ठिकाणी जमिनीत ओलावा बघून बियाद्वारे लागवड केल्या जाणाऱ्या भाज्या उदा. भेंडी, कारले, भोपळा, दोडका इत्यादी भाजीपाला पिकांची लागवड करावी. काढणीस तयार असलेल्या भाजीपाला पिकांची काढणी करून घ्यावी. भाजीपाला (मिरची, वांगे व भेंडी) पिकात रसशोषण करणाऱ्या किडीचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास त्याच्या व्यवस्थापनासाठी पायरीप्रॉक्सीफेन ५% + फेनप्रोपाथ्रीन १५% १० मीली किंवा डायमेथोएट ३०% १३ मीली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
फुलशेती	पुनर्लागवड / काढणी/ वाडीची	फुल पिकास पाण्याचा ताण बसत असल्यास आवश्यकतेनुसार सूक्ष्म सिंचन पध्दतीने पाणी व्यवस्थापन करावे. पाऊस झालेल्या ठिकाणी जमिनीत ओलावा असल्याची खात्री करून फुल पिकाची पुनर्लागवड करावी. काढणीस तयार असलेल्या फुलपिकांची काढणी करून घ्यावी. काढणीस तयार असलेल्या फुलपिकांची काढणी करून घ्यावी.
तुती रेशीम उद्योग	---	चिन देशाच्या तुलनेत भारतात वर्षाकाठी रेशीम कोषाची सरासरी निम्मी पिके म्हणजे ४-५ पिके घेतली जातात याउलट चिन देशात वर्षाला कोषाची १० ते १२ पिके घेतली जातात. प्रती एकर प्रती पिक चिन देशात २५० ते ३०० अंडीपुजाचे एक पीक तर भारतात १५५० ते २०० अंडीपुज सरासरी घेतले जातात. जागतीक कच्च्या रेशीम उत्पादनात सातत्याने चिन देश प्रथम क्रमांकावर आहे. भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. रेशीम उद्योगात भारत देशात ८.९ दशलक्ष लोकांना रोजगार उपलब्ध होतो तर चिन देशात फक्त १ दशलक्ष लोक हे रेशीम उद्योगाचे कार्य करत आहेत. चिन देशाच्या तुलनेत आपल्या शेतकऱ्यांनी तुती पानाची प्रत आणि रेशीम किटक संगोपन तंत्रज्ञान सुधारणा करणे गरजेचे आहे तरच जागतीक स्पर्धेत राहता येईल.
पशुधन व्यवस्थापन	---	गोवर्शीय पशुधनामध्ये लष्मी स्क्रीन रोगाचा प्रादुर्भाव अत्यंत वेगाने होत आहे. याची सर्वात जास्त झळ लहान वयातील वासरूंना जाणवत असून मृत्यूचे प्रमाण वाढत आहे. अशा वेळी निवेष्टनासाठी व त्यांची शारिरीक प्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी १) वासरूंना चिक पाजवा. २) वयाच्या सातव्या दिवशी जंतुनाशक औषधीची मात्रा द्यावी. ३) महाराष्ट्र शासन यांच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार लसीकरण करून घ्यावे. ४) आजारी आणि निरोगी वासरे, गोधन स्वतंत्र पणे विलगीकरण करावे. ५) सर्वात महत्वाचे म्हणजे २० % सूक्ष्म व ८०% काळजी (ज्यामध्ये पाणी, सकस चारा, जखमांची सुस्थायी इत्यादी) गोष्टी काढाव्यात.

सदर कृषी हवामान सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.

मुख्य प्रकल्प समन्वयक
ग्रामीण कृषी मौसम सेवा
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
अखिल भारतीय समन्वयित कृषि हवामानशास्त्र संशोधन प्रकल्प
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी - ४३१ ४०२
ईमेल - amfuparbhani@gmail.com



जालना जिल्हा कृषि हवामान सल्ला पत्रक क्रमांक - ३२/२०२५ - २०२६ शुक्रवार, दिनांक - १८.०७.२०२५

मागील आठवड्यातील हवामानस्थिती (दिनांक १२ ते १८ जूलै २०२५)							हवामान घटक	हवामान अंदाज (दिनांक १९ ते २३ जूलै, २०२५ साठी हवामान अंदाज)				
१२/०७	१३/०७	१४/०७	१५/०७	१६/०७	१७/०७	१८/०७	दिनांक	१९/०७	२०/०७	२१/०७	२२/०७	२३/०७
							पाऊस (मिमी)	१२.०	९.०	८.०	४.०	३.०
							कमाल तापमान (अं.से)	३२.०	३२.०	३३.०	३२.०	३१.०
							किमान तापमान (अं.से)	२५.०	२५.०	२५.०	२५.०	२४.०
							स. दु.	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ
							स. दु.	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ
							सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	७८	७९	८०	७८	७७
							दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	५४	४७	४५	५१	५४
							वाऱ्याचा वेग (किमी /तास)	१२	१३	१४	१६	१७
							स. दु.	पश्चिम- वायव्य	पश्चिम- वायव्य	पश्चिम- वायव्य	पश्चिम- वायव्य	उत्तर
							स. दु.	पश्चिम- वायव्य	पश्चिम- वायव्य	पश्चिम- वायव्य	पश्चिम- वायव्य	उत्तर

हवामान सारांश / चेतावनी :

प्रादेशिक हवामान केंद्र , मुंबई येथून प्राप्त झालेल्या अंदाजानुसार दिनांक १८ जूलै रोजी जालना जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी वादळी वारा, मेघगर्जन, वाऱ्याचा वेग अधिक (ताशी ३० ते ४० कि.मी.) राहून हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. जालना जिल्ह्यात दिनांक १८ व २१ जूलै रोजी काही ठिकाणी तर दिनांक १९, २० व २२ जूलै रोजी तुरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. जालना जिल्ह्यात पुढील तीन ते चार दिवसात कमाल तापमानात तर किमान तापमानात पुढील चार ते पाच दिवसात फारशी तफावत जाणवत नाही.

सामान्य सल्ला :

विस्तारीत अंदाजानुसार (ईआरएफएस) मराठवाड्यात दिनांक १८ ते २४ जूलै, २०२५ दरम्यान पाऊस सरासरीपेक्षा कमी, कमाल तापमान सरासरीएवढे ते सरासरीपेक्षा जास्त व किमान तापमान सरासरीएवढे व दिनांक २५ ते ३१ जूलै २०२५ दरम्यान पाऊस सरासरीएवढा, कमाल तापमान व किमान तापमान सरासरीएवढे राहण्याची शक्यता आहे.

संक, इसरो अहमदाबाद यांच्या उपग्रहाच्या बायोत्सर्जनाच्या जिल्हानिहाय व तालुकानिहाय छायाचित्रानुसार मराठवाड्यात बायोत्सर्जनाचा वेग किंचित कमी झालेला आहे.

संदेश : पेरणी न झालेल्या ठिकाणी पेरणी योग्य पाऊस (७५ ते १०० मिमी) झाला असल्यास सूर्यफुल, तूर, संकरीत बाजरी, सोयाबीन + तूर (४:२), बाजरी + तूर (३:३), एरंडी, कारळ आणि तिळ, एरंडी + धने ही पिके घ्यावीत.

पिकाचे नाव	अवस्था	कृषी हवामान सल्ला
सोयाबीन	वाढीची	सोयाबीन पिकात अंतरमशागतीची कामे करून पिक तण विरहीत ठेवावे. सोयाबीन पिकात पाने खाणाऱ्या अळ्या व घाटेअळी (उंट अळी)चा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास, याच्या व्यवस्थापनासाठी प्रोफेनोफॉस ५०% ईसी २० मिली किंवा लॅम्बडा सायहॅलोथ्रीन ४.९० % सीएस ६ मिली किंवा इंडोक्झकाब १५.८० % ईसी ७ मिली प्रति १० लिटर पाणी यापैकी कुठलेही एक किटकनाशक पाऊसाने उघाड दिल्यास फवारवे. सोयाबीन पिक पेरणी करून २० दिवस झाले असल्यास तणांच्या व्यवस्थापनासाठी इमॅझोमेक्स ३५ % + इमीझीथीपायर ३५% २ ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून पावसाची उघाड बघून फवारवे. सोयाबीन पिकास पाण्याचा ताण बसत असल्यास उपलब्धतेनुसार पाणी द्यावे. सोयाबीन पिकाची पेरणी करून एक महिना झाला असल्यास १ % (१०० ग्रॅम प्रति १० लिटर) पोर्टोशियम नायट्रेटची (१३:००:४५) फवारणी करावी. सूक्ष्म अन्नद्रव्यांच्या कमतरतेमुळे सोयाबीन पिक पिवळे दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी मायक्रोन्यूट्रिएंट ग्रेड-२ ५० मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून पावसाची उघाड बघून फवारणी करावी.
खरीप ज्वारी	वाढीची	खरीप ज्वारी पिकात अंतरमशागतीची कामे करून पिक तण विरहीत ठेवावे. खरीप ज्वारी पिकास पाण्याचा ताण बसत असल्यास उपलब्धतेनुसार पाणी द्यावे. खरीप ज्वारी पिकाची पेरणी करून एक महिना झाला असल्यास उर्वरीत ४ ० किलो नत्र, २० किलो स्फुरद व २० किलो पालाश प्रति हेक्टर खतमात्रा द्यावी.
बाजरी	पेरणी/वाढीची	पेरणी न केलेल्या भागात पेरणीयोग्य पाऊस (७५-१०० मिमी) झाल्यानंतर बिजप्रक्रिया करूनच बाजरी पिकाची पेरणी करावी. बाजरी पिकाची पेरणी ३० जुलैपर्यंत करता येते. बाजरी पिकात अंतरमशागतीची कामे करून पिक तण विरहीत ठेवावे. बाजरी पिकास पाण्याचा ताण बसत असल्यास उपलब्धतेनुसार पाणी द्यावे. बाजरी पिकाची पेरणी करून एक महिना झाला असल्यास १ % (१०० ग्रॅम प्रति १० लिटर) पोर्टोशियम नायट्रेटची (१३:००:४५) फवारणी करावी. बाजरी पिकाची पेरणी करून एक महिना झाला असल्यास उर्वरीत ४ ० किलो नत्र, २० किलो स्फुरद व २० किलो पालाश प्रति हेक्टर खतमात्रा द्यावी.
ऊस	वाढीची	ऊस पिकात पाहरी माशांचा व पाकोळीचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी, लिक्नेनीसिलियम लिक्नेनी या जैविक बुरशीची ४० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. रासायनिक कीटकनाशकांमध्ये क्लोरोपायरीफॉस २० टक्के ३० मिली किंवा इमिडाक्लोप्रिड १७.८ टक्के ३ मिली किंवा अँसीफेट ७५ % २० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारवे. इमिडाक्लोप्रिड १७.८% कीटकनाशकासोबत २ टक्के युरिया (२०० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात) मिसळून पावसाची उघाड बघून फवारणी करावी. ऊस पिकास पाण्याचा ताण बसत असल्यास उपलब्धतेनुसार पाणी द्यावे.
हळद	आंतरपिक/वाढीची	हळदीमध्ये आंतरपिके घेताना पहिल्या तीन ते साडेतीन महिन्यांपर्यंत काढणी होईल अशा प्रकारची आंतरपिके निवडावीत. यामध्ये पालेभाज्या सारख्या आंतरपिकांचा समावेश असावा. हळद पिकास पाण्याचा ताण बसत असल्यास उपलब्धतेनुसार पाणी द्यावे. हळद पिकात अंतरमशागतीची कामे करून पिक तण विरहीत ठेवावे. हळद पिकास २५ किलो नत्र प्रति हेक्टर सूक्ष्म सिंचन पध्दतीने महिन्यातून तीन ते चार वेळा द्यावे.
संत्रा/मोसंबी	जातीची निवड/वाढीची/फुलधारणा	मृग बहार संत्रा/मोसंबी बागेत पाण्याचा ताण बसणार नाही याची दक्षत घ्यावी व आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे. संत्रा नविन बाग लागवडीसाठी नागपूर संत्रा, किन्ना तर मोसंबी नविन बाग लागवडीसाठी न्यूसलेर, सातगुडी व फुले मोसंबी इत्यादी जातींची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी. अंबे बहार संत्रा/मोसंबी बागेत रसशोषण करणाऱ्या किडीच्या व्यवस्थापनासाठी कीटकनाशकांची फवारणी पावसाची उघाड बघून करावी.
डाळींब	जातीची निवड / फुलोरा, वाढीची	डाळींब बागेतील अतिरिक्त फुटवे काढावेत. मृग बहार डाळींब बागेत पाण्याचा ताण बसणार नाही याची दक्षत घ्यावी व आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे. डाळींब नविन बाग लागवडीसाठी भगवा, फुले भगवा सुपर, गणेश, फुले आरक्ता, इत्यादी जातींची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी. डाळींब बागेत ००:५२:३४ १५ ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात मिसळून पावसाची उघाड बघून फवारणी करावी.
चिकू	जातीची निवड / वाढीची	चिकू नविन बाग लागवडीसाठी कालोपत्ती, क्रिकेट बॉल इत्यादी जातींची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी. चिकू बागेत आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे.
भाजीपाला	पूर्णलागवड / काढणी/ वाढीची	भाजीपाला पिकास पाण्याचा ताण बसत असल्यास आवश्यकतेनुसार सूक्ष्म सिंचन पध्दतीने पाणी व्यवस्थापन करावे. गादीवाफ्यावर तयार केलेल्या भाजीपाला पिकांच्या रोपांना ४५ दिवस झाले असल्यास पाऊस झालेल्या ठिकाणी जमिनीत ओलावा बघून भाजीपाला पिकांची (वांगी, मिरची, टोमॅटो इ.) पूर्णलागवड करावी. पाऊस झालेल्या ठिकाणी जमिनीत ओलावा बघून बियाद्वारे लागवड केल्या जाणाऱ्या भाज्या उदा. भेंडी, कारले, भोपळा, दोडका इत्यादी भाजीपाला पिकांची लागवड करावी. काढणीस तयार असलेल्या भाजीपाला पिकांची काढणी करून घ्यावी. भाजीपाला (मिरची, वांगे व भेंडी) पिकात रसशोषण करणाऱ्या किडीचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास त्याच्या व्यवस्थापनासाठी पायरीप्रॉक्सीफेन ५% + फेनप्रोपाथ्रीन १५% १० मीली किंवा डायमेथोएट ३०% १३ मीली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
फुलशेती	पूर्णलागवड / काढणी/ वाढीची	फुल पिकास पाण्याचा ताण बसत असल्यास आवश्यकतेनुसार सूक्ष्म सिंचन पध्दतीने पाणी व्यवस्थापन करावे. पाउस झालेल्या ठिकाणी जमिनीत ओलावा असल्याची खात्री करून फुल पिकाची पूर्णलागवड करावी. काढणीस तयार असलेल्या फुलपिकांची काढणी करून घ्यावी. काढणीस तयार असलेल्या फुलपिकांची काढणी करून घ्यावी.
तुती रेशीम उद्योग	---	चिन देशाच्या तुलनेत भारतात वर्षाकाठी रेशीम कोषाची सरासरी निम्मी पिके म्हणजे ४-५ पिके घेतली जातात याउलट चिन देशात वर्षाला कोषाची १० ते १२ पिके घेतली जातात. प्रती एकर प्रती पिक चिन देशात २५० ते ३०० अंडीपुजाचे एक पीक तर भारतात १५५० ते २०० अंडीपुज सरासरी घेतले जातात. जागतीक कच्च्या रेशीम उत्पादनात सातत्याने चिन देश प्रथम क्रमांकावर आहे. भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. रेशीम उद्योगात भारत देशात ८.९ दशलक्ष लोकांना रोजगार उपलब्ध होतो तर चिन देशात फक्त १ दशलक्ष लोक हे रेशीम उद्योगाचे कार्य करत आहेत. चिन देशाच्या तुलनेत आपल्या शेतकऱ्यांनी तुती पानाची प्रत आणि रेशीम किटक संगोपन तंत्रज्ञान सुधारणा करणे गरजेचे आहे तरच जागतीक स्पर्धेत राहता येईल.
पशुधन व्यवस्थापन	---	गोवर्शेष पशुधनामध्ये लष्मी स्कॉन रोमाचा प्रादुर्भाव अत्यंत वेगाने होत आहे. याची सर्वात जास्त झळ लहान वयातील वासरांना जाणवत असून मृत्यूचे प्रमाण वाढत आहे. अशा वेळी निवडणारासाठी व त्यांची शारिरीक प्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी १) वासरांना चिक पाजवा. २) वयाच्या सातव्या दिवशी जंतनाशक औषधीची मात्रा द्यावी. ३) महाराष्ट्र शासन यांच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार लसीकरण करून घ्यावे. ४) आजारी आणि निरोगी वासरे, गोधन स्वतंत्र पणे विलगीकरण करावे. ५) सर्वात महत्वाचे म्हणजे २० % सूरुषा व ८०% काळजी (ज्यामध्ये पाणी, सकस चारा, जखमांची सुशुषा इत्यादी) गोष्टी करवात.

सदर कृषी हवामान सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.

मुख्य प्रकल्प समन्वयक
ग्रामीण कृषी मौसम सेवा
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
अखिल भारतीय समन्वयित कृषि हवामानशास्त्र संशोधन प्रकल्प
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी - ४३१ ४०२
ईमेल - amfuparbhani@gmail.com



लातूर जिल्हा कृषि हवामान सल्ला पत्रक क्रमांक - ३२/२०२५ - २०२६ शुक्रवार, दिनांक - १८.०७.२०२५

मागील आठवड्यातील हवामानस्थिती (दिनांक १२ ते १८ जूलै २०२५)							हवामान घटक	हवामान अंदाज (दिनांक १९ ते २३ जूलै, २०२५ साठी हवामान अंदाज)				
१२/०७	१३/०७	१४/०७	१५/०७	१६/०७	१७/०७	१८/०७	दिनांक	१९/०७	२०/०७	२१/०७	२२/०७	२३/०७
							पाऊस (मिमी)	२०.०	५.०	८.०	७.०	४.०
							कमाल तापमान (अं.से)	३०.०	३०.०	३१.०	३०.०	२९.०
							किमान तापमान (अं.से)	२५.०	२४.०	२४.०	२४.०	२३.०
							स. ढग स्थिती (आकाश)	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ
							सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	७९	८२	८४	८३	८१
							दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	६०	५८	५३	५७	५९
							वाऱ्याचा वेग (किमी /तास)	१३	१४	१६	१८	२०
							स. वाऱ्याची दिशा	पश्चिम-वायव्य	पश्चिम-वायव्य	पश्चिम-वायव्य	पश्चिम	उत्तर
							दु. वाऱ्याची दिशा					

हवामान सारांश / चेतावनी :

प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई येथून प्राप्त झालेल्या अंदाजानुसार दिनांक १८ जूलै रोजी लातूर जिल्ह्यात तूरळक ठिकाणी वादळी वारा, मेघगर्जना, वाऱ्याचा वेग अधिक (ताशी ३० ते ४० कि.मी.) राहून मूसळधार पावसाची शक्यता आहे. दिनांक १९ जूलै रोजी लातूर जिल्ह्यात तूरळक ठिकाणी वादळी वारा, मेघगर्जना, वाऱ्याचा वेग अधिक (ताशी ३० ते ४० कि.मी.) राहून हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. लातूर जिल्ह्यात दिनांक १८ व २१ जूलै रोजी काही ठिकाणी तर दिनांक १९, २० व २२ जूलै रोजी तूरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. लातूर जिल्ह्यात पुढील तीन ते चार दिवसात कमाल तापमानात तर किमान तापमानात पुढील चार ते पाच दिवसात फारशी तफावत जाणवत नाही.

सामान्य सल्ला :

विस्तारीत अंदाजानुसार (ईआरएफएस) मराठवाड्यात दिनांक १८ ते २४ जूलै, २०२५ दरम्यान पाऊस सरासरीपेक्षा कमी, कमाल तापमान सरासरीपेक्षा जास्त व किमान तापमान सरासरीपेक्षा व दिनांक २५ ते ३१ जूलै २०२५ दरम्यान पाऊस सरासरीपेक्षा, कमाल तापमान व किमान तापमान सरासरीपेक्षा राहण्याची शक्यता आहे.

सॅक, इसरो अहमदाबाद यांच्या उपग्रहाच्या बाष्पोत्सर्जनाच्या जिल्हानिहाय व तालुकानिहाय छायाचित्रानुसार मराठवाड्यात बाष्पोत्सर्जनाचा वेग किंचित कमी झालेला आहे.

संदेश : परेणी न झालेल्या ठिकाणी परेणी योग्य पाऊस (७५ ते १०० मिमी) झाला असल्यास सूर्यफुल, तूर, संकरीत बाजरी, सोयाबीन + तूर (४:२), बाजरी + तूर (३:३), एरंडी, कारळ आणि तिळ, एरंडी + धने ही पिके घ्यावीत.

पिकांचे नाव	अवस्था	कृषी हवामान सल्ला
सोयाबीन	वाढीची	सोयाबीन पिकात अंतरमशागतीची कामे करून पिक तण विरहीत ठेवावे. सोयाबीन पिकात पाने खाणाऱ्या अळ्या व घाटेअळी (उट अळी)चा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास, याच्या व्यवस्थापनासाठी प्रोफेनोफॉस ५०% ईसी २० मिली किंवा लॅम्बडा सायहॅलोथ्रीन ४.९० % सीएस ६ मिली किंवा इंडोक्झाकाई १५.८० % ईसी ७ मिली प्रति १० लिटर पाणी यापैकी कुठलेही एक किटकनाशक पाऊसाने उघाड दिल्यास फवारवे. सोयाबीन पिक परेणी करून २० दिवस झाले असल्यास तणाच्या व्यवस्थापनासाठी इमॅझोमॅक्स ३५ % + इमीझोथीपायर ३५% २ ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून पावसाची उघाड बघून फवारवे. सोयाबीन पिकास पाण्याचा ताण बसत असल्यास उपलब्धतेनुसार पाणी द्यावे. सोयाबीन पिकाची परेणी करून एक महिना झाला असल्यास १ % (१०० ग्रॅम प्रति १० लिटर) पोर्टशियम नायट्रेटची (१३:००:४५) फवारणी करावी. सूक्ष्म अन्नद्रव्यांच्या कमतरतेमुळे सोयाबीन पिक पिवळे दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी मायक्रोन्यूट्रिएंट ग्रेड-२ ५० मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून पावसाची उघाड बघून फवारणी करावी.
खरीप ज्वारी	वाढीची	खरीप ज्वारी पिकात अंतरमशागतीची कामे करून पिक तण विरहीत ठेवावे. खरीप ज्वारी पिकास पाण्याचा ताण बसत असल्यास उपलब्धतेनुसार पाणी द्यावे. खरीप ज्वारी पिकाची परेणी करून एक महिना झाला असल्यास १ % (१०० ग्रॅम प्रति १० लिटर) पोर्टशियम नायट्रेटची (१३:००:४५) फवारणी करावी. खरीप ज्वारी पिकाची परेणी करून एक महिना झाला असल्यास उर्वरीत ४ ० किलो नत्र, २० किलो स्फुरद व २० किलो पालाश प्रति हेक्टर खतमात्रा द्यावी.
बाजरी	पेरणी/वाढीची	पेरणी न केलेल्या भागात पेरणीयोग्य पाऊस (७५-१०० मिमी) झाल्यानंतर बिजप्रक्रिया करूनच बाजरी पिकाची पेरणी करावी. बाजरी पिकाची पेरणी ३० जुलैपर्यंत करता येते. बाजरी पिकात अंतरमशागतीची कामे करून पिक तण विरहीत ठेवावे. बाजरी पिकास पाण्याचा ताण बसत असल्यास उपलब्धतेनुसार पाणी द्यावे. बाजरी पिकाची पेरणी करून एक महिना झाला असल्यास १ % (१०० ग्रॅम प्रति १० लिटर) पोर्टशियम नायट्रेटची (१३:००:४५) फवारणी करावी. बाजरी पिकाची परेणी करून एक महिना झाला असल्यास उर्वरीत ४ ० किलो नत्र, २० किलो स्फुरद व २० किलो पालाश प्रति हेक्टर खतमात्रा द्यावी.
ऊस	वाढीची	ऊस पिकात पांढरी माशीचा व पाकोळीचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी, लिक्वॅन्सिलियम लिक्वॅन्स या जैविक बुरशीची ४० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. रासायनिक कीटकनाशकांमध्ये क्लोरोपायरीफॉस २० टक्के ३० मिली किंवा इमिडाक्लोप्रिड १७.८ टक्के ३ मिली किंवा अॅसीफेन ७५ % २० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारवे. इमिडाक्लोप्रिड १७.८% कीटकनाशकासोबत २ टक्के युरिया (२०० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात) मिसळून पावसाची उघाड बघून फवारणी करावी. ऊस पिकास पाण्याचा ताण बसत असल्यास उपलब्धतेनुसार पाणी द्यावे.
हळद	आंतरपिक/वाढीची	हळदीमध्ये आंतरपिक घेताना पहिल्या तीन ते साडेतीन महिन्यांपर्यंत काढणी होईल अशा प्रकारची आंतरपिके निवडावीत. यामध्ये पालेभाज्या सारख्या आंतरपिकांचा समावेश असावा. हळद पिकास पाण्याचा ताण बसत असल्यास उपलब्धतेनुसार पाणी द्यावे. हळद पिकात अंतरमशागतीची कामे करून पिक तण विरहीत ठेवावे. हळद पिकास २५ किलो नत्र प्रति हेक्टर सूक्ष्म सिंचन पध्दतीने महिन्यातून तीन ते चार वेळा द्यावे.
संत्रा/मोसंबी	जातीची निवड/वाढीची/फुलधारणा	मृग बहार संत्रा/मोसंबी बागेत पाण्याचा ताण बसणार नाही याची दक्षत घ्यावी व आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे. संत्रा नविन बाग लागवडीसाठी नागपूर संत्रा, किन्नो तर मोसंबी नविन बाग लागवडीसाठी न्यूसलंड, सातगुडी व फुले मोसंबी इत्यादी जातीची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी. अंबे बहार संत्रा/मोसंबी बागेत रसशोषण करणाऱ्या किडींच्या व्यवस्थापनासाठी कीटकनाशकाची फवारणी पावसाची उघाड बघून करावी.
डाळींब	जातीची निवड/फुलोरा, वाढीची	डाळींब बागेतील अतिरिक्त फुटवे काढावेत. मृग बहार डाळींब बागेत पाण्याचा ताण बसणार नाही याची दक्षत घ्यावी व आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे. डाळींब नविन बाग लागवडीसाठी भगवा, फुले भगवा सुपर, गणेश, फुले आरक्ता, इत्यादी जातीची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी. डाळींब बागेत ००:५२:३४ १५ ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात मिसळून पावसाची उघाड बघून फवारणी करावी.
चिक्कू	जातीची निवड/वाढीची	चिक्कू नविन बाग लागवडीसाठी कालीपत्ती, क्रिकेट बॉल इत्यादी जातीची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी. चिक्कू बागेत आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे.
भाजीपाला	पूर्णलागवड/काढणी/वाढीची	भाजीपाला पिकास पाण्याचा ताण बसत असल्यास आवश्यकतेनुसार सूक्ष्म सिंचन पध्दतीने पाणी व्यवस्थापन करावे. गादीवाफ्यावर तयार केलेल्या भाजीपाला पिकांच्या रोपांना ४५ दिवस झाले असल्यास पाऊस झालेल्या ठिकाणी जमिनीत ओलावा बघून भाजीपाला पिकांची (वांगी, मिरची, टोमॅटो इ.) पूर्णलागवड करावी. पाऊस झालेल्या ठिकाणी जमिनीत ओलावा बघून बियाद्वारे लागवड केल्या जाणाऱ्या भाज्या उदा. भेंडी, कारले, भोपळा, दोडका इत्यादी भाजीपाला पिकांची लागवड करावी. काढणीस तयार असलेल्या भाजीपाला पिकांची काढणी करून घ्यावी. भाजीपाला (मिरची, वांगे व भेंडी) पिकात रसशोषण करणाऱ्या किडीचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास त्याच्या व्यवस्थापनासाठी पायरीप्रॉक्सिफेन ५% + फेनप्रोपाथ्रीन १५% १० मीली किंवा डायमेथोएट ३०% १३ मीली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
फुलशेती	पूर्णलागवड/काढणी/वाढीची	फुल पिकास पाण्याचा ताण बसत असल्यास आवश्यकतेनुसार सूक्ष्म सिंचन पध्दतीने पाणी व्यवस्थापन करावे. पाउस झालेल्या ठिकाणी जमिनीत ओलावा असल्याची खात्री करून फुल पिकाची पूर्णलागवड करावी. काढणीस तयार असलेल्या फुलपिकांची काढणी करून घ्यावी. काढणीस तयार असलेल्या फुलपिकांची काढणी करून घ्यावी.
तुती रेशीम उद्योग	-----	चिन देशाच्या तुलनेत भारतात वर्षाकाठी रेशीम कोषाची सरासरी निम्मी पिके म्हणजे ४-५ पिके घेतली जातात याउलट चिन देशात वर्षाला कोषाची १० ते १२ पिके घेतली जातात. प्रती एकर प्रती पिक चिन देशात २५० ते ३०० अंडीपूजाचे एक पीक तर भारतात १५५० ते २०० अंडीपूज सरासरी घेतले जातात. जागतिक कच्च्या रेशीम उत्पादनात सातत्याने चिन देश प्रथम क्रमांकावर आहे. भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. रेशीम उद्योगात भारत देशात ८.९ दशलक्ष लोकांना रोजगार उपलब्ध होतो तर चिन देशात फक्त १ दशलक्ष लोक हे रेशीम उद्योगाचे कार्य करत आहेत. चिन देशाच्या तुलनेत आपल्या शेतकऱ्यांनी तुती पानाची प्रत आणि रेशीम किटक संगोपन तंत्रज्ञान सुधारणा करणे गरजेचे आहे तरच जागतिक स्पर्धेत राहता येईल.
पशुधन व्यवस्थापन	-----	गोवंशीय पशुधनामध्ये लष्मी स्कॉन रोगाचा प्रादुर्भाव अत्यंत वेगाने होत आहे. याची सवात जास्त झळ लहान वयातील वासरांना जाणवत असून मृत्यूचे प्रमाण वाढत आहे. अशा वेळी नियंत्रणासाठी व त्याची शारीरिक प्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी १) वासरांना चिक पाजावा. २) वयाच्या सातव्या दिवशी जंतुनाशक औषधीची मात्रा द्यावी. ३) महाराष्ट्र शासन यांच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार लसीकरण करून घ्यावे. ४)आजारी आणि निरोगी वासरे, गोधन स्वतंत्र पणे विलगीकरण करावे. ५) सर्वात महत्वाचे म्हणजे २० % सूश्रूषा व ८०% काळजी (ज्यामध्ये पाणी, सकस चारा, जखमांची सुश्रूषा इत्यादी) गोष्टी काळ्यात.

सदर कृषी हवामान सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.

मुख्य प्रकल्प समन्वयक
ग्रामीण कृषी मौसम सेवा
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
अखिल भारतीय समन्वयित कृषि हवामानशास्त्र संशोधन प्रकल्प
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी - ४३१ ४०२
ईमेल - amfuparbhani@gmail.com



नांदेड जिल्हा कृषि हवामान सल्ला पत्रक क्रमांक - ३२/२०२५ - २०२६

शुक्रवार, दिनांक - १८.०७.२०२५

मागील आठवड्यातील हवामानस्थिती (दिनांक १२ ते १८ जूलै २०२५)							हवामान घटक	हवामान अंदाज (दिनांक १९ ते २३ जूलै, २०२५ साठी हवामान अंदाज)				
१२/०७	१३/०७	१४/०७	१५/०७	१६/०७	१७/०७	१८/०७	दिनांक	१९/०७	२०/०७	२१/०७	२२/०७	२३/०७
							पाऊस (मिमी)	१८.०	५.०	६.०	१०.०	५.०
							कमाल तापमान (अं.से)	३२.०	३२.०	३२.०	३१.०	३०.०
							किमान तापमान (अं.से)	२६.०	२६.०	२६.०	२६.०	२५.०
							स. ढग स्थिती (आकाश)	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ
							स. दु. सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	७९	७९	८०	८०	७७
							दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	५८	५४	५१	५७	५७
							वाऱ्याचा वेग (किमी/तास)	६	११	१४	१५	१९
							स. वाऱ्याची दिशा	पश्चिम	पश्चिम-वायव्य	पश्चिम-वायव्य	पश्चिम-वायव्य	पश्चिम
							दु.					

हवामान सारांश / चेतवणी :

प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई येथून प्राप्त झालेल्या अंदाजानुसार दिनांक १८ जूलै रोजी नांदेड जिल्ह्यात तूरळक ठिकाणी वादळी वारा, मेघगर्जना, वाऱ्याचा वेग अधिक (ताशी ३० ते ४० कि.मी.) राहून मूसळधार पावसाची शक्यता आहे. दिनांक २० व २१ जूलै रोजी नांदेड जिल्ह्यात तूरळक ठिकाणी वादळी वारा, मेघगर्जना, वाऱ्याचा वेग अधिक (ताशी ३० ते ४० कि.मी.) राहून हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. नांदेड जिल्ह्यात दिनांक १८ व २१ जूलै रोजी काही ठिकाणी तर दिनांक १९, २० व २२ जूलै रोजी तूरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. नांदेड जिल्ह्यात पुढील तीन ते चार दिवसात कमाल तापमानात तर किमान तापमानात पुढील चार ते पाच दिवसात फाशी तफावत जाणवनाही.

सामान्य सल्ला :

विस्तारीत अंदाजानुसार (ईआरएफएस) मराठवाड्यात दिनांक १८ ते २४ जूलै, २०२५ दरम्यान पाऊस सरासरीपेक्षा कमी, कमाल तापमान सरासरीपेक्षा जास्त व किमान तापमान सरासरीपेक्षा जास्त व दिनांक २५ ते ३१ जूलै २०२५ दरम्यान पाऊस सरासरीपेक्षा, कमाल तापमान व किमान तापमान सरासरीपेक्षा राहण्याची शक्यता आहे.

सॅक, इसरो अहमदाबाद यांच्या उपग्रहाच्या बाष्पोत्सर्जनाच्या जिल्हानिहाय व तालुकानिहाय छायाचित्रानुसार मराठवाड्यात बाष्पोत्सर्जनाचा वेग किंचित कमी झालेला आहे.

संदेश : पेरणी न झालेल्या ठिकाणी पेरणी योग्य पाऊस (७५ ते १०० मिमी) झाला असल्यास सूर्यफुल, तूर, संकरित बाजरी, सोयाबीन व तूर (४:१), बाजरी व तूर (३:३), एरंडी, कारळ आणि तिळ, एरंडी व धने ही पिके घ्यावीत.

पिकांचे नाव	अवस्था	कृषी हवामान सल्ला
सोयाबीन	वाढीची	सोयाबीन पिकात अंतरमशागतीची कामे करून पिक तण विरहीत ठेवावे. सोयाबीन पिकात पाने खाणाऱ्या अळ्या व घाटेअळी (उट अळी)चा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास, याच्या व्यवस्थापनासाठी प्रोफेनोफॉस ५०% ईसी २० मिली किंवा लॅम्बडा सायहॅलोथ्रीन ४.९० % सीएस ६ मिली किंवा इंडोक्झाकार्ब १५.८० % ईसी ७ मिली प्रति १० लिटर पाणी यापैकी कुठलेही एक कीटकनाशक पाऊसाने उघाड दिल्यास फवारावे. सोयाबीन पिक पेरणी करून २० दिवस झाले असल्यास तणांच्या व्यवस्थापनासाठी इमॅप्रोमॅक्स ३५ % + इमीझीथोपायर ३५ % २ ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून पावसाची उघाड बघून फवारावे. सोयाबीन पिकास पाण्याचा ताण बसत असल्यास उपलब्धतेनुसार पाणी द्यावे. सोयाबीन पिकाची पेरणी करून एक महिना झाला असल्यास १ % (१०० ग्रॅम प्रति १० लिटर) पोर्टोशियम नायट्रेटची (१३:००:४५) फवारणी करावी. सूक्ष्म अन्नद्रव्याच्या कमतरतेमुळे सोयाबीन पिक पिवळे दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी मायक्रोन्यूट्रिएंट ग्रेड-२ ५० मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून पावसाची उघाड बघून फवारणी करावी.
खरीप ज्वारी	वाढीची	खरीप ज्वारी पिकात अंतरमशागतीची कामे करून पिक तण विरहीत ठेवावे. खरीप ज्वारी पिकास पाण्याचा ताण बसत असल्यास उपलब्धतेनुसार पाणी द्यावे. खरीप ज्वारी पिकाची पेरणी करून एक महिना झाला असल्यास १ % (१०० ग्रॅम प्रति १० लिटर) पोर्टोशियम नायट्रेटची (१३:००:४५) फवारणी करावी. खरीप ज्वारी पिकाची पेरणी करून एक महिना झाला असल्यास उर्वरीत ४० किलो नत्र, २० किलो स्फुरद व २० किलो पालाश प्रति हेक्टर खतमात्रा द्यावी.
बाजरी	पेरणी/वाढीची	पेरणी न केलेल्या भागात पेरणीयोग्य पाऊस (७५-१०० मिमी) झाल्यानंतर बिजप्रक्रिया करूनच बाजरी पिकाची पेरणी करावी. बाजरी पिकाची पेरणी ३० जूलैपर्यंत करता येते. बाजरी पिकात अंतरमशागतीची कामे करून पिक तण विरहीत ठेवावे. बाजरी पिकास पाण्याचा ताण बसत असल्यास उपलब्धतेनुसार पाणी द्यावे. बाजरी पिकाची पेरणी करून एक महिना झाला असल्यास १ % (१०० ग्रॅम प्रति १० लिटर) पोर्टोशियम नायट्रेटची (१३:००:४५) फवारणी करावी. बाजरी पिकाची पेरणी करून एक महिना झाला असल्यास उर्वरीत ४० किलो नत्र, २० किलो स्फुरद व २० किलो पालाश प्रति हेक्टर खतमात्रा द्यावी.
ऊस	वाढीची	ऊस पिकात पांढरी माशीचा व पाकोळीचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी, लिक्केनीसिलियम लिक्केनी या जैविक बुरशीची ४० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. रासायनिक कीटकनाशकांमध्ये क्लोरोपायरीफॉस २० टक्के ३० मिली किंवा इमिडाक्लोप्रिड १७.८ टक्के ३ मिली किंवा अंसीफे ७५ % २० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे. इमिडाक्लोप्रिड १७.८% कीटकनाशकासोबत २ टक्के युरिया (२०० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात) मिसळून पावसाची उघाड बघून फवारणी करावी. ऊस पिकास पाण्याचा ताण बसत असल्यास उपलब्धतेनुसार पाणी द्यावे.
हळद	आंतरपिक/वाढीची	हळदीमध्ये आंतरपिके घेताना पहिल्या तीन ते साडेतीन महिन्यांपर्यंत काढणी होईल अशा प्रकारची आंतरपिके निवडावीत. यामध्ये पालेभाज्या सारख्या आंतरपिकांचा समावेश असावा. हळद पिकास पाण्याचा ताण बसत असल्यास उपलब्धतेनुसार पाणी द्यावे. हळद पिकात अंतरमशागतीची कामे करून पिक तण विरहीत ठेवावे. हळद पिकास २५ किलो नत्र प्रति हेक्टर सूक्ष्म सिंचन पध्दतीने महिन्यातून तीन ते चार वेळा द्यावे.
संत्रा/मोसंबी	जातीची निवड/वाढीची/फुलधारणा	मृग बहार संत्रा/मोसंबी बागेत पाण्याचा ताण बसणार नाही याची दक्षत घ्यावी व आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे. संत्रा नविन बाग लागवडीसाठी नागपूर संत्रा, किन्नो तर मोसंबी नविन बाग लागवडीसाठी न्यूसेलर, सातगुडी व फुले मोसंबी इत्यादी जातींची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी. अंबे बहार संत्रा/मोसंबी बागेत रसशोषण करणाऱ्या किडीच्या व्यवस्थापनासाठी कीटकनाशकाची फवारणी पावसाची उघाड बघून करावी.
डाळींब	जातीची निवड/फुलारा, वाढीची	डाळींब बागेतील अतिरिक्त फुटवे काढावेत. मृग बहार डाळींब बागेत पाण्याचा ताण बसणार नाही याची दक्षत घ्यावी व आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे. डाळींब नविन बाग लागवडीसाठी भगवा, फुले भगवा सुपर, गणेश, फुले आरक्ता, इत्यादी जातींची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी. डाळींब बागेत ००:५२:३४ १५ ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात मिसळून पावसाची उघाड बघून फवारणी करावी.
चिक्कू	जातीची निवड/वाढीची	चिक्कू नविन बाग लागवडीसाठी कालीपत्ती, क्रिकेट बॉल इत्यादी जातींची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी. चिक्कू बागेत आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे.
भाजीपाला	पूर्णलागवड/काढणी/वाढीची	भाजीपाला पिकास पाण्याचा ताण बसत असल्यास आवश्यकतेनुसार सूक्ष्म सिंचन पध्दतीने पाणी व्यवस्थापन करावे. गादीवाफ्यावर तयार केलेल्या भाजीपाला पिकांच्या रोपांना ४५ दिवस झाले असल्यास पाऊस झालेल्या ठिकाणी जमिनीत ओलावा बघून भाजीपाला पिकांची (वांगी, मिरची, टोमॅटो इ.) पूर्णलागवड करावी. पाऊस झालेल्या ठिकाणी जमिनीत ओलावा बघून बियाद्वारे लागवड केल्या जाणाऱ्या भाज्या उदा. भेंडी, कारले, भोपळा, दोडका इत्यादी भाजीपाला पिकांची लागवड करावी. काढणीस तयार असलेल्या भाजीपाला पिकांची काढणी करून घ्यावी. भाजीपाला (मिरची, वांगे व भेंडी) पिकात रसशोषण करणाऱ्या किडीचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास त्याच्या व्यवस्थापनासाठी पायरीप्रॉक्सिफेन ५% + फेनप्रोपाथ्रिन १५% १० मीली किंवा डायमॅथोएट ३०% १३ मीली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
फुलशेती	पूर्णलागवड/काढणी/वाढीची	फुल पिकास पाण्याचा ताण बसत असल्यास आवश्यकतेनुसार सूक्ष्म सिंचन पध्दतीने पाणी व्यवस्थापन करावे. पाऊस झालेल्या ठिकाणी जमिनीत ओलावा असल्याची खात्री करून फुल पिकांची पूर्णलागवड करावी. काढणीस तयार असलेल्या फुलपिकांची काढणी करून घ्यावी. काढणीस तयार असलेल्या फुलपिकांची काढणी करून घ्यावी.
तुती रेशीम उद्योग	---	चिन देशाच्या तुलनेत भारतात वर्षाकाठी रेशीम कोषाची सरासरी निम्मी पिके म्हणजे ४-५ पिके घेतली जातात याउलट चिन देशात वर्षाला कोषाची १० ते १२ पिके घेतली जातात. प्रती एकर प्रती पिक चिन देशात २५० ते ३०० अंडीपूजाचे एक पीक तर भारतात १५५० ते २०० अंडीपूज सरासरी घेतले जातात. जागतीक कच्च्या रेशीम उत्पादनात सातत्याने चिन देश प्रथम क्रमांकावर आहे. भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. रेशीम उद्योगात भारत देशात ८.९ दशलक्ष लोकांना रोजगार उपलब्ध होतो तर चिन देशात फक्त १ दशलक्ष लोक हे रेशीम उद्योगाचे कार्य करत आहेत. चिन देशाच्या तुलनेत आपल्या शेतकऱ्यांनी तुती पानाची प्रत आणि रेशीम किटक संगोपन तंत्रज्ञान सुधारणा करणे गरजेचे आहे तरच जागतीक स्पर्धेत राहता येईल.
पशुधन व्यवस्थापन	---	गोवंशीय पशुधनमध्ये लष्पी स्कॉन रोगाचा प्रादुर्भाव अत्यंत वेगाने होत आहे. याची सर्वात जास्त झळ लहान वयातील वासरूंना जाणवत असून मृत्यूचे प्रमाण वाढत आहे. अशा वेळी नियंत्रणासाठी व त्याची शारीरिक प्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी १) वासरूंना चिक पाजवा. २) रोगाच्या सातत्या दिवशी जंतनाशक औषधीची मात्रा द्यावी. ३) महाराष्ट्र शासन यांच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार लसीकरण करून घ्यावे. ४)आजारी आणि निरोगी वासरे, गोधन स्वतंत्र पणे विलगीकरण करावे. ५) सर्वात महत्वाचे म्हणजे २० % सूश्रूषा व ८०% काळजी (ज्यामध्ये पाणी, सकस चारा, जखमांची सुश्रूषा इत्यादी) गोष्टी काळ्यात.

सदर कृषी हवामान सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.

मुख्य प्रकल्प समन्वयक

ग्रामीण कृषी मौसम सेवा

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
अखिल भारतीय समन्वयित कृषि हवामानशास्त्र संशोधन प्रकल्प
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी — ४३१ ४०२
ईमेल - amfuparbhani@gmail.com



परभणी जिल्हा कृषि हवामान सल्ला पत्रक क्रमांक — ३२/२०२५ - २०२६ शुक्रवार, दिनांक — १८.०७.२०२५

मागील आठवड्यातील हवामानस्थिती (दिनांक १२ ते १८ जुलै २०२५)							हवामान घटक		हवामान अंदाज (दिनांक १९ ते २३ जुलै, २०२५ साठी हवामान अंदाज)				
१२/०७	१३/०७	१४/०७	१५/०७	१६/०७	१७/०७	१८/०७	दिनांक		१९/०७	२०/०७	२१/०७	२२/०७	२३/०७
०.०	०.०	०.०	०.०	०.०	३०.३	०.०	पाऊस (मिमी)		१०.०	५.०	४.०	१.०	३.०
३३.०	३३.२	३३.६	३२.९	३२.२	२९.६		कमाल तापमान (अं.से)		३२.०	३३.०	३३.०	३२.०	३२.०
२३.५	२२.७	२२.६	२२.९	२४.९	२२.३	२३.९	किमान तापमान (अं.से)		२६.०	२६.०	२५.०	२६.०	२५.०
अंशतः ढगाळ	अंशतः ढगाळ	स्वच्छ	स्वच्छ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	ढगाळ	स.	ढग स्थिती (आकाश)	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ
अंशतः ढगाळ	स्वच्छ	ढगाळ	ढगाळ	अंशतः ढगाळ	अंशतः ढगाळ		दु.						
७५	८०	८०	८०	८१	९८	८८	सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)		७६	७६	७८	७७	७४
५५	४९	५९	५६	६१	७५		दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)		५४	४८	४७	५०	५२
५.१	६.४	६.३	६.७	५.३	५.२	२.९	वाऱ्याचा वेग (किमी /तास)		१२	१३	१४	१६	१९
पश्चिम- वायव्य	पश्चिम- वायव्य	पश्चिम- नैऋत्य	पश्चिम	पश्चिम- वायव्य	उत्तर- वायव्य	पश्चिम- वायव्य	स.	वाऱ्याची दिशा	पश्चिम- वायव्य	पश्चिम- वायव्य	पश्चिम- वायव्य	पश्चिम- वायव्य	पश्चिम
पश्चिम- वायव्य	पश्चिम- वायव्य	पश्चिम- नैऋत्य	पश्चिम- नैऋत्य	पश्चिम	पश्चिम		दु.						
पाऊस (मिमी) मागील आठवड्यातील						पाऊस (मिमी) ०१/०१/२०२५ पासून आजपर्यंत		पाऊस (मिमी) ०१/०६/२०२५ पासून आजपर्यंत					
३०.३						२८९.३		१६९.६					
हवामान सारांश / चेतावनी : प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई येथून प्राप्त झालेल्या अंदाजानुसार दिनांक १८ व २१ जुलै रोजी परभणी जिल्ह्यात तूरळक ठिकाणी वादळी वारा, मेघगर्जना, वाऱ्याचा वेग अधिक (ताशी ३० ते ४० कि.मी.) राहून हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. परभणी जिल्ह्यात दिनांक १८ व २१ जुलै रोजी काही ठिकाणी तर दिनांक १९, २० व २२ जुलै रोजी तूरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. परभणी जिल्ह्यात पुढील तीन ते चार दिवसात कमाल तापमानात तर किमान तापमानात पुढील चार ते पाच दिवसात फारशी तफावत जाणवणार नाही.													
सामान्य सल्ला : विस्तारीत अंदाजानुसार (ईआरएफएस) मराठवाड्यात दिनांक १८ ते २४ जुलै, २०२५ दरम्यान पाऊस सरासरीपेक्षा कमी, कमाल तापमान सरासरीपेक्षा जास्त व किमान तापमान सरासरीपेक्षा जास्त व दिनांक २५ ते ३१ जुलै २०२५ दरम्यान पाऊस सरासरीपेक्षा, कमाल तापमान व किमान तापमान सरासरीपेक्षा राहण्याची शक्यता आहे. सॅक, इसरो अहमदाबाद यांच्या उपग्रहाच्या बायोत्सर्जनाच्या जिल्हानिहाय व तालुकानिहाय छायाचित्रानुसार मराठवाड्यात बायोत्सर्जनाचा वेग किंचित कमी झालेला आहे.													
संदेश : पेरणी न झालेल्या ठिकाणी पेरणी योग्य पाऊस (७५ ते १०० मिमी) झाला असल्यास सूर्यफूल, तूर, संकरित बाजरी, सोयाबीन + तूर (४:२), बाजरी + तूर (३:३), एरंडी, कारळ आणि तिळ, एरंडी + घने ही पिके घ्यावीत.													
पिकांचे नाव		अवस्था		कृषी हवामान सल्ला									
सोयाबीन		वाढीची		सोयाबीन पिकात अंतरमशागतीची कामे करून पिक तण विरहीत ठेवावे. सोयाबीन पिकात पाने खाणाऱ्या अळ्या व घाटेअळी (उंट अळी)चा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास, याच्या व्यवस्थापनासाठी प्रोफेनोफॉस ५०% ईसी २० मिली किंवा लॅम्बडा सायहॅलोथ्रीन ४.९० % सीएस ६ मिली किंवा इंडोक्झाकार्ब १५.८० % ईसी ७ मिली प्रति १० लिटर पाणी यापैकी कुठलेही एक किटकनाशक पाऊसाने उघाड दिल्यास फवारावे. सोयाबीन पिक पेरणी करून २० दिवस झाले असल्यास तणांच्या व्यवस्थापनासाठी इमॅप्रोमॅक्स ३५ % + इमीझीथीपायर ३५% २ ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून पावसाची उघाड बघून फवारावे. सोयाबीन पिकास पाण्याचा ताण बसत असल्यास उपलब्धतेनुसार पाणी द्यावे. सोयाबीन पिकाची पेरणी करून एक महिना झाला असल्यास १ % (१०० ग्रॅम प्रति १० लिटर) पोर्टोशियम नायट्रेटची (१३:००:४५) फवारणी करावी. सूक्ष्म अन्नद्रव्याच्या कमतरतेमुळे सोयाबीन पिक पिवळे दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी मायक्रोन्यूट्रिएंट ग्रेड-२ ५० मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून पावसाची उघाड बघून फवारणी करावी.									
खरीप ज्वारी		वाढीची		खरीप ज्वारी पिकात अंतरमशागतीची कामे करून पिक तण विरहीत ठेवावे. खरीप ज्वारी पिकास पाण्याचा ताण बसत असल्यास उपलब्धतेनुसार पाणी द्यावे. खरीप ज्वारी पिकाची पेरणी करून एक महिना झाला असल्यास १ % (१०० ग्रॅम प्रति १० लिटर) पोर्टोशियम नायट्रेटची (१३:००:४५) फवारणी करावी. खरीप ज्वारी पिकाची पेरणी करून एक महिना झाला असल्यास उर्वरीत ४ ० किलो नत्र, २० किलो स्फुरद व २० किलो पालाश प्रति हेक्टर खतमात्रा द्यावी.									
बाजरी		पेरणी/वाढीची		पेरणी न केल्या भागात पेरणीयोग्य पाऊस (७५-१०० मिमी) झाल्यानंतर बिजप्रक्रिया करूनच बाजरी पिकाची पेरणी करावी. बाजरी पिकाची पेरणी ३० जुलैपर्यंत करता येते. बाजरी पिकात अंतरमशागतीची कामे करून पिक तण विरहीत ठेवावे. बाजरी पिकास पाण्याचा ताण बसत असल्यास उपलब्धतेनुसार पाणी द्यावे. बाजरी पिकाची पेरणी करून एक महिना झाला असल्यास १ % (१०० ग्रॅम प्रति १० लिटर) पोर्टोशियम नायट्रेटची (१३:००:४५) फवारणी करावी. बाजरी पिकाची पेरणी करून एक महिना झाला असल्यास उर्वरीत ४ ० किलो नत्र, २० किलो स्फुरद व २० किलो पालाश प्रति हेक्टर खतमात्रा द्यावी.									
ऊस		वाढीची		ऊस पिकात पांढरी माशीचा व पाकोळीचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी, लिक्वॅन्सिलियम लिक्वॅन्स या जैविक बुरशीची ४० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. रासायनिक कीटकनाशकांमध्ये क्लोरोपायरीफॉस २० टक्के ३० मिली किंवा इमिडाक्लोप्रिड १७.८ टक्के ३ मिली किंवा अंसीफेट ७५ % २० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे. इमिडाक्लोप्रिड १७.८% कीटकनाशकासोबत २ टक्के युरिया (२०० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात) मिसळून पावसाची उघाड बघून फवारणी करावी. ऊस पिकास पाण्याचा ताण बसत असल्यास उपलब्धतेनुसार पाणी द्यावे.									
हळद		आंतरपिक/वाढीची		हळदीमध्ये आंतरपिके घेताना पहिल्या तीन ते साडेतीन महिन्यांपर्यंत काढणी होईल अशा प्रकारची आंतरपिके निवडावीत. यामध्ये पालेभाज्या सारख्या आंतरपिकांचा समावेश असावा. हळद पिकास पाण्याचा ताण बसत असल्यास उपलब्धतेनुसार पाणी द्यावे. हळद पिकात अंतरमशागतीची कामे करून पिक तण विरहीत ठेवावे. हळद पिकास २५ किलो नत्र प्रति हेक्टर सूक्ष्म सिंचन पद्धतीने महिन्यातून तीन ते चार वेळा द्यावे.									
संत्रा/मोसंबी		जातीची निवड/वाढीची/फुलधारणा		मृग बहार संत्रा/मोसंबी बागेत पाण्याचा ताण बसणार नाही याची दक्षता घ्यावी व आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे. संत्रा नविन बाग लागवडीसाठी नागपूर संत्रा, किन्नो तर मोसंबी नविन बाग लागवडीसाठी न्यूसलेट, सातगुडी व फुले मोसंबी इत्यादी जातींची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी. अंबे बहार संत्रा/मोसंबी बागेत रसशोषण करणाऱ्या किडीच्या व्यवस्थापनासाठी कीटकनाशकाची फवारणी पावसाची उघाड बघून करावी.									
डाळींब		जातीची निवड / फुलोरा, वाढीची		डाळींब बागेतील अतिरिक्त फुटवे काढावेत. मृग बहार डाळींब बागेत पाण्याचा ताण बसणार नाही याची दक्षता घ्यावी व आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे. डाळींब नविन बाग लागवडीसाठी भगवा, फुले भगवा सुपर, गणेश, फुले आरक्ता, इत्यादी जातींची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी. डाळींब बागेत ००:५२:३४ १५ ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात मिसळून पावसाची उघाड बघून फवारणी करावी.									
चिकू		जातीची निवड / वाढीची		चिकू नविन बाग लागवडीसाठी कालीपत्ती, क्रिकेट बॉल इत्यादी जातींची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी. चिकू बागेत आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे.									
भाजीपाला		पूर्णलागवड / काढणी/ वाढीची		भाजीपाला पिकास पाण्याचा ताण बसत असल्यास आवश्यकतेनुसार सूक्ष्म सिंचन पद्धतीने पाणी व्यवस्थापन करावे. गादीवाफ्यावर तयार केलेल्या भाजीपाला पिकांच्या रोपांना ४५ दिवस झाले असल्यास पाऊस झालेल्या ठिकाणी जमिनीत ओलावा बघून भाजीपाला पिकांची (वांगी, मिरची, टोमॅटो इ.) पूर्णलागवड करावी. पाऊस झालेल्या ठिकाणी जमिनीत ओलावा बघून बियाद्वारे लागवड केल्या जाणाऱ्या भाज्या उदा. भेंडी, कारले, भोपळा, दोडका इत्यादी भाजीपाला पिकांची लागवड करावी. काढणीस तयार असलेल्या भाजीपाला पिकांची काढणी करून घ्यावी. भाजीपाला (मिरची, वांगे व भेंडी) पिकात रसशोषण करणाऱ्या किडीचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास त्याच्या व्यवस्थापनासाठी पायरीप्रॉक्सीफेन ५% + फेनप्रोपाथ्रीन १५% १० मीली किंवा डायमेथोएट ३०% १३ मीली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.									
फुलशेती		पूर्णलागवड / काढणी/ वाढीची		फुल पिकास पाण्याचा ताण बसत असल्यास आवश्यकतेनुसार सूक्ष्म सिंचन पद्धतीने पाणी व्यवस्थापन करावे. पाऊस झालेल्या ठिकाणी जमिनीत ओलावा असल्याची खात्री करून फुल पिकाची पूर्णलागवड करावी. काढणीस तयार असलेल्या फुलपिकांची काढणी करून घ्यावी. काढणीस तयार असलेल्या फुलपिकांची काढणी करून घ्यावी.									
तुती रेशीम उद्योग		----		चिन देशाच्या तुलनेत भारतात वर्षाकाठी रेशीम कोषाची सरासरी निम्मी पिके म्हणजे ४-५ पिके घेतली जातात याउलट चिन देशात वर्षाला कोषाची १० ते १२ पिके घेतली जातात. प्रती एकर प्रती पिक चिन देशात २५० ते ३०० अंडीपुजाचे एक पीक तर भारतात १५५० ते २०० अंडीपूज सरासरी घेतले जातात. जागतीक कच्च्या रेशीम उत्पादनात सातत्याने चिन देश प्रथम क्रमांकावर आहे. भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. रेशीम उद्योगात भारत देशात ८.९ दशलक्ष लोकांना रोजगार उपलब्ध होतो तर चिन देशात फक्त १ दशलक्ष लोक हे रेशीम उद्योगाचे कार्य करत आहेत. चिन देशाच्या तुलनेत आपल्या शेतकऱ्यांनी तुती पानाची प्रत आणि रेशीम किटक संगोपन तंत्रज्ञान सुधारणा करणे गरजेचे आहे तरच जागतीक स्पर्धेत राहता येईल.									
पशुधन व्यवस्थापन		----		गोवंशीय पशुधनामध्ये लष्मी स्कॉन रोगाचा प्रादुर्भाव अत्यंत वेगाने होत आहे. याची सर्वात जास्त झळ लहान वयातील वासरांना जाणवत असून मृत्यूचे प्रमाण वाढत आहे. अशा वेळी नियंत्रणासाठी व त्यांची शारिरीक प्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी १) वासरांना चिक पाजवा. २) वयाच्या सातव्या दिवशी जंतनाशक औषधीची मात्रा द्यावी. ३) महाराष्ट्र शासन यांच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार लसीकरण करून घ्यावे. ४)आजारी आणि निरोगी वासरे, गोयन स्वतंत्र पणे विलगीकरण करावे. ५) सर्वात महत्वाचे म्हणजे २० % सूत्रापा व ८०% काळजी (ज्यामध्ये पाणी, सकस चारा, जखमांची सुशुषा इत्यादी) गोष्टी कराव्यात.									
सदर कृषी हवामान सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मोसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.													

सदर कृषी हवामान सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.

मुख्य प्रकल्प समन्वयक
ग्रामीण कृषी मौसम सेवा
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी