



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
अखिल भारतीय समन्वयित कृषि हवामानशास्त्र संशोधन प्रकल्प
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी — ४३१ ४०२
ईमेल - amfuparbhani@gmail.com



परभणी जिल्हा कृषि हवामान सल्ला पत्रक क्रमांक — २६/२०२५ - २०२६ शुक्रवार, दिनांक — २७.०६.२०२५

मागील आठवड्यातील हवामानस्थिती (दिनांक २१ ते २७ जून २०२५)							हवामान घटक		हवामान अंदाज (दिनांक २८ जून ते ०२ जुलै, २०२५ साठी हवामान अंदाज)				
२१/०६	२२/०६	२३/०६	२४/०६	२५/०६	२६/०६	२७/०६	दिनांक		२८/०६	२९/०६	३०/०६	०१/०७	०२/०७
०.०	०.०	०.०	०.०	०.०	२१.२	३.१	पाऊस (मिमी)		६	५	४	६	१०
३५.५	३५.५	३२.८	३६.८	३४.४	२५.८		कमाल तापमान (अं .से)		२९	३१	३१	३१	३०
२४.०	२४.२	२४.५	२३.९	२५.२	२३.८	२२.७	किमान तापमान (अं .से)		२४	२४	२४	२३	२३
स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ	अंशतः ढगाळ	ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	अंशतः ढगाळ	स.	ढग स्थिती (आकाश)	पूर्णतः ढगाळ	ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ
स्वच्छ	स्वच्छ	अंशतः ढगाळ	ढगाळ	ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ		दु.						
७८	७४	८०	७८	७७	९५	८७	सकाळची सापेक्ष आर्दता (%)		९२	८६	९०	९१	९२
४२	३९	४८	५०	४८	९५		दुपारची सापेक्ष आर्दता (%)		७८	७२	७३	७६	७३
८.५	९.२	८.१	९.०	७.९	५.०	२.०	वाऱ्याचा वेग (किमी /तास)		१६.१	१७.३	१९.८	२०.३	२१.१
पश्चिम- नैऋत्य	पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम- नैऋत्य	शांत	पश्चिम- नैऋत्य	पश्चिम- वायव्य	स.	वाऱ्याची दिशा	पश्चिम- नैऋत्य	पश्चिम- नैऋत्य	पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम
पश्चिम- वायव्य	पश्चिम- नैऋत्य	पश्चिम- नैऋत्य	पश्चिम- नैऋत्य	शांत			दु.						
पाऊस (मिमी) मागील आठवड्यातील					पाऊस (मिमी) ०१/०१/२०२५ पासुन आजपर्यंत			पाऊस (मिमी) ०१/०६/२०२५ पासुन आजपर्यंत					
२४.३					२१५.२			९५.५					
हवामान सारांश / चेतावनी : प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई येथून प्राप्त झालेल्या अंदाजानुसार दिनांक ०१ जुलै रोजी परभणी जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी वादळी वारा, मेघगर्जना, वाऱ्याचा वेग अधिक (ताशी ३० ते ४० कि.मी.) राहून हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. मराठवाड्यात पुढील पाच दिवसात तुरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. मराठवाड्यात पुढील पाच दिवस कमाल तापमानात फारशी तफावत जाणवत नाही तर पुढील चार ते पाच दिवसात किमान तापमानात फारशी तफावत जाणवत नाही.													
सामान्य सल्ला : विस्तारीत अंदाजानुसार (ईआरएफएस) मराठवाड्यात दिनांक २७ जून ते ०३ जुलै, २०२५ दरम्यान पाऊस सरासरीपेक्षा कमी,, कमाल तापमान सरासरीपेक्षा कमी व किमान तापमान सरासरी एवढे व दिनांक ०४ ते १० जुलै २०२५ दरम्यान पाऊस सरासरीपेक्षा जास्त,, कमाल तापमान व किमान तापमान सरासरीएवढे राहण्याची शक्यता आहे. मराठवाड्यात ज्या तालुक्यात पेरणी योग्य पाऊस (७५-१०० मिमी) झाला आहे (छ . संभाजीनगर जिल्हा : खुलताबाद, कन्नड, सोयगाव, सिल्लोड व फुलेंडी तालुका; जालना जिल्हा : भोकरधन व जाफ्राबाद तालुका; नांदेड जिल्हा : नांदेड, बिलोली, हदगाव, किनवड, मुदखेड, हिमायतनगर व माहूर तालुका; हिंगोली जिल्हात : हिंगोली,कळमनुरी व वसमत तालुका) या जिल्ह्यातील तालुक्यात वापसा असतांना पेरणी करण्यास हरकत नाही. इतर तालुक्यात शेतकरी बांधवांनी पेरणीची घाई करू नये पेरणीयोग्य पाऊस (७५-१०० मिमी) झाल्यानंतरच पेरणी करावी.													
संदेश : शेतकरी बांधवांनी पेरणीची घाई करू नये. पेरणीयोग्य पाऊस (७५-१०० मिमी) झाल्यानंतरच पेरणी करावी, पेरणी करण्यापूर्वी बियाण्यास बिजप्रक्रिया करूनच पेरणी करावी. सर्वसाधारणपणे १५ जुलै पर्यंत सर्व खरीप पिकांची (मूग, उडीद, भुईमूग सोडून) पेरणी करता येते.													
पिकांचे नाव		अवस्था		कृषी हवामान सल्ला									
सोयाबीन		पेरणी/उगवण		पेरणी न केलेल्या भागात पेरणीयोग्य पाऊस (७५-१०० मिमी) झाल्यानंतर बिजप्रक्रिया करूनच सोयाबीन पिकाची पेरणी करावी . सोयाबीन पिकाची पेरणी १५ जुलैपर्यंत करता येते. सोयाबीन पिकाची पेरणी शक्यतो बी.बी.एफ (रूंद वरंदा सरी) पध्दतीने करावी ज्यामुळे मातीतील ओलावा व जमिनीची सुपिकता टिकून राहण्यास मदत होऊन अधिक उत्पादन मिळते. पेरणी केलेल्या सोयाबीन पिकात अंतरमशागतीची कामे करून पिक तण विरहीत ठेवावे. सोयाबीन पिकात पाण्याचा ताण बसत असल्यास ०.५% (५० ग्रॅम प्रति १० लिटर) पोर्टेशियम नायट्रेटची (१३:००:४५) फवारणी करावी.									
खरीप ज्वारी		पेरणी/उगवण		पेरणी न केलेल्या भागात पेरणीयोग्य पाऊस (७५-१०० मिमी) झाल्यानंतर बिजप्रक्रिया करूनच खरीप ज्वारी पिकाची पेरणी करावी . खरीप ज्वारी पिकाची पेरणी ०७ जुलैपर्यंत करता येते. पेरणी केलेल्या खरीप ज्वारी पिकात अंतरमशागतीची कामे करून पिक तण विरहीत ठेवावे. खरीप ज्वारी पिकात पाण्याचा ताण बसत असल्यास ०.५% (५० ग्रॅम प्रति १० लिटर) पोर्टेशियम नायट्रेटची (१३:००:४५) फवारणी करावी.									
बाजरी		पेरणी/उगवण		पेरणी न केलेल्या भागात पेरणीयोग्य पाऊस (७५-१०० मिमी) झाल्यानंतर बिजप्रक्रिया करूनच बाजरी पिकाची पेरणी करावी . बाजरी पिकाची पेरणी ३० जुलैपर्यंत करता येते. पेरणी केलेल्या बाजरी पिकात अंतरमशागतीची कामे करून पिक तण विरहीत ठेवावे. बाजरी पिकात पाण्याचा ताण बसत असल्यास ०.५% (५० ग्रॅम प्रति १० लिटर) पोर्टेशियम नायट्रेटची (१३:००:४५) फवारणी करावी.									
ऊस		वाढीची		ऊस पिकास पाण्याचा ताण बसणार नाही याची काळजी घ्यावी. ऊस पिकास सकाळी लवकर किंवा सायंकाळी पाणी व्यवस्थापन करावे. सुरू ऊसाची पक्की बांधणी केली नसल्यास ती करून घ्यावी व पक्की बांधणी करताना १०० किलो नत्र, ५५ किलो स्फुरद व ५५ किलो पालाश प्रति हेक्टरास रासायनिक खतांची मात्रा द्यावी.									
हळद		आंतरपीक		हळदीमध्ये आंतरपीके घेताना पहिल्या तीन ते साडेतीन महिन्यांपर्यंत काढणी होईल अशा प्रकारची आंतरपीके निवडावीत. यामध्ये पालेभाज्या सारख्या आंतरपिकांचा समावेश असावा.									
संत्रा/मोसंबी		जातींची निवड/वाढीची		संत्रा नविन बाग लागवडीसाठी नागपूर संत्रा, किन्नो तर मोसंबी नविन बाग लागवडीसाठी न्यूसेलर, सातगुडी व फुले मोसंबी इत्यादी जातींची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी. अंबे बहार संत्रा/मोसंबी बागेत कीटकनाशकाची फवारणी पावसाची उघाड बघून करावी. संत्रा/मोसंबी बागेत मृगबहारासाठी खत मात्रा दिली नसल्यास मोसंबीसाठी ४००:४००:४०० व संत्रासाठी ५००:५००:५०० ग्राम प्रति झाड नत्र : स्फुरद : पालाश खत मात्रा द्यावी.									
डाळींब		जातींची निवड / फुलोरा, वाढीची		डाळींब नविन बाग लागवडीसाठी भगवा, फुल भगवा सुपर, गणेश, फुल आरक्ता, इत्यादी जातींची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी. डाळिंब बागेत मृगबहारासाठी खत मात्रा दिली नसल्यास डाळींबासाठी ३००:२५०:२५० ग्राम प्रति झाड नत्र : स्फुरद : पालाश खत मात्रा द्यावी.									
चिकू		जातींची निवड / वाढीची		चिकू नविन बाग लागवडीसाठी कालोपत्तो, क्रिकेट बॉल इत्यादी जातींची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी. चिकू बागेत खत मात्रा दिली नसल्यास ५००:५००:५०० ग्राम प्रति झाड नत्र : स्फुरद : पालाश खत मात्रा द्यावी.									
भाजीपाला		रोपे तयार करणे / पूर्णलागवड / काढणी		पाण्याची उपलब्धता असल्यास भाजीपाला (वांगी, मिरची, टोमॅटो इत्यादी) पिकाची रोपे तयार करण्यासाठी गादी वाफ्यावर बी टाकावे. भाजीपाल्याचे बी टाकलेल्या गादी वाफ्यावरील तणांचे नियंत्रण करावे आवश्यकतेनुसार झाऱ्याच्या साहाय्याने पाणी द्यावे. गादीवाफ्यावर तयार केलेल्या भाजीपाला पिकांच्या रोपांना ४५ दिवस झाले असल्यास पाऊस झालेल्या ठिकाणी जमिनीत ओलावा बघून भाजीपाला पिकांची (वांगी, मिरची, टोमॅटो इ.) पूर्णलागवड करावी. पाऊस झालेल्या ठिकाणी जमिनीत ओलावा बघून बियाद्वारे लागवड केल्या जाणाऱ्या भाज्या उदा. भेंडी, कारले, भोपळा, दोडका इत्यादी भाजीपाला पिकांची लागवड करावी. काढणीस तयार असलेल्या भाजीपाला पिकांची काढणी करून घ्यावी.									
फुलशेती		रोपे तयार करणे / पूर्णलागवड / काढणी		पाण्याची उपलब्धता असल्यास फुल पिकाची रोपे तयार करण्यासाठी गादी वाफ्यावर बी टाकावे. फुलपिकाचे बी टाकलेल्या गादी वाफ्यावरील तणांचे नियंत्रण करावे आवश्यकतेनुसार झाऱ्याच्या साहाय्याने पाणी द्यावे. पाउस झालेल्या ठिकाणी जमिनीत ओलावा असल्याची खात्री करून फुल पिकाची पूर्णलागवड करावी. काढणीस तयार असलेल्या फुलपिकाची काढणी करून घ्यावी. काढणीस तयार असलेल्या फुलपिकांची काढणी करून घ्यावी.									
तुती रेशीम उद्योग		-----		ढगाळ हवामानात संगोपन गृहात तापमान २२ ते २८ अं. से आणि आर्द्रता ८५% पर्यंत असावी. पाऊसात किंवा पाऊस चालू असताना आर्द्रता १००% असते. अशा वेळी कीटकांनी पाने खाल्यानंतर अवघ्यावर पांढरा चुना धुलणी करावी. १०० अंडी पुंजासाठी १२ ते १५ किलो ग्रॅम पांढरा चुना धुलणी लागतो आणि निर्जंतुक पावडर म्हणून विजेता किंवा अंकुश पावडर या ४. ते ५. किलो ग्रॅम १०० अंडीपुंजासाठी वापर करावा. सतत पाऊस पडत असेल तर पाण्याने भिजलेली तुती पाने खाद्य म्हणून चालतात पण त्याच्यासोबत माती किंवा धूळ येत कामा नये.									
पशुधन व्यवस्थापन		-----		पावसाळ्याच्या सुरुवातीच्या काळात वातावरणातील आर्द्रता, तापमानातील बदल, पाणी साचणे, चिखल होणे, माश्या व इतर कीटकांचा प्रादुर्भाव दिसून येतो, या कारणाने पशुधनाचे आरोग्य बिघडते, त्यासाठी खालील उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. पशुधनासाठी सुरक्षित व स्वच्छ निवाऱ्याची व्यवस्था करणे, गोठ्याच्या परिसरात पाऊसाचे पाणी साचणार नाही याची काळजी घ्यावी, दर १५ दिवसांनी गोठ्याचे पोर्टेशियम परमॅगनेटच्या द्रावणाने निर्जंतुकरणाचे करावे.									
सदर कृषी हवामान सल्ला पत्रिका वस्तरावर नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मोसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.													



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
अखिल भारतीय समन्वयित कृषि हवामानशास्त्र संशोधन प्रकल्प
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी — ४३१ ४०२
ईमेल - amfuparbhani@gmail.com



बीड जिल्हा कृषि हवामान सल्ला पत्रक क्रमांक — २६/२०२५ - २०२६ शुक्रवार, दिनांक — २७.०६.२०२५

मागील आठवड्यातील हवामानस्थिती (दिनांक २१ ते २७ जून २०२५)							हवामान घटक		हवामान अंदाज (दिनांक २८ जून ते ०२ जुलै, २०२५ साठी हवामान अंदाज)				
२१/०६	२२/०६	२३/०६	२४/०६	२५/०६	२६/०६	२७/०६	दिनांक		२८/०६	२९/०६	३०/०६	०१/०७	०२/०७
							पाऊस (मिमी)		५	४	४	४	१०
							कमाल तापमान (अं .से)		३१	३१	३२	३२	३०
							किमान तापमान (अं .से)		२३	२३	२३	२२	२२
							स.	ढग स्थिती (आकाश)	पूर्णतः ढगाळ	ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ
						दु.	पूर्णतः ढगाळ		पूर्णतः ढगाळ		पूर्णतः ढगाळ		
							सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)		९५	८८	९१	९३	९४
							दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)		८१	७८	७७	७९	७८
							वाऱ्याचा वेग (किमी /तास)		१९.७	२०.६	२३.५	२३.२	२३.२
							स.	वाऱ्याची दिशा	नैऋत्य	पश्चिम- नैऋत्य	पश्चिम- नैऋत्य	पश्चिम- नैऋत्य	पश्चिम- नैऋत्य
						दु.							

हवामान सारांश / चेतावनी :

प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई येथून प्राप्त झालेल्या अंदाजानुसार मराठवाड्यात पुढील पाच दिवसात तुरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. मराठवाड्यात पुढील पाच दिवस कमाल तापमानात फारशी तफावत जाणवत नाही तर पुढील चार ते पाच दिवसात किमान तापमानात फारशी तफावत जाणवत नाही.

सामान्य सल्ला :

विस्तारीत अंदाजानुसार (ईआरएफएस) मराठवाड्यात दिनांक २७ जून ते ०३ जुलै, २०२५ दरम्यान पाऊस सरासरीपेक्षा कमी, कमाल तापमान सरासरीपेक्षा कमी व किमान तापमान सरासरीपेक्षा एवढे व दिनांक ०४ ते १० जुलै २०२५ दरम्यान पाऊस सरासरीपेक्षा जास्त, कमाल तापमान व किमान तापमान सरासरीपेक्षा राहण्याची शक्यता आहे.

मराठवाड्यात ज्या तालुक्यात पेरणी योग्य पाऊस (७५-१०० मिमी) झाला आहे (छ. संभाजीनगर जिल्हा : खुलताबाद, कन्नड, सोयगाव, सिल्लोड व फुलंब्री तालुका; जालना जिल्हा : भोकरधन व जाफाबाद तालुका; नांदेड जिल्हा : नांदेड, बिलोली, हदगाव, किनवट, मुदखेड, हिमायतनगर व माहूर तालुका; हिंगोली जिल्हा : हिंगोली, कळमनुरी व वसमत तालुका) या जिल्ह्यातील तालुक्यात वापसा असतांना पेरणी करण्यास हरकत नाही. इतर तालुक्यात शेतकरी बांधवांनी पेरणीची घाई करू नये पेरणीयोग्य पाऊस (७५-१०० मिमी) झाल्यानंतरच पेरणी करावी.

संदेश : शेतकरी बांधवांनी पेरणीची घाई करू नये. पेरणीयोग्य पाऊस (७५-१०० मिमी) झाल्यानंतरच पेरणी करावी, पेरणी करण्यापूर्वी बियाण्यास बिजप्रक्रिया करूनच पेरणी करावी. सर्वसाधारणपणे १५ जुलै पर्यंत सर्व खरीप पिकांची (मूग, उडीद, भुईमूग सोडून) पेरणी करता येते.

पिकांचे नाव	अवस्था	कृषी हवामान सल्ला
सोयाबीन	पेरणी/उगवण	पेरणी न केलेल्या भागात पेरणीयोग्य पाऊस (७५-१०० मिमी) झाल्यानंतर बिजप्रक्रिया करूनच सोयाबीन पिकाची पेरणी करावी. सोयाबीन पिकाची पेरणी १५ जुलैपर्यंत करता येते. सोयाबीन पिकाची पेरणी शक्यतो बी.बी.एफ (रूंद वरंदा सरी) पध्दतीने करावी ज्यामुळे मातीतील ओलावा व जमिनीची सुपिकता टिकून राहण्यास मदत होऊन अधिक उत्पादन मिळते. पेरणी केलेल्या सोयाबीन पिकात अंतरमशागतीची कामे करून पिक तण विरहीत ठेवावे. सोयाबीन पिकात पाण्याचा ताण बसत असल्यास ०.५% (५० ग्रॅम प्रति १० लिटर) पोर्टिशियम नायट्रेटची (१३:००:४५) फवारणी करावी.
खरीप ज्वारी	पेरणी/उगवण	पेरणी न केलेल्या भागात पेरणीयोग्य पाऊस (७५-१०० मिमी) झाल्यानंतर बिजप्रक्रिया करूनच खरीप ज्वारी पिकाची पेरणी करावी. खरीप ज्वारी पिकाची पेरणी ०७ जुलैपर्यंत करता येते. पेरणी केलेल्या खरीप ज्वारी पिकात अंतरमशागतीची कामे करून पिक तण विरहीत ठेवावे. खरीप ज्वारी पिकात पाण्याचा ताण बसत असल्यास ०.५% (५० ग्रॅम प्रति १० लिटर) पोर्टिशियम नायट्रेटची (१३:००:४५) फवारणी करावी.
बाजरी	पेरणी/उगवण	पेरणी न केलेल्या भागात पेरणीयोग्य पाऊस (७५-१०० मिमी) झाल्यानंतर बिजप्रक्रिया करूनच बाजरी पिकाची पेरणी करावी. बाजरी पिकाची पेरणी ३० जुलैपर्यंत करता येते. पेरणी केलेल्या बाजरी पिकात अंतरमशागतीची कामे करून पिक तण विरहीत ठेवावे. बाजरी पिकात पाण्याचा ताण बसत असल्यास ०.५% (५० ग्रॅम प्रति १० लिटर) पोर्टिशियम नायट्रेटची (१३:००:४५) फवारणी करावी.
ऊस	वाढीची	ऊस पिकास पाण्याचा ताण बसणार नाही याची काळजी घ्यावी. ऊस पिकास सकाळी लवकर किंवा सायंकाळी पाणी व्यवस्थापन करावे. सुरु ऊसाची पक्की बांधणी केली नसल्यास ती करून घ्यावी व पक्की बांधणी करतांना १०० किलो नत्र, ५५ किलो स्फुरद व ५५ किलो पालाश प्रति हेक्टरास रासायनिक खतांची मात्रा द्यावी.
हळद	आंतरपीक	हळदीमध्ये आंतरपीके घेताना पहिल्या तीन ते साडेतीन महिन्यांपर्यंत काढणी होईल अशा प्रकारची आंतरपीके निवडावीत. यामध्ये पालेभाज्या सारख्या आंतरपिकांचा समावेश असावा.
संत्रा/मोसंबी	जातीची निवड/वाढीची	संत्रा नविन बाग लागवडीसाठी नागपूर संत्रा, किन्नो तर मोसंबी नविन बाग लागवडीसाठी न्युसेलर, सातगुडी व फुले मोसंबी इत्यादी जातींची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी. अंबे बहार संत्रा/मोसंबी बागेत कोटकाशकाची फवारणी पावसाची उघाड बघून करावी. संत्रा/मोसंबी बागेत मृगबहारासाठी खत मात्रा दिली नसल्यास मोसंबीसाठी ४००:४००:४०० व संत्रासाठी ५००:५००:५०० ग्राम प्रति झाड नत्र : स्फुरद : पालाश खत मात्रा द्यावी.
डाळींब	जातीची निवड/फुलोरा, वाढीची	डाळींब नविन बाग लागवडीसाठी भगवा, फुले भगवा सुपर, गणेश, फुले आरक्ता, इत्यादी जातींची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी. डाळींब बागेत मृगबहारासाठी खत मात्रा दिली नसल्यास डाळींबासाठी ३००:२५०:२५० ग्राम प्रति झाड नत्र : स्फुरद : पालाश खत मात्रा द्यावी.
चिक्कू	जातीची निवड/वाढीची	चिक्कू नविन बाग लागवडीसाठी कालीपत्ती, क्रिकेट बॉल इत्यादी जातींची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी. चिक्कू बागेत खत मात्रा दिली नसल्यास ५००:५००:५०० ग्राम प्रति झाड नत्र : स्फुरद : पालाश खत मात्रा द्यावी.
भाजीपाला	रोपे तयार करणे / पूर्णलागवड / काढणी	पाण्याची उपलब्धता असल्यास भाजीपाला (वांगी, मिरची, टोमॅटो इत्यादी) पिकांची रोपे तयार करण्यासाठी गादी वाफ्यावर बी टाकावे. भाजीपाल्याचे बी टाकलेल्या गादी वाफ्यावरील तणांचे नियंत्रण करावे आवश्यकतेनुसार झाऱ्याच्या साहाय्याने पाणी द्यावे. गादीवाफ्यावर तयार केलेल्या भाजीपाला पिकांच्या रोपांना ४५ दिवस झाले असल्यास पाऊस झालेल्या ठिकाणी जमिनीत ओलावा बघून भाजीपाला पिकांची (वांगी, मिरची, टोमॅटो इ.) पूर्णलागवड करावी. पाऊस झालेल्या ठिकाणी जमिनीत ओलावा बघून बियाद्वारे लागवड केल्या जाणाऱ्या भाज्या उदा. भेंडी, कारले, भोपळा, दोडका इत्यादी भाजीपाला पिकांची लागवड करावी. काढणीस तयार असलेल्या भाजीपाला पिकांची काढणी करून घ्यावी.
फुलशेती	रोपे तयार करणे / पूर्णलागवड / काढणी	पाण्याची उपलब्धता असल्यास फुल पिकांची रोपे तयार करण्यासाठी गादी वाफ्यावर बी टाकावे. फुलपिकाचे बी टाकलेल्या गादी वाफ्यावरील तणांचे नियंत्रण करावे आवश्यकतेनुसार झाऱ्याच्या साहाय्याने पाणी द्यावे. पाऊस झालेल्या ठिकाणी जमिनीत ओलावा असल्याची खात्री करून फुल पिकाची पूर्णलागवड करावी. काढणीस तयार असलेल्या फुलपिकांची काढणी करून घ्यावी. काढणीस तयार असलेल्या फुलपिकांची काढणी करून घ्यावी.
तुती रेशीम उद्योग	---	दगाळ हवामानात संगोपन गृहात तापमान २२ ते २८ अं. से. आणि आर्द्रता ८५% पर्यंत असावी. पाऊसात किंवा पाऊस चालू असताना आर्द्रता १००% असते. अशा वेळी कोंटकांनी पाने खाल्यानंतर अवघावर पांढरा चुना धुळणी करावी. १०० अंडी पुंजासाठी १२ ते १५ किलो ग्रॅम पांढरा चुना धुळणी लागतो आणि निर्जंतुक पावडर म्हणून विजेता किंवा अंकुश पावडर या ४. ते ५. किलो ग्रॅम १०० अंडीपुंजासाठी वापर करावा. सतत पाऊस पडत असेल तर पाण्याने भिजलेली तुती पाने खाद्य म्हणून चालतात पण त्याच्यासोबत माती किंवा धूळ येत कामा नये.
पशुधन व्यवस्थापन	-----	पावसाळ्याच्या सुरुवातीच्या काळात वातावरणातील आर्द्रता, तापमानातील बदल, पाणी साचणे, चिखल हाणे, माश्या व इतर कोंटकांचा प्रादुर्भाव दिसून येतो, या कारणांने पशुधनाचे आरोग्य बिघडते, त्यासाठी खालील उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. पशुधनासाठी सुरक्षित व स्वच्छ निवाऱ्याची व्यवस्था करणे, गोठ्याच्या परिसरात पाऊसाचे पाणी साचणार नाही याची काळजी घ्यावी, दर १५ दिवसांने गोठ्याचे पोर्टिशियम परमॅंगनेटच्या द्रावणाने निर्जंतुकरण करावे.

सदर कृषी हवामान सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.

मुख्य प्रकल्प समन्वयक
ग्रामीण कृषी मौसम सेवा
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
अखिल भारतीय समन्वयित कृषि हवामानशास्त्र संशोधन प्रकल्प
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी - ४३१ ४०२
ईमेल - amfuparbhani@gmail.com



हिंगोली जिल्हा कृषि हवामान सल्ला पत्रक क्रमांक - २६/२०२५ - २०२६ शुक्रवार, दिनांक - २७.०६.२०२५

मागील आठवड्यातील हवामानस्थिती (दिनांक २१ ते २७ जून २०२५)							हवामान घटक		हवामान अंदाज (दिनांक २८ जून ते ०२ जुलै, २०२५ साठी हवामान अंदाज)				
२१/०६	२२/०६	२३/०६	२४/०६	२५/०६	२६/०६	२७/०६	दिनांक		२८/०६	२९/०६	३०/०६	०१/०७	०२/०७
							पाऊस (मिमी)		५	४	३	२	९
							कमाल तापमान (अं .सें)		२९	३१	३१	३१	३०
							किमान तापमान (अं .सें)		२४	२४	२४	२३	२३
							स.	Fully cloudy	पूर्णतः ढगाळ	ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ
							दु.						
							सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)		९२	८५	९०	९०	९३
							दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)		७८	७१	७३	७५	७३
							वाऱ्याचा वेग (किमी /तास)		१६.१	१७.९	२०.५	२१.३	२१
							स.	वाऱ्याची दिशा	पश्चिम- नैऋत्य	पश्चिम- नैऋत्य	पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम
							दु.						

हवामान सारांश / चेतावनी :

प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई येथून प्राप्त झालेल्या अंदाजानुसार दिनांक ०१ जुलै रोजी हिंगोली जिल्ह्यात तूरळक ठिकाणी वादळी वारा, मेघगर्जन, वाऱ्याचा वेग अधिक (ताशी ३० ते ४० कि.मी.) राहून हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. मराठवाड्यात पुढील पाच दिवसात तूरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. मराठवाड्यात पुढील पाच दिवस कमाल तापमानात फारशी तफावत जाणवत नाही तर पुढील चार ते पाच दिवसात किमान तापमानात फारशी तफावत जाणवत नाही.

सामान्य सल्ला :

विस्तारीत अंदाजानुसार (ईआरएफएस) मराठवाड्यात दिनांक २७ जून ते ०३ जुलै, २०२५ दरम्यान पाऊस सरासरीपेक्षा कमी, कमाल तापमान सरासरीपेक्षा कमी व किमान तापमान सरासरी एवढे व दिनांक ०४ ते १० जुलै २०२५ दरम्यान पाऊस सरासरीपेक्षा जास्त, कमाल तापमान व किमान तापमान सरासरीएवढे राहण्याची शक्यता आहे.

मराठवाड्यात ज्या तालुक्यात पेरणी योग्य पाऊस (७५-१०० मिमी) झाला आहे (छ. संभाजीनगर जिल्हा : खुलताबाद, कन्नड, सोयगाव, सिल्लोड व फुलंब्री तालुका; जालना जिल्हा : भोकरधन व जाफ्राबाद तालुका; नांदेड जिल्हा : नांदेड, बिलोली, हदगाव, किनवट, मुदखेड, हिमायतनगर व माहूर तालुका; हिंगोली जिल्ह्यात : हिंगोली,कळमनुरी व वसमत तालुका) या जिल्ह्यातील तालुक्यात वापसा असतांना पेरणी करण्यास हरकत नाही. इतर तालुक्यात शेतकरी बांधवांनी पेरणीची घाई करू नये. पेरणीयोग्य पाऊस (७५-१०० मिमी) झाल्यानंतरच पेरणी करावी.

संदेश : शेतकरी बांधवांनी पेरणीची घाई करू नये. पेरणीयोग्य पाऊस (७५-१०० मिमी) झाल्यानंतरच पेरणी करावी, पेरणी करण्यापूर्वी बियाण्यास बिजप्रक्रिया करूनच पेरणी करावी. सर्वसाधारणपणे १५ जुलै पर्यंत सर्व खरीप पिकांची (मूग, उडीद, भूईमूग सोडून) पेरणी करता येते.

पिकांचे नाव	अवस्था	कृषी हवामान सल्ला
सोयाबीन	पेरणी/उगवण	पेरणी न केलेल्या भागात पेरणीयोग्य पाऊस (७५-१०० मिमी) झाल्यानंतर बिजप्रक्रिया करूनच सोयाबीन पिकाची पेरणी करावी. सोयाबीन पिकाची पेरणी १५ जुलैपर्यंत करता येते. सोयाबीन पिकाची पेरणी शक्यतो बी.बी.एफ (रूंद वरंवा सरी) पध्दतीने करावी ज्यामुळे मातीतील ओलावा व जमिनीची सुपिकता टिकून राहण्यास मदत होऊन अधिक उत्पादन मिळते. पेरणी केलेल्या सोयाबीन पिकात अंतरमशागतीची कामे करून पिक तण विरहीत ठेवावे. सोयाबीन पिकात पाण्याचा ताण बसत असल्यास ०.५% (५० ग्रॅम प्रति १० लिटर) पोर्टेशियम नायट्रेटची (१३:००:४५) फवारणी करावी.
खरीप ज्वारी	पेरणी/उगवण	पेरणी न केलेल्या भागात पेरणीयोग्य पाऊस (७५-१०० मिमी) झाल्यानंतर बिजप्रक्रिया करूनच खरीप ज्वारी पिकाची पेरणी करावी. खरीप ज्वारी पिकाची पेरणी ०७ जुलैपर्यंत करता येते. पेरणी केलेल्या खरीप ज्वारी पिकात अंतरमशागतीची कामे करून पिक तण विरहीत ठेवावे. खरीप ज्वारी पिकात पाण्याचा ताण बसत असल्यास ०.५% (५० ग्रॅम प्रति १० लिटर) पोर्टेशियम नायट्रेटची (१३:००:४५) फवारणी करावी.
बाजरी	पेरणी/उगवण	पेरणी न केलेल्या भागात पेरणीयोग्य पाऊस (७५-१०० मिमी) झाल्यानंतर बिजप्रक्रिया करूनच बाजरी पिकाची पेरणी करावी. बाजरी पिकाची पेरणी ३० जुलैपर्यंत करता येते. पेरणी केलेल्या बाजरी पिकात अंतरमशागतीची कामे करून पिक तण विरहीत ठेवावे. बाजरी पिकात पाण्याचा ताण बसत असल्यास ०.५% (५० ग्रॅम प्रति १० लिटर) पोर्टेशियम नायट्रेटची (१३:००:४५) फवारणी करावी.
ऊस	वाढीची	ऊस पिकास पाण्याचा ताण बसणार नाही याची काळजी घ्यावी. ऊस पिकास सकाळी लवकर किंवा सायंकाळी पाणी व्यवस्थापन करावे. सुरू ऊसाची पक्की बांधणी केली नसल्यास ती करून घ्यावी व पक्की बांधणी करताना १०० किलो नत्र, ५५ किलो स्फुरद व ५५ किलो पालाश प्रति हेक्टरास रासायनिक खतांची मात्रा द्यावी.
हळद	आंतरपीक	हळदीमध्ये आंतरपीक घेताना पहिल्या तीन ते साडेतीन महिन्यांपर्यंत काढणी होईल अशा प्रकारची आंतरपीक निवडावीत. यामध्ये पालेभाज्या सारख्या आंतरपीकांचा समावेश असावा.
संत्रा/मोसंबी	जातीची निवड/वाढीची	संत्रा नविन बाग लागवडीसाठी नागपूर संत्रा, किन्नो तर मोसंबी नविन बाग लागवडीसाठी न्युसेलर, सातगुडी व फुले मोसंबी इत्यादी जातींची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी. अंबे बहार संत्रा/मोसंबी बागेत कोटकनाशकाची फवारणी पावसाची उघाड बघून करावी. संत्रा/मोसंबी बागेत मृगबहारासाठी खत मात्रा दिली नसल्यास मोसंबीसाठी ४००:४००:४०० व संत्रासाठी ५००:२००:५०० ग्राम प्रति झाड नत्र : स्फुरद : पालाश खत मात्रा द्यावी.
डाळींब	जातीची निवड / फुलोरा, वाढीची	डाळींब नविन बाग लागवडीसाठी भगवा, फुले भगवा सुपर, गणेश, फुले आरक्ता, इत्यादी जातींची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी. डाळींब बागेत मृगबहारासाठी खत मात्रा दिली नसल्यास डाळींबासाठी ३००:२५०:२५० ग्राम प्रति झाड नत्र : स्फुरद : पालाश खत मात्रा द्यावी.
चिकू	जातीची निवड / वाढीची	चिकू नविन बाग लागवडीसाठी कालीपत्ती, क्रिकेट बॉल इत्यादी जातींची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी. चिकू बागेत खत मात्रा दिली नसल्यास ५००:५००:५०० ग्राम प्रति झाड नत्र : स्फुरद : पालाश खत मात्रा द्यावी.
भाजीपाला	रोपे तयार करणे / पूर्णलागवड / काढणी	पाण्याची उपलब्धता असल्यास भाजीपाला (वांगी, मिरची, टोमॅटो इत्यादी) पिकांची रोपे तयार करण्यासाठी गादी वाफ्यावर बी टाकावे. भाजीपाल्याचे बी टाकलेल्या गादी वाफ्यावरील तणांचे नियंत्रण करावे आवश्यकतेनुसार झाऱ्याच्या साहाय्याने पाणी द्यावे. गादीवाफ्यावर तयार केलेल्या भाजीपाला पिकांच्या रोपांना ४५ दिवस झाले असल्यास पाऊस झालेल्या ठिकाणी जमिनीत ओलावा बघून भाजीपाला पिकांची (वांगी, मिरची, टोमॅटो इ.) पूर्णलागवड करावी. पाऊस झालेल्या ठिकाणी जमिनीत ओलावा बघून बियाद्वारे लागवड केल्या जाणाऱ्या भाज्या उदा. भेंडी, कारले, भोपळा, दोडका इत्यादी भाजीपाला पिकांची लागवड करावी. काढणीस तयार असलेल्या भाजीपाला पिकांची काढणी करून घ्यावी.
फुलशेती	रोपे तयार करणे / पूर्णलागवड / काढणी	पाण्याची उपलब्धता असल्यास फुल पिकांची रोपे तयार करण्यासाठी गादी वाफ्यावर बी टाकावे. फुलपिकांचे बी टाकलेल्या गादी वाफ्यावरील तणांचे नियंत्रण करावे आवश्यकतेनुसार झाऱ्याच्या साहाय्याने पाणी द्यावे. पाऊस झालेल्या ठिकाणी जमिनीत ओलावा असल्याची खात्री करून फुल पिकांची पूर्णलागवड करावी. काढणीस तयार असलेल्या फुलपिकांची काढणी करून घ्यावी.
तुती रेशीम उद्योग	----	ढगाळ हवामानात संगोपन गृहात तापमान २२ ते २८ अं. से. आणि आर्द्रता ८५% पर्यंत असावी. पाऊसात किंवा पाऊस चालू असताना आर्द्रता १००% असते. अशा वेळी कोटकांनी पाने खाल्यानंतर अड्यावर पांढरा चुना धुलणी करावी. १०० अंडी पुंजासाठी १२ ते १५ किलो ग्रॅम पांढरा चुना धुलणी लागतो आणि निर्जंतुक पावडर म्हणून विजेता किंवा अंकुश पावडर या ४. ते ५ किलो ग्रॅम १०० अंडीपुंजासाठी वापर करावा. सतत पाऊस पडत असेल तर पाण्यानी भिजलेली तुती पाने खाद्य म्हणून चालतात पण त्याच्यासोबत माती किंवा धूळ येत कामा नये.
पशुधन व्यवस्थापन	-----	पावसाळ्याच्या सुरुवातीच्या काळात वातावरणातील आर्द्रता, तापमानातील बदल, पाणी साचणे, चिखल होणे, माश्या व इतर कोटकाचा प्रादुर्भाव दिसून येतो, या कारणाने पशुधनाचे आरोग्य बिघडते, त्यासाठी खालील उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. पशुधनासाठी सुरक्षित व स्वच्छ निवाऱ्याची व्यवस्था करणे, गोठ्याच्या परिसरात पाऊसाचे पाणी साचणार नाही याची काळजी घ्यावी, दर १५ दिवसाने गोठ्याचे पोर्टेशियम परमँगनेटच्या द्रावणाने निर्जंतुकरण करावे.

सदर कृषी हवामान सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.

मुख्य प्रकल्प समन्वयक
 ग्रामीण कृषी मौसम सेवा
 वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
अखिल भारतीय समन्वयित कृषि हवामानशास्त्र संशोधन प्रकल्प
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी — ४३१ ४०२
ईमेल - amfuparbhani@gmail.com



जालना जिल्हा कृषि हवामान सल्ला पत्रक क्रमांक — २६/२०२५ - २०२६

शुक्रवार, दिनांक — २७.०६.२०२५

मागील आठवड्यातील हवामानस्थिती (दिनांक २१ ते २७ जून २०२५)							हवामान घटक	हवामान अंदाज (दिनांक २८ जून ते ०२ जुलै, २०२५ साठी हवामान अंदाज)				
२१/०६	२२/०६	२३/०६	२४/०६	२५/०६	२६/०६	२७/०६	दिनांक	२८/०६	२९/०६	३०/०६	०१/०७	०२/०७
							पाऊस (मिमी)	६	५	४	९	१२
							कमाल तापमान (अं.से)	३०	३२	३१	३१	३२
							किमान तापमान (अं.से)	२२	२३	२३	२३	२४
							स.	पूर्णतः	पूर्णतः	पूर्णतः	पूर्णतः	पूर्णतः
							दु.	ढगाळ	ढगाळ	ढगाळ	ढगाळ	ढगाळ
							Fully Cloudy					
							सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	९२	८४	८५	८७	८८
							दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	८७	८३	८४	८५	८२
							वाऱ्याचा वेग (किमी /तास)	१६.८	१८.४	१९	२१.२	२१.३
							स.	नैऋत्य	पश्चिम-नैऋत्य	पश्चिम-नैऋत्य	पश्चिम	पश्चिम
							दु.					
							वाऱ्याची दिशा					

हवामान सारांश / चेतावनी :

प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई येथून प्राप्त झालेल्या अंदाजानुसार दिनांक २७ जून रोजी जालना जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी वादळी वारा, मेघगर्जना, वाऱ्याचा वेग अधिक (ताशी ३० ते ४० कि.मी.) राहून हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. मराठवाड्यात पुढील पाच दिवसात तुरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. मराठवाड्यात पुढील पाच दिवस कमाल तापमानात फारशी तफावत जाणवत नाही तर पुढील चार ते पाच दिवसात किमान तापमानात फारशी तफावत जाणवत नाही.

सामान्य सल्ला :

विस्तारीत अंदाजानुसार (ईआरएफएस) मराठवाड्यात दिनांक २७ जून ते ०३ जुलै, २०२५ दरम्यान पाऊस सरासरीपेक्षा कमी, कमाल तापमान सरासरीपेक्षा कमी व किमान तापमान सरासरी एवढे व दिनांक ०४ ते १० जुलै २०२५ दरम्यान पाऊस सरासरीपेक्षा जास्त, कमाल तापमान व किमान तापमान सरासरीएवढे राहण्याची शक्यता आहे.

मराठवाड्यात ज्या तालुक्यात पेरणी योग्य पाऊस (७५-१०० मिमी) झाला आहे (छ. संभाजीनगर जिल्हा : खुलताबाद, कन्नड, सोयगाव, सिल्लोड व फुलंब्री तालुका; जालना जिल्हा : भोकरदन व जाफ्राबाद तालुका; नांदेड जिल्हा: नांदेड, बिलोली, हदगाव, किनवट, मुदखेड, हिमायतनगर व माहूर तालुका; हिंगोली जिल्ह्यात : हिंगोली,कळमनुरी व वसमत तालुका) या जिल्ह्यातील तालुक्यात वापसा असतांना पेरणी करण्यास हरकत नाही. इतर तालुक्यात शेतकरी बांधवांनी पेरणीची घाई करू नये पेरणीयोग्य पाऊस (७५-१०० मिमी) झाल्यानंतरच पेरणी करावी.

सदेश : शेतकरी बांधवांनी पेरणीची घाई करू नये. पेरणीयोग्य पाऊस (७५-१०० मिमी) झाल्यानंतरच पेरणी करावी, पेरणी करण्यापूर्वी बियाण्यास बिजप्रक्रिया करूनच पेरणी करावी. सर्वसाधारणपणे १५ जुलै पर्यंत सर्व खरीप पिकांची (मूग, उडीद, भूईमूग सोडून) पेरणी करता येते.

कृषी हवामान सल्ला

पिकांचे नाव	अवस्था	कृषी हवामान सल्ला
सांयाबीन	पेरणी/उगवण	पेरणी न केलेल्या भागात पेरणीयोग्य पाऊस (७५-१०० मिमी) झाल्यानंतर बिजप्रक्रिया करूनच सांयाबीन पिकाची पेरणी करावी. सांयाबीन पिकाची पेरणी १५ जुलैपर्यंत करता येते. सांयाबीन पिकाची पेरणी शक्यतो बी.बी.एफ (रूंद वरंभा सरी) पध्दतीने करावी ज्यामुळे मातीतील ओलावा व जमिनीची सुपिकता टिकून राहण्यास मदत होऊन अधिक उत्पादन मिळते. पेरणी केलेल्या सांयाबीन पिकात अंतरमशागतीची कामे करून पिक तण विरहीत ठेवावे. सांयाबीन पिकात पाण्याचा ताण बसत असल्यास ०.५% (५० ग्रॅम प्रति १० लिटर) पोर्टेशियम नायट्रेटची (१३:००:४५) फवारणी करावी.
खरीप ज्वारी	पेरणी/उगवण	पेरणी न केलेल्या भागात पेरणीयोग्य पाऊस (७५-१०० मिमी) झाल्यानंतर बिजप्रक्रिया करूनच खरीप ज्वारी पिकाची पेरणी करावी. खरीप ज्वारी पिकाची पेरणी ०७ जुलैपर्यंत करता येते. पेरणी केलेल्या खरीप ज्वारी पिकात अंतरमशागतीची कामे करून पिक तण विरहीत ठेवावे. खरीप ज्वारी पिकात पाण्याचा ताण बसत असल्यास ०.५% (५० ग्रॅम प्रति १० लिटर) पोर्टेशियम नायट्रेटची (१३:००:४५) फवारणी करावी.
बाजरी	पेरणी/उगवण	पेरणी न केलेल्या भागात पेरणीयोग्य पाऊस (७५-१०० मिमी) झाल्यानंतर बिजप्रक्रिया करूनच बाजरी पिकाची पेरणी करावी. बाजरी पिकाची पेरणी ३० जुलैपर्यंत करता येते. पेरणी केलेल्या बाजरी पिकात अंतरमशागतीची कामे करून पिक तण विरहीत ठेवावे. बाजरी पिकात पाण्याचा ताण बसत असल्यास ०.५% (५० ग्रॅम प्रति १० लिटर) पोर्टेशियम नायट्रेटची (१३:००:४५) फवारणी करावी.
ऊस	वाढीची	ऊस पिकास पाण्याचा ताण बसणार नाही याची काळजी घ्यावी. ऊस पिकास सकाळी लवकर किंवा सायंकाळी पाणी व्यवस्थापन करावे. सुरू ऊसाची पक्की बांधणी केली नसल्यास ती करून घ्यावी व पक्की बांधणी करताना १०० किलो नत्र, ५५ किलो स्फुरद व ५५ किलो पालाश प्रति हेक्टरास रासायनिक खतांची मात्रा द्यावी.
हळद	आंतरपोक	हळदीमध्ये आंतरपोक घेताना पहिल्या तीन ते साडेतीन महिन्यांपर्यंत काढणी होईल अशा प्रकारची आंतरपोक निवडावीत. यामध्ये पालेभाज्या सारख्या आंतरपिकांचा समावेश असावा.
संत्रा/मोसंबी	जातीची निवड/वाढीची	संत्रा नविन बाग लागवडीसाठी नागपूर संत्रा, किन्नो तर मोसंबी नविन बाग लागवडीसाठी न्यूसेलर, सातगुडी व फुले मोसंबी इत्यादी जातीची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी. अंबे बहार संत्रा/मोसंबी बागेत कीटकनाशकाची फवारणी पावसाची उघाड बघून करावी. संत्रा/मोसंबी बागेत मृगबहारासाठी खत मात्रा दिली नसल्यास मोसंबीसाठी ४००:४००:४०० व संत्रासाठी ५००:५००:५०० ग्राम प्रति झाड नत्र : स्फुरद : पालाश खत मात्रा द्यावी.
डाळींब	जातीची निवड / फुलोरा, वाढीची	डाळींब नविन बाग लागवडीसाठी भगवा, फुले भगवा सुपर, गणेश, फुले आरक्ता, इत्यादी जातीची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी. डाळिंब बागेत मृगबहारासाठी खत मात्रा दिली नसल्यास डाळींबासाठी ३००:२५०:२५० ग्राम प्रति झाड नत्र : स्फुरद : पालाश खत मात्रा द्यावी.
चिक्कू	जातीची निवड / वाढीची	चिक्कू नविन बाग लागवडीसाठी कालीपत्ती, क्रिकेट बॉल इत्यादी जातीची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी. चिक्कू बागेत खत मात्रा दिली नसल्यास ५००:५००:५०० ग्राम प्रति झाड नत्र : स्फुरद : पालाश खत मात्रा द्यावी.
भाजीपाला	रोपे तयार करणे / पूर्णलागवड / काढणी	पाण्याची उपलब्धता असल्यास भाजीपाला (वांगी, मिरची, टोमॅटो इत्यादी) पिकाची रोपे तयार करण्यासाठी गादी वाफ्यावर बीं टाकावे. भाजीपाल्याचे बीं टाकलेल्या गादी वाफ्यावरील तणांचे नियंत्रण करावे आवश्यकतेनुसार झाऱ्याच्या साहाय्याने पाणी द्यावे. गादीवाफ्यावर तयार केलेल्या भाजीपाला पिकांच्या रोपांना ४५ दिवस झाले असल्यास पाऊस झालेल्या ठिकाणी जमिनीत ओलावा बघून भाजीपाला पिकांची (वांगी, मिरची, टोमॅटो इ.) पूर्णलागवड करावी. पाऊस झालेल्या ठिकाणी जमिनीत ओलावा बघून बियाद्वारे लागवड केल्या जाणाऱ्या भाज्या उदा. भेंडी, कारले, भोपळा, दोडका इत्यादी भाजीपाला पिकांची लागवड करावी. काढणीस तयार असलेल्या भाजीपाला पिकांची काढणी करून घ्यावी.
फुलशेती	रोपे तयार करणे / पूर्णलागवड / काढणी	पाण्याची उपलब्धता असल्यास फुल पिकांची रोपे तयार करण्यासाठी गादी वाफ्यावर बीं टाकावे. फुलपिकांचे बीं टाकलेल्या गादी वाफ्यावरील तणांचे नियंत्रण करावे आवश्यकतेनुसार झाऱ्याच्या साहाय्याने पाणी द्यावे. पाउस झालेल्या ठिकाणी जमिनीत ओलावा असल्याची खात्री करून फुल पिकाची पूर्णलागवड करावी. काढणीस तयार असलेल्या फुलपिकांची काढणी करून घ्यावी. काढणीस तयार असलेल्या फुलपिकांची काढणी करून घ्यावी.
तुती रेशीम उद्योग	----	ढगाळ हवामानात संगोपन गृहात तापमान २२ ते २८ अं. से. आणि आर्द्रता ८५% पर्यंत असावी. पाऊसात किंवा पाऊस चालू असताना आर्द्रता १००% असते. अशा वेळी कीटकांनी पाने खाल्यानंतर अळ्यावर पांढरा चुना धुलणी करावी. १०० अंडी पुंजासाठी १२ ते १५ किलो ग्रॅम पांढरा चुना धुलणी लागतो आणि निर्जंतुक पावडर म्हणून विजेता किंवा अंकुश पावडर या ४. ते ५. किलो ग्रॅम १०० अंडीपुंजासाठी वापर करावा. सतत पाऊस पडत असेल तर पाण्याने भिजलेली तुती पाने खाद्य म्हणून चालतात पण त्याच्यासोबत माती किंवा धूळ येत कामा नये.
पशुधन व्यवस्थापन	-----	पावसाळ्याच्या सुरुवातीच्या काळात वातावरणातील आर्द्रता, तापमानातील बदल, पाणी साचणे, चिखल होणे, माश्या व इतर कीटकांचा प्रादुर्भाव दिसून येतो, या कारणाने पशुधनाचे आरोग्य बिघडते, त्यासाठी खालील उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. पशुधनासाठी सुरक्षित व स्वच्छ निवाऱ्याची व्यवस्था करणे, गोठ्याच्या परिसरात पाऊसाचे पाणी साचणार नाही याची काळजी घ्यावी, दर १५ दिवसाने गोठ्याचे पोर्टेशियम परमँगनेटच्या द्रावणाने निर्जंतुकरण करावे.

सदर कृषी हवामान सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.

मुख्य प्रकल्प समन्वयक
ग्रामीण कृषी मौसम सेवा
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
अखिल भारतीय समन्वयित कृषि हवामानशास्त्र संशोधन प्रकल्प
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी - ४३१ ४०२
ईमेल - amfuparbhani@gmail.com



लातूर जिल्हा कृषि हवामान सल्ला पत्रक क्रमांक - २६/२०२५ - २०२६

शुक्रवार, दिनांक - २७.०६.२०२५

मागील आठवड्यातील हवामानस्थिती (दिनांक २१ ते २७ जून २०२५)							हवामान घटक	हवामान अंदाज (दिनांक २८ जून ते ०२ जुलै, २०२५ साठी हवामान अंदाज)				
२१/०६	२२/०६	२३/०६	२४/०६	२५/०६	२६/०६	२७/०६	दिनांक	२८/०६	२९/०६	३०/०६	०१/०७	०२/०७
							पाऊस (मिमी)	५	३	३	४	९
							कमाल तापमान (अं.से)	३०	३०	३१	३२	३१
							किमान तापमान (अं.से)	२१	२१	२२	२२	२२
							स. दु.	पूर्णतः ढगाळ	ढगाळ	ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ
							Fully Cloudy					
							सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	८४	८१	८२	८३	८४
							दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	८४	७८	७९	८३	८२
							वाऱ्याचा वेग (किमी /तास)	२१.४	२२.२	२४.४	२३.६	२३.९
							स. दु.	पश्चिम-नैऋत्य	पश्चिम-नैऋत्य	पश्चिम-नैऋत्य	पश्चिम	पश्चिम
							वाऱ्याची दिशा					

हवामान सारांश / चेतवणी :

प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई येथून प्राप्त झालेल्या अंदाजानुसार मराठवाड्यात पुढील पाच दिवसात तुरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. मराठवाड्यात पुढील पाच दिवस कमाल तापमानात फारशी तफावत जाणवत नाही तर पुढील चार ते पाच दिवसात किमान तापमानात फारशी तफावत जाणवत नाही.

सामान्य सल्ला :

विस्तारीत अंदाजानुसार (ईआरएफएस) मराठवाड्यात दिनांक २७ जून ते ०३ जुलै, २०२५ दरम्यान पाऊस सरासरीपेक्षा कमी, कमाल तापमान सरासरीपेक्षा कमी व किमान तापमान सरासरीपेक्षा उच्च व दिनांक ०४ ते १० जुलै २०२५ दरम्यान पाऊस सरासरीपेक्षा जास्त, कमाल तापमान व किमान तापमान सरासरीपेक्षा उच्च राहण्याची शक्यता आहे.

मराठवाड्यात ज्या तालुक्यात पेरणी योग्य पाऊस (७५-१०० मिमी) झाला आहे (छ. संभाजीनगर जिल्हा : खुलताबाद, कन्नड, सोयगाव, सिल्लोड व फुलंब्री तालुका; जालना जिल्हा : भोकरधन व जाफाबाद तालुका; नांदेड जिल्हा : नांदेड, बिलोली, हदगाव, किनवट, मुदखेड, हिमायतनगर व माहूर तालुका; हिंगोली जिल्हा : हिंगोली, कळमनुरी व वसमत तालुका) या जिल्ह्यातील तालुक्यात वापसा असतांना पेरणी करण्यास हरकत नाही. इतर तालुक्यात शेतकरी बांधवांनी पेरणीची घाई करू नये पेरणीयोग्य पाऊस (७५-१०० मिमी) झाल्यानंतरच पेरणी करावी.

संदेश : शेतकरी बांधवांनी पेरणीची घाई करू नये. पेरणीयोग्य पाऊस (७५-१०० मिमी) झाल्यानंतरच पेरणी करावी, पेरणी करण्यापूर्वी बियाण्यास बिजप्रक्रिया करूनच पेरणी करावी. सर्वसाधारणपणे १५ जुलै पर्यंत सर्व खरीप पिकांची (मूग, उडीद, भुईमूग सोडून) पेरणी करता येते.

पिकांचे नाव	अवस्था	कृषी हवामान सल्ला
सोयाबीन	पेरणी/उगवण	पेरणी न केलेल्या भागात पेरणीयोग्य पाऊस (७५-१०० मिमी) झाल्यानंतर बिजप्रक्रिया करूनच सोयाबीन पिकाची पेरणी करावी. सोयाबीन पिकाची पेरणी १५ जुलैपर्यंत करता येते. सोयाबीन पिकाची पेरणी शक्यतो बी.बी.एफ (रूंद वरंबा सरी) पद्धतीने करावी ज्यामुळे मातीतील ओलावा व जमिनीची सुपिकता टिकून राहण्यास मदत होऊन अधिक उत्पादन मिळते. पेरणी केलेल्या सोयाबीन पिकात अंतरमशागतीची कामे करून पिक तण विरहीत ठेवावे. सोयाबीन पिकात पाण्याचा ताण बसत असल्यास ०.५% (५० ग्रॅम प्रति १० लिटर) पोर्टेशियम नायट्रेटची (१३:००:४५) फवारणी करावी.
खरीप ज्वारी	पेरणी/उगवण	पेरणी न केलेल्या भागात पेरणीयोग्य पाऊस (७५-१०० मिमी) झाल्यानंतर बिजप्रक्रिया करूनच खरीप ज्वारी पिकाची पेरणी करावी. खरीप ज्वारी पिकाची पेरणी ०७ जुलैपर्यंत करता येते. पेरणी केलेल्या खरीप ज्वारी पिकात अंतरमशागतीची कामे करून पिक तण विरहीत ठेवावे. खरीप ज्वारी पिकात पाण्याचा ताण बसत असल्यास ०.५% (५० ग्रॅम प्रति १० लिटर) पोर्टेशियम नायट्रेटची (१३:००:४५) फवारणी करावी.
बाजरी	पेरणी/उगवण	पेरणी न केलेल्या भागात पेरणीयोग्य पाऊस (७५-१०० मिमी) झाल्यानंतर बिजप्रक्रिया करूनच बाजरी पिकाची पेरणी करावी. बाजरी पिकाची पेरणी ३० जुलैपर्यंत करता येते. पेरणी केलेल्या बाजरी पिकात अंतरमशागतीची कामे करून पिक तण विरहीत ठेवावे. बाजरी पिकात पाण्याचा ताण बसत असल्यास ०.५% (५० ग्रॅम प्रति १० लिटर) पोर्टेशियम नायट्रेटची (१३:००:४५) फवारणी करावी.
ऊस	वाढीची	ऊस पिकास पाण्याचा ताण बसणार नाही याची काळजी घ्यावी. ऊस पिकास सकाळी लवकर किंवा सायंकाळी पाणी व्यवस्थापन करावे. सुरु ऊसाची पक्की बांधणी केली नसल्यास ती करून घ्यावी व पक्की बांधणी करतांना १०० किलो नत्र, ५५ किलो स्फुरद व ५५ किलो पालाश प्रति हेक्टर रासायनिक खतांची मात्रा द्यावी.
हळद	आंतरपीक	हळदीमध्ये आंतरपीके घेताना पहिल्या तीन ते साडेतीन महिन्यांपर्यंत काढणी होईल अशा प्रकारची आंतरपीके निवडावीत. यामध्ये पालेभाज्या सारख्या आंतरपिकांचा समावेश असावा.
संत्रा/मोसंबी	जातीची निवड/वाढीची	संत्रा नविन बाग लागवडीसाठी नागपूर संत्रा, किन्नो तर मोसंबी नविन बाग लागवडीसाठी न्यसेलर, सातगुडी व फुले मोसंबी इत्यादी जातींची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी. अंबे बहार संत्रा/मोसंबी बागेत कीटकनाशकाची फवारणी पावसाची उघाड बघून करावी. संत्रा/मोसंबी बागेत मृगबहारासाठी खत मात्रा दिली नसल्यास मोसंबीसाठी ४००:४००:४०० व संत्रासाठी ५००:५००:५०० ग्राम प्रति झाड नत्र : स्फुरद : पालाश खत मात्रा द्यावी.
डाळींब	जातीची निवड / फुलोरा, वाढीची	डाळींब नविन बाग लागवडीसाठी भगवा, फुले भगवा सुपर, गणेश, फुले आरक्ता, इत्यादी जातींची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी. डाळींब बागेत मृगबहारासाठी खत मात्रा दिली नसल्यास डाळींबासाठी ३००:२५०:२५० ग्राम प्रति झाड नत्र : स्फुरद : पालाश खत मात्रा द्यावी.
चिक्कू	जातीची निवड / वाढीची	चिक्कू नविन बाग लागवडीसाठी कालीपत्ती, क्रिकेट बॉल इत्यादी जातींची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी. चिक्कू बागेत खत मात्रा दिली नसल्यास ५००:५००:५०० ग्राम प्रति झाड नत्र : स्फुरद : पालाश खत मात्रा द्यावी.
भाजीपाला	रोपे तयार करणे / पूर्णलागवड / काढणी	पाण्याची उपलब्धता असल्यास भाजीपाला (वांगी, मिरची, टोमॅटो इत्यादी) पिकांची रोपे तयार करण्यासाठी गादी वाफ्यावर बी टाकावे. भाजीपाल्याचे बी टाकलेल्या गादी वाफ्यावरील तणांचे नियंत्रण करावे आवश्यकतेनुसार झाऱ्याच्या साहाय्याने पाणी द्यावे. गादीवाफ्यावर तयार केलेल्या भाजीपाला पिकांच्या रोपांना ४५ दिवस झाले असल्यास पाऊस झालेल्या ठिकाणी जमिनीत ओलावा बघून भाजीपाला पिकांची (वांगी, मिरची, टोमॅटो इ.) पूर्णलागवड करावी. पाऊस झालेल्या ठिकाणी जमिनीत ओलावा बघून बियाद्वारे लागवड केल्या जाणाऱ्या भाज्या उदा. भेंडी, कारले, भोपळा, दोडका इत्यादी भाजीपाला पिकांची लागवड करावी. काढणीस तयार असलेल्या भाजीपाला पिकांची काढणी करून घ्यावी.
फुलशेती	रोपे तयार करणे / पूर्णलागवड / काढणी	पाण्याची उपलब्धता असल्यास फुल पिकांची रोपे तयार करण्यासाठी गादी वाफ्यावर बी टाकावे. फुलपिकाचे बी टाकलेल्या गादी वाफ्यावरील तणांचे नियंत्रण करावे आवश्यकतेनुसार झाऱ्याच्या साहाय्याने पाणी द्यावे. पाऊस झालेल्या ठिकाणी जमिनीत ओलावा असल्याची खात्री करून फुल पिकाची पूर्णलागवड करावी. काढणीस तयार असलेल्या फुलपिकांची काढणी करून घ्यावी. काढणीस तयार असलेल्या फुलपिकांची काढणी करून घ्यावी.
तुती रेशीम उद्योग	---	ढगाळ हवामानात संगोपन गृहात तापमान २२ ते २८ अं. से. आणि आर्द्रता ८५% पर्यंत असावी. पाऊसात किंवा पाऊस चालू असताना आर्द्रता १००% असते. अशा वेळी कीटकांनी पाने खाल्यानंतर अवघ्या पांढरा चुना धुळणी करावी. १०० अंडी पुंजासाठी १२ ते १५ किलो ग्रॅम पांढरा चुना धुळणी लागतो आणि निर्जंतुक पावडर म्हणून विजेता किंवा अंकुश पावडर या ४. ते ५. किलो ग्रॅम १०० अंडीपुंजासाठी वापर करावा. सतत पाऊस पडत असेल तर पाण्याने भिजलेली तुती पाने खाद्य म्हणून चालतात पण त्याच्यासोबत माती किंवा धूळ येत कामा नये.
पशुधन व्यवस्थापन	-----	पावसाळ्याच्या सुरुवातीच्या काळात वातावरणातील आर्द्रता, तापमानातील बदल, पाणी साचणे, चिखल होणे, माश्या व इतर कीटकांचा प्रादुर्भाव दिसून येतो, या कारणांने पशुधनाचे आरोग्य बिघडते, त्यासाठी खालील उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. पशुधनासाठी सुरक्षित व स्वच्छ निवाऱ्याची व्यवस्था करणे, गोठ्याच्या परिसरात पाऊसाचे पाणी साचणार नाही याची काळजी घ्यावी, दर १५ दिवसांने गोठ्याचे पोर्टेशियम परमॅंगनेटच्या द्रावणाने निर्जंतुकरणा करावे.

सदर कृषी हवामान सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशींनुसार तयार करून प्रसारित करण्यात आली.

मुख्य प्रकल्प समन्वयक
ग्रामीण कृषी मौसम सेवा
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
अखिल भारतीय समन्वयित कृषि हवामानशास्त्र संशोधन प्रकल्प
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी - ४३१ ४०२
ईमेल - amfuparbhani@gmail.com



नांदेड जिल्हा कृषि हवामान सल्ला पत्रक क्रमांक - २६/२०२५ - २०२६

शुक्रवार, दिनांक - २७.०६.२०२५

मागील आठवड्यातील हवामानस्थिती (दिनांक २१ ते २७ जून २०२५)							हवामान घटक	हवामान अंदाज (दिनांक २८ जून ते ०२ जुलै, २०२५ साठी हवामान अंदाज)				
२१/०६	२२/०६	२३/०६	२४/०६	२५/०६	२६/०६	२७/०६	दिनांक	२८/०६	२९/०६	३०/०६	०१/०७	०२/०७
							पाऊस (मिमी)	५	४	३	२	९
							कमाल तापमान (अं.से)	३१	३२	३१	३०	३०
							किमान तापमान (अं.से)	२२	२२	२३	२४	२४
							स.	पूर्णतः	पूर्णतः	पूर्णतः	पूर्णतः	पूर्णतः
							दु.	ढगाळ	ढगाळ	ढगाळ	ढगाळ	ढगाळ
							Fully Cloudy					
							सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	९२	८६	९२	९१	९५
							दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	७८	७२	७३	७६	७४
							वाऱ्याचा वेग (किमी /तास)	१५.९	१८.१	२०.७	२१.६	२१.६
							स.	पश्चिम-	पश्चिम-	पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम
							दु.	नैऋत्य	नैऋत्य			

हवामान सारांश / चेतावनी :

प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई येथून प्राप्त झालेल्या अंदाजानुसार दिनांक ०१ जुलै रोजी नांदेड जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी वादळी वारा, मेघगर्जना, वाऱ्याचा वेग अधिक (ताशी ३० ते ४० कि.मी.) राहून हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. मराठवाड्यात पुढील पाच दिवसात तुरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. मराठवाड्यात पुढील पाच दिवस कमाल तापमानात फारशी तफावत जाणवत नाही तर पुढील चार ते पाच दिवसात किमान तापमानात फारशी तफावत जाणवत नाही.

सामान्य सल्ला :

विस्तारीत अंदाजानुसार (ईआरएफएस) मराठवाड्यात दिनांक २७ जून ते ०३ जुलै, २०२५ दरम्यान पाऊस सरासरीपेक्षा कमी, कमाल तापमान सरासरीपेक्षा कमी व किमान तापमान सरासरी एवढे व दिनांक ०४ ते १० जुलै २०२५ दरम्यान पाऊस सरासरीपेक्षा जास्त, कमाल तापमान व किमान तापमान सरासरीएवढे राहण्याची शक्यता आहे.

मराठवाड्यात ज्या तालुक्यात पेरणी योग्य पाऊस (७५-१०० मिमी) झाला आहे (छ. संभाजीनगर जिल्हा : खुलताबाद, कन्नड, सोयगाव, सिल्लोड व फुलंब्री तालुका; जालना जिल्हा : भोकरदन व जाफ्राबाद तालुका; नांदेड जिल्हा: नांदेड, बिलोली, हदगाव, किनवट, मुदखेड, हिमायतनगर व माहूर तालुका; हिंगोली जिल्ह्यात : हिंगोली,कळमनुरी व वसमत तालुका) या जिल्ह्यातील तालुक्यात वापसा असतांना पेरणी करण्यास हरकत नाही. इतर तालुक्यात शेतकरी बांधवांनी पेरणीची घाई करू नये. पेरणीयोग्य पाऊस (७५-१०० मिमी) झाल्यानंतरच पेरणी करावी.

सदेश : शेतकरी बांधवांनी पेरणीची घाई करू नये. पेरणीयोग्य पाऊस (७५-१०० मिमी) झाल्यानंतरच पेरणी करावी, पेरणी करण्यापूर्वी बियाण्यास बिजप्रक्रिया करूनच पेरणी करावी. सर्वसाधारणपणे १५ जुलै पर्यंत सर्व खरीप पिकांची (मूग, उडीद, भूईमूग सोडून) पेरणी करता येते.

कृषी हवामान सल्ला		
पिकांचे नाव	अवस्था	
सांयाबीन	पेरणी/उगवण	पेरणी न केलेल्या भागात पेरणीयोग्य पाऊस (७५-१०० मिमी) झाल्यानंतर बिजप्रक्रिया करूनच सांयाबीन पिकाची पेरणी करावी. सांयाबीन पिकाची पेरणी १५ जुलैपर्यंत करता येते. सांयाबीन पिकाची पेरणी शक्यतो बी.बी.एफ (रूंद वरंबा सरी) पध्दतीने करावी ज्यामुळे मातीतील ओलावा व जमिनीची सुपिकता टिकून राहण्यास मदत होऊन अधिक उत्पादन मिळते. पेरणी केलेल्या सांयाबीन पिकात अंतरमशागतीची कामे करून पिक तण विरहीत ठेवावे. सांयाबीन पिकात पाण्याचा ताण बसत असल्यास ०.५% (५० ग्रॅम प्रति १० लिटर) पोटॅशियम नायट्रेटची (१३:००:४५) फवारणी करावी.
खरीप ज्वारी	पेरणी/उगवण	पेरणी न केलेल्या भागात पेरणीयोग्य पाऊस (७५-१०० मिमी) झाल्यानंतर बिजप्रक्रिया करूनच खरीप ज्वारी पिकाची पेरणी करावी. खरीप ज्वारी पिकाची पेरणी ०७ जुलैपर्यंत करता येते. पेरणी केलेल्या खरीप ज्वारी पिकात अंतरमशागतीची कामे करून पिक तण विरहीत ठेवावे. खरीप ज्वारी पिकात पाण्याचा ताण बसत असल्यास ०.५% (५० ग्रॅम प्रति १० लिटर) पोटॅशियम नायट्रेटची (१३:००:४५) फवारणी करावी.
बाजरी	पेरणी/उगवण	पेरणी न केलेल्या भागात पेरणीयोग्य पाऊस (७५-१०० मिमी) झाल्यानंतर बिजप्रक्रिया करूनच बाजरी पिकाची पेरणी करावी. बाजरी पिकाची पेरणी ३० जुलैपर्यंत करता येते. पेरणी केलेल्या बाजरी पिकात अंतरमशागतीची कामे करून पिक तण विरहीत ठेवावे. बाजरी पिकात पाण्याचा ताण बसत असल्यास ०.५% (५० ग्रॅम प्रति १० लिटर) पोटॅशियम नायट्रेटची (१३:००:४५) फवारणी करावी.
ऊस	वाढीची	ऊस पिकास पाण्याचा ताण बसणार नाही याची काळजी घ्यावी. ऊस पिकास सकाळी लवकर किंवा सायंकाळी पाणी व्यवस्थापन करावे. सुरू ऊसाची पक्की बांधणी केली नसल्यास ती करून घ्यावी व पक्की बांधणी करताना १०० किलो नत्र, ५५ किलो स्फुरद व ५५ किलो पालाश प्रति हेक्टर रासायनिक खतांची मात्रा द्यावी.
हळद	आंतरपीक	हळदीमध्ये आंतरपीक घेताना पहिल्या तीन ते साडेतीन महिन्यांपर्यंत काढणी होईल अशा प्रकारची आंतरपीक निवडावीत. यामध्ये पालेभाज्या सारख्या आंतरपिकांचा समावेश असावा.
संत्रा/मोसंबी	जातीची निवड/वाढीची	संत्रा नविन बाग लागवडीसाठी नागपूर संत्रा, किन्नो तर मोसंबी नविन बाग लागवडीसाठी न्यूसेलर, सातगुडी व फुले मोसंबी इत्यादी जातींची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी. अंबे बहार संत्रा/मोसंबी बागेत कीटकनाशकाची फवारणी पावसाची उघाड बघून करावी. संत्रा/मोसंबी बागेत मृगबहारासाठी खत मात्रा दिली नसल्यास मोसंबीसाठी ४००:४००:४०० व संत्रासाठी ५००:५००:५०० ग्राम प्रति झाड नत्र : स्फुरद : पालाश खत मात्रा द्यावी.
डाळींब	जातीची निवड / फुलोरा, वाढीची	डाळींब नविन बाग लागवडीसाठी भगवा, फुले भगवा सुपर, गणेश, फुले आरक्ता, इत्यादी जातींची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी. डाळींब बागेत मृगबहारासाठी खत मात्रा दिली नसल्यास डाळींबासाठी ३००:२५०:२५० ग्राम प्रति झाड नत्र : स्फुरद : पालाश खत मात्रा द्यावी.
चिक्	जातीची निवड / वाढीची	चिक् नविन बाग लागवडीसाठी कालीपती, क्रिकेट बॉल इत्यादी जातींची निवड करावी. लागवडीसाठी शासकीय नोंदणीकृत रोपवाटीकेतूनच रोपांची खरेदी करावी. चिक् बागेत खत मात्रा दिली नसल्यास ५००:५००:५०० ग्राम प्रति झाड नत्र : स्फुरद : पालाश खत मात्रा द्यावी.
भाजीपाला	रोपे तयार करणे / पूर्णलागवड / काढणी	पाण्याची उपलब्धता असल्यास भाजीपाला (वांगी, मिरची, टोमॅटो इत्यादी) पिकाची रोपे तयार करण्यासाठी गादी वाफ्यावर बी टाकावे. भाजीपाल्याचे बी टाकलेल्या गादी वाफ्यावरील तणांचे नियंत्रण करावे आवश्यकतेनुसार झाऱ्याच्या साहाय्याने पाणी द्यावे. गादीवाफ्यावर तयार केलेल्या भाजीपाला पिकांच्या रोपांना ४५ दिवस झाले असल्यास पाऊस झालेल्या ठिकाणी जमिनीत ओलावा बघून भाजीपाला पिकांची (वांगी, मिरची, टोमॅटो इ.) पूर्णलागवड करावी. पाऊस झालेल्या ठिकाणी जमिनीत ओलावा बघून बियाद्वारे लागवड केल्या जाणाऱ्या भाज्या उदा. भेंडी, कारले, भोपळा, दोडका इत्यादी भाजीपाला पिकांची लागवड करावी. काढणीस तयार असलेल्या भाजीपाला पिकांची काढणी करून घ्यावी.
फुलशेती	रोपे तयार करणे / पूर्णलागवड / काढणी	पाण्याची उपलब्धता असल्यास फुल पिकाची रोपे तयार करण्यासाठी गादी वाफ्यावर बी टाकावे. फुलपिकाचे बी टाकलेल्या गादी वाफ्यावरील तणांचे नियंत्रण करावे आवश्यकतेनुसार झाऱ्याच्या साहाय्याने पाणी द्यावे. पाऊस झालेल्या ठिकाणी जमिनीत ओलावा असल्याची खात्री करून फुल पिकाची पूर्णलागवड करावी. काढणीस तयार असलेल्या फुलपिकाची काढणी करून घ्यावी. काढणीस तयार असलेल्या फुलपिकांची काढणी करून घ्यावी.
तुती रेशीम उद्योग	----	ढगाळ हवामानात संगोपन गृहात तापमान २२ ते २८ अं. से. आणि आर्द्रता ८५% पर्यंत असावी. पाऊसात किंवा पाऊस चालू असताना आर्द्रता १००% असते. अशा वेळी कीटकांनी पाने खाल्यानंतर अळ्यावर पांढरा चुना धुलणी करावी. १०० अंडी पुंजासाठी १२ ते १५ किलो ग्रॅम पांढरा चुना धुलणी लागतो आणि निर्जंतुक पावडर म्हणून विजेता किंवा अंकुश पावडर या ४. ते ५. किलो ग्रॅम १०० अंडीपुंजासाठी वापर करावा. सतत पाऊस पडत असेल तर पाण्यानी भिजलेली तुती पाने खाद्य म्हणून चालतात पण त्याच्यासोबत माती किंवा धूळ येत कामा नये.
पशुधन व्यवस्थापन	-----	पावसाळ्याच्या सुरुवातीच्या काळात वातावरणातील आर्द्रता, तापमानातील बदल, पाणी साचणे, चिखल होणे, माश्या व इतर कीटकांचा प्रादुर्भाव दिसून येतो, या कारणांने पशुधनाचे आरोग्य बिघडते, त्यासाठी खालील उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. पशुधनासाठी सुरक्षित व स्वच्छ निवाऱ्याची व्यवस्था करणे, गोठ्याच्या परिसरात पाऊसाचे पाणी साचणार नाही याची काळजी घ्यावी, दर १५ दिवसांने गोठ्याचे पोटॅशियम परमँगनेटच्या द्रावणाने निर्जंतुकरणा करावे.

सदर कृषी हवामान सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.

मुख्य प्रकल्प समन्वयक
 ग्रामीण कृषी मौसम सेवा
 वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी